

TRIO - Kooperation zwischen Grundschule und Kindertagesstätte – Alltagsintegrierte sprachliche Bildung und Sprachförderung in Kleingruppen

Skalendokumentation

Forschungsdatenzentrum (FDZ) am Institut zur
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB)

Projektleitung

Prof. Dr. Marcus Hasselhorn (DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation)

Prof. Dr. Diemut Kucharz (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main)

Prof. Dr. Petra Schulz (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main)

Projektmitarbeitende

Dr. Janin Brandenburg, Dr. Jan-Henning Ehm, M. Sc. Sina Simone Huschka (DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation)

Dr. Sabrina Geyer, St.Ex. Alina Lausecker, Dr. Rabea Lemmer, Dr. Kristina Schierbaum (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main)

Dieses Dokument wurde vom Forschungsdatenzentrum am Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen unter Mitarbeit von Marius Dahlem, Christin Rüdiger, Benjamin Becker und Sara Techlin erstellt.

Stand: 25.11.2025

Bibliographische Informationen / Bitte wie folgt zitieren:

Forschungsdatenzentrum am Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (FDZ am IQB) (2025TRIO: Kooperation zwischen Grundschule und Kindertagesstätte – Alltagsintegrierte sprachliche Bildung und Sprachförderung in Kleingruppe. Skalenhandbuch zur Dokumentation der Erhebungsinstrumente. Berlin: IQB – Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen. http://doi.org/10.5159/IQB_TRIO_Skalendokumentation_v1

Das Werk steht unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Ausgenommen von der oben genannten Lizenz sind Teile, Abbildungen und sonstiges Drittmaterial, wenn anders gekennzeichnet.



Inhaltsverzeichnis

I Teachers	1
1 Allgemeine Infos	1
1.1 ProbandenID	1
1.2 ProbGruppe	2
1.3 TandemNr	3
1.4 PraePost	4
2 Wissen	5
2.1 TN_M1	5
2.2 TN_M2	6
2.3 TN_M3	7
2.4 TN_M4_1	8
2.5 TN_M4_2	9
2.6 TN_M5_1	10
2.7 TN_M5_2	11
2.8 TN_erfuellt	12
2.9 LehrErz	13
2.10Sc_xWissen	14
2.11Sc_xlingWissen	15
2.12Sc_xpraxWissen	16
2.13Sc_xKoennen	17
2.14Sc_xGesamt	18
2.15Sc_xWissen35	19
2.16Sc_Wissen_ling_35	20
2.17Sc_Wissen_prax_35	21
2.18pSc_xWissen_Post	22
2.19pSc_xlingWissen_Post	23
2.20pSc_xpraxWissen_Post	24
2.21pSc_xKoennen_Post	25
2.22pSc_xGesamt_Post	26
2.23pSc_xWissen35_Post	27
2.24pSc_Wissen_ling_35_Post	28
2.25pSc_Wissen_prax_35_Post	29

INHALTSVERZEICHNIS

2.26	Bearbeitungsdauer	30
2.27	submitdate	31
2.28	startdate	32
2.29	Technik1	33
2.30	Technik2	34
2.31	Technik3	35
3	Demografie	36
3.1	AlterVar	36
3.2	Geschlecht	38
3.3	Land	39
3.4	Bundesland	40
3.5	Gruppe	41
3.6	Kinder	42
3.7	Kinder_Alter_1	43
3.8	Kinder_Alter_2	44
3.9	Kinder_Alter_3	45
3.10	Kinder_Alter_4	46
3.11	Kinder_Alter_5	47
3.12	Kinder_Alter_6	48
3.13	Kinder_Alter_7	49
3.14	Kinder_Alter_8	50
3.15	Kinder_Alter_9	51
3.16	Kinder_Alter_10	52
3.17	Kinder_Alter_11	53
3.18	Kinder_Alter_12	54
4	Berufliche Position	55
4.1	Arbeit_Position_1	55
4.2	Arbeit_Position_2	56
4.3	Arbeit_Position_3	57
4.4	Arbeit_Position_4	58
4.5	Arbeit_Position_5	59
4.6	Arbeit_Position_other	60
4.7	Arbeit_Zeit	62
4.8	Arbeit_Kinderalter_1	63
4.9	Arbeit_Kinderalter_2	64
4.10	Arbeit_Kinderalter_3	65
4.11	Arbeit_Kinderalter_4	66

INHALTSVERZEICHNIS

4.12Arbeit_Kinderalter_other	67
4.13Arbeit_Nichtdeutsch_1	68
5 Sprachbiografie	69
5.1 Sprachbiografie_1a_1_1	69
5.2 Sprachbiografie_1a_1_2	70
5.3 Sprachbiografie_1a_1_3	71
5.4 Sprachbiografie_1b_1_1	72
5.5 Sprachbiografie_1b_1_2	73
5.6 Sprachbiografie_1b_1_3	74
5.7 Sprachbiografie_1b_1_4	75
5.8 Sprachbiografie_1c_1_1	76
5.9 Sprachbiografie_1c_1_2	77
5.10Sprachbiografie_1c_1_3	78
5.11Sprachbiografie_1c_1_4	79
5.12Sprachbiografie_1d_1_1	80
5.13Sprachbiografie_1d_1_2	81
5.14Sprachbiografie_1d_1_3	82
5.15Sprachbiografie_1d_1_4	83
5.16Sprachbiografie_2_1	84
5.17Sprachbiografie_2_2	85
5.18Sprachbiografie_2_3	86
5.19Sprachbiografie_2_4	87
5.20Sprachbiografie_2_5	88
5.21Sprachbiografie_2_6	89
5.22Sprachbiografie_2_7	90
6 Ausbildung	91
6.1 Schulbildung_1	91
6.2 Schulbildung_2	92
6.3 Schulbildung_3	93
6.4 Schulbildung_4	94
6.5 Schulbildung_5_1	95
6.6 Schulbildung_6_SQ001	96
6.7 Schulbildung_7_1	97
6.8 Schulbildung_7_2	98
6.9 Schulbildung_7_3	99
6.10Schulbildung_7_4	100
6.11Schulbildung_7_5	101

INHALTSVERZEICHNIS

6.12Schulbildung_7_6	102
6.13Schulbildung_7_7	103
6.14Beruf	104
6.15Ausbildung_1_1	105
6.16Ausbildung_1_2	106
6.17Ausbildung_1_3	107
6.18Ausbildung_1_4	108
6.19Ausbildung_1_5	109
6.20Ausbildung_1_6	110
6.21Ausbildung_1_other	111
6.22Ausbildung_2_1	112
6.23Ausbildung_2_2	113
6.24Ausbildung_2_3	114
6.25Ausbildung_2_4	115
6.26Ausbildung_2_other	116
6.27Ausbildung_3	117
6.28Ausbildung_4	118
7 Weiterbildung	119
7.1 Weiterbildung_1	119
7.2 Weiterbildung_2	120
7.3 Weiterbildung_3_1	121
7.4 Weiterbildung_3_2	122
7.5 Weiterbildung_3_3	123
7.6 Weiterbildung_3_4	124
7.7 Weiterbildung_3_5	125
7.8 Weiterbildung_3_6	126
7.9 Weiterbildung_4_1	127
7.10Weiterbildung_4_2	128
7.11Weiterbildung_4_3	129
7.12Weiterbildung_4_4	130
7.13Weiterbildung_4_5	131
7.14Weiterbildung_4_6	132
7.15Weiterbildung_5_1_1	133
7.16Weiterbildung_5_1_2	134
7.17Weiterbildung_5_1_3	135
7.18Weiterbildung_5_1_4	136
7.19Weiterbildung_5_1_5	137

INHALTSVERZEICHNIS

7.20Weiterbildung_5_1_6	138
7.21Weiterbildung_5_1_7	139
7.22Weiterbildung_5_1_8	140
7.23Weiterbildung_5_1_9	141
7.24Weiterbildung_5_1_10	142
7.25Weiterbildung_5_1_11	143
7.26Weiterbildung_5_1_other	144
7.27Weiterbildung_5_2_1	145
7.28Weiterbildung_5_2_2	146
7.29Weiterbildung_5_2_3	147
7.30Weiterbildung_5_2_4	148
7.31Weiterbildung_5_2_5	149
7.32Weiterbildung_5_2_6	150
7.33Weiterbildung_5_2_7	151
7.34Weiterbildung_5_2_8	152
7.35Weiterbildung_5_2_9	153
7.36Weiterbildung_5_2_10	154
7.37Weiterbildung_5_2_11	155
7.38Weiterbildung_5_2_other	156
7.39Weiterbildung_5_3_1	157
7.40Weiterbildung_5_3_2	158
7.41Weiterbildung_5_3_3	159
7.42Weiterbildung_5_3_4	160
7.43Weiterbildung_5_3_5	161
7.44Weiterbildung_5_3_6	162
7.45Weiterbildung_5_3_7	163
7.46Weiterbildung_5_3_8	164
7.47Weiterbildung_5_3_9	165
7.48Weiterbildung_5_3_10	166
7.49Weiterbildung_5_3_11	167
7.50Weiterbildung_5_3_other	168
7.51Weiterbildung_5_4_1	169
7.52Weiterbildung_5_4_2	170
7.53Weiterbildung_5_4_3	171
7.54Weiterbildung_5_4_4	172
7.55Weiterbildung_5_4_5	173
7.56Weiterbildung_5_4_6	174

INHALTSVERZEICHNIS

7.57Weiterbildung_5_4_7	175
7.58Weiterbildung_5_4_8	176
7.59Weiterbildung_5_4_9	177
7.60Weiterbildung_5_4_10	178
7.61Weiterbildung_5_4_11	179
7.62Weiterbildung_5_4_other	180
7.63Weiterbildung_5_5_1	181
7.64Weiterbildung_5_5_2	182
7.65Weiterbildung_5_5_3	183
7.66Weiterbildung_5_5_4	184
7.67Weiterbildung_5_5_5	185
7.68Weiterbildung_5_5_6	186
7.69Weiterbildung_5_5_7	187
7.70Weiterbildung_5_5_8	188
7.71Weiterbildung_5_5_9	189
7.72Weiterbildung_5_5_10	190
7.73Weiterbildung_5_5_11	191
7.74Weiterbildung_5_5_other	192
7.75Weiterbildung_5_6_1	193
7.76Weiterbildung_5_6_2	194
7.77Weiterbildung_5_6_3	195
7.78Weiterbildung_5_6_4	196
7.79Weiterbildung_5_6_5	197
7.80Weiterbildung_5_6_6	198
7.81Weiterbildung_5_6_7	199
7.82Weiterbildung_5_6_8	200
7.83Weiterbildung_5_6_9	201
7.84Weiterbildung_5_6_10	202
7.85Weiterbildung_5_6_11	203
7.86Weiterbildung_6_1	204
7.87Weiterbildung_6_2	205
7.88Weiterbildung_7_1	206
7.89Weiterbildung_9	207
7.90Weiterbildung_10	208
7.91Weiterbildung_11	209
7.92Weiterbildung_12_1	210
7.93Weiterbildung_12_2	211

INHALTSVERZEICHNIS

7.94	Weiterbildung_12_3	212
7.95	Weiterbildung_12_4	213
7.96	Weiterbildung_12_5	214
7.97	Weiterbildung_12_6	215
7.98	Weiterbildung_12_7	216
7.99	Weiterbildung_12_8	217
7.100	Weiterbildung_12_other	218
8	Sprachförderung Block 1	219
8.1	Sprachfoerderung_1_F1	219
8.2	Sprachfoerderung_1_F2	220
8.3	Sprachfoerderung_1_F3	221
8.4	Sprachfoerderung_1_F4	222
8.5	Sprachfoerderung_1_F5	223
8.6	Sprachfoerderung_1_F6	224
8.7	Sprachfoerderung_1_F7	225
8.8	Sprachfoerderung_2	226
8.9	Sprachfoerderung_3	227
8.10	Sprachfoerderung_4	228
8.11	Sprachstand_1	231
8.12	Sprachstand_2	232
8.13	Phonologie_1	233
8.14	Phonologie_4	234
8.15	Phonologie_5_1	235
8.16	Phonologie_5_2	236
8.17	Phonologie_5_3	237
8.18	Phonologie_5_4	238
8.19	Phonologie_7	239
8.20	Lexikon_2_1	240
8.21	Lexikon_2_2	241
8.22	Lexikon_2_3	242
8.23	Lexikon_2_4	243
8.24	Lexikon_2_5	244
8.25	Lexikon_2_6	245
8.26	Lexikon_2_7	246
8.27	Lexikon_2_8	247
8.28	Lexikon_2_9	248
8.29	Lexikon_2_10	249

INHALTSVERZEICHNIS

8.30Lexikon_2_11	250
8.31Lexikon_4	251
8.32Lexikon_6_1	252
8.33Lexikon_6_2	253
8.34Lexikon_6_3	254
8.35Lexikon_6_4	255
8.36Morphologie_1	256
8.37Morphologie_4	257
8.38Morphologie_5	258
8.39Morphologie_6	259
8.40Syntax_1	260
8.41Syntax_2	261
8.42Syntax_3	262
8.43Syntax_4	263
8.44Syntax_5	264
8.45Semantik_Pragmatik_1_1	265
8.46Semantik_Pragmatik_1_2	266
8.47Semantik_Pragmatik_1_3	267
8.48Semantik_Pragmatik_1_4	268
8.49Semantik_Pragmatik_3	269
8.50Semantik_Pragmatik_4	270
8.51Soziolinguistik_2	271
8.52Soziolinguistik_3	272
8.53Soziolinguistik_4	273
8.54Erwerb_1_1	275
8.55Erwerb_1_2	276
8.56Erwerb_1_3	277
8.57Erwerb_1_4	278
8.58Erwerb_1_5	279
8.59Erwerb_2	280
8.60Erwerb_3	281
8.61Erwerb_4	282
8.62Erwerb_5	283
8.63Erwerb_6	284
8.64Erwerb_8	285
8.65Erwerb_10	286
8.66Erwerb_11	287

INHALTSVERZEICHNIS

8.67Erwerb_13	288
8.68Erwerb_14	289
8.69Erwerb_16_1	290
8.70Erwerb_16_2	291
8.71Erwerb_16_3	292
8.72Erwerb_16_4	293
8.73Erwerb_16_5	294
8.74Erwerb_17	295
8.75Erwerb_19	296
8.76Erwerb_31	297
8.77Erwerb_24_1	298
8.78Erwerb_24_2	299
8.79Erwerb_24_3	300
8.80Erwerb_24_4	301
8.81Erwerb_25	302
8.82Erwerb_26	303
8.83Erwerb_28_1	304
8.84Erwerb_28_2	305
8.85Erwerb_28_3	306
8.86Erwerb_28_4	307
8.87Erwerb_28_5	308
8.88Erwerb_28_6	309
8.89Erwerb_29	310
8.90Erwerb_30	311
8.91Sprachdiagnostik_1	312
8.92Sprachdiagnostik_2	314
8.93Sprachdiagnostik_4	316
8.94Sprachdiagnostik_5	318
8.95Sprachdiagnostik_6	319
8.96Sprachdiagnostik_7	320
8.97Sprachdiagnostik_8	321
8.98Sprachdiagnostik_10	323
8.99Sprachdiagnostik_12	324
8.100Sprachdiagnostik_13	325
8.101Sprachdiagnostik_14_1	326
8.102Sprachdiagnostik_14_2	327
8.103Sprachdiagnostik_14_3	328

INHALTSVERZEICHNIS

8.10	Sprachdiagnostik_14_4	329
8.10	Sprachdiagnostik_14_5	330
8.10	Sprachdiagnostik_14_6	331
8.10	Sprachdiagnostik_14_7	332
8.10	Sprachdiagnostik_14_8	333
8.10	Sprachdiagnostik_15_1	334
8.11	Sprachdiagnostik_15_2	335
8.11	Sprachdiagnostik_15_3	336
8.11	Sprachdiagnostik_15_4	337
8.11	Sprachdiagnostik_15_5	338
8.11	Sprachdiagnostik_15_6	339
8.11	KoennenMethSprBerPhon_1	340
8.11	KoennenMethSprBerPhon_2	341
8.11	KoennenMethSprBerPhon_3	342
8.11	KoennenMethSprBerPhon_4	343
8.11	KoennenMethSprBerPhon_5	344
8.12	KoennenMethSprBerPhon_6	345
8.12	KoennenMethSprBerPhon_7	346
8.12	KoennenMethSprBerPhon_8	347
8.12	StratKomm_Team2_1	348
8.12	StratKomm_Team2_2	349
8.12	StratKomm_Team2_3	350
8.12	StratKomm_Team2_4	351
8.12	StratKomm_Team2_5	352
8.12	KoennenStrategieFiltr_1	353
8.12	KoennenStrategieFiltr_2	354
8.13	KoennenStrategieFiltr_3	355
8.13	KoennenStrategieFiltr_4	356
8.13	KoennenStrategieFiltr_5	357
8.13	KoennenStrategieFiltr_6	358
8.13	KoennenStrategieFiltr_7	359
8.13	KoennenStrategieFiltr_8	360
8.13	KoennenStrategieFiltr_9	361
8.13	KoennenStrategieFiltr_10	362
8.13	KoennenStrategieFiltr_11	363
8.13	KoennenStraPlanVWort	364
8.14	KoennenMethSprBerPraep_1	365

INHALTSVERZEICHNIS

8.14KoennenMethSprBerPraep_2	366
8.14KoennenMethSprBerPraep_3	367
8.14KoennenMethSprBerPraep_4	368
8.14KoennenMethSprBerPraep_5	369
8.14KoennenMethSprBerPraep_6	370
8.14KoennenMethSprBerPraep_7	371
8.14KoennenMethSprBerPraep_8	372
8.14KoennenDiagnSynDaM_01	373
8.14KoennenBerichtInfo_1	374
8.15KoennenBerichtInfo_2	375
8.15KoennenBerichtInfo_3	376
8.15KoennenBerichtInfo_4	377
8.15KoennenBerichtInfo_5	378
8.15KoennenBerichtInfo_6	379
8.15KoennenBerichtInfo_7	380
8.15KoennenBerichtInfo_8	381
8.15KoennenMethodikSelek1	382
8.15KoennenDiagnSynDaZ_1	384
8.15Strategie_L1_L2	385
8.16KoennenStrategieReflk_1	387
8.16KoennenStrategieReflk_2	389
8.16KoennenStrategieReflk_3	391
8.16KoennenStrategieReflk_4	393
8.16KoennenStrategieReflk_5	395
8.16KoennenStraPlanWort_01	397
8.16KoennenStraPlanWort_02	398
8.16KoennenStraPlanWort_03	399
8.16KoennenStraPlanWort_04	400
8.16KoennenStraPlanWort_05	401
8.17KoennenStraPlanWort_06	402
8.17KoennenStraPlanWort_07	403
8.17KoennenStraPlanWort_08	404
8.17KoennenDiagnPhon_01	405
8.17KoennenStraPlankeinD	406
8.17KoennenMethMonitReflx_1	408
8.17KoennenMethMonitReflx_2	409
8.17KoennenMethMonitReflx_3	410

INHALTSVERZEICHNIS

8.17KoennenMethodikAnpass_1	411
8.17KoennenMethodikAnpass_2	412
8.18KoennenMethodikAnpass_3	413
8.18KoennenMethodikAnpass_4	414
8.18KoennenMethodikAnpass_5	415
8.18KoennenMethodikAnpass_6	416
8.18KoennenMethodikAnpass_7	417
8.18KoennenDiagSelektion_1	418
8.18KoennenDiagSelektion_2	419
8.18KoennenDiagSelektion_3	420
8.18KoennenDiagSelektion_4	421
8.18KoennenDiagSelektion_5	422
8.19KoennenDiagSelektion_6	423
8.19KoennenDiagSelektion_7	424
8.19KoennenMethMoniVari_1	425
8.19KoennenMethMoniVari_2	426
8.19KoennenMethMoniVari_3	427
8.19KoennenMethMoniVari_4	428
8.19Phonologie_1	429
8.19Phonologie_4	430
8.19Phonologie_5_1	431
8.19Phonologie_5_2	432
8.20Phonologie_5_3	433
8.20Phonologie_5_4	434
8.20Phonologie_5	435
8.20Phonologie_7	436
8.20Lexikon_2_1	437
8.20Lexikon_2_2	438
8.20Lexikon_2_3	439
8.20Lexikon_2_4	440
8.20Lexikon_2_5	441
8.20Lexikon_2_6	442
8.21Lexikon_2_7	443
8.21Lexikon_2_8	444
8.21Lexikon_2_9	445
8.21Lexikon_2_10	446
8.21Lexikon_2_11	447

INHALTSVERZEICHNIS

8.21 ~~5~~ Lexikon_2	448
8.21 ~~6~~ Lexikon_4	449
8.21 ~~7~~ Lexikon_6_1	450
8.21 ~~8~~ Lexikon_6_2	451
8.21 ~~9~~ Lexikon_6_3	452
8.22 ~~0~~ Lexikon_6_4	453
8.22 ~~1~~ Lexikon_6	454
8.22 ~~2~~ Morphologie_1	455
8.22 ~~3~~ Morphologie_4	456
8.22 ~~4~~ Morphologie_5	457
8.22 ~~5~~ Morphologie_6	458
8.22 ~~6~~ Syntax_1	459
8.22 ~~7~~ Syntax_2	460
8.22 ~~8~~ Syntax_3	461
8.22 ~~9~~ Syntax_4	462
8.23 ~~0~~ Syntax_5	463
8.23 ~~1~~ Semantik_Pragmatik_1_1	464
8.23 ~~2~~ Semantik_Pragmatik_1_2	465
8.23 ~~3~~ Semantik_Pragmatik_1_3	466
8.23 ~~4~~ Semantik_Pragmatik_1_4	467
8.23 ~~5~~ Semantik_Pragmatik_1	468
8.23 ~~6~~ Semantik_Pragmatik_3	469
8.23 ~~7~~ Semantik_Pragmatik_4	470
8.23 ~~8~~ Soziolinguistik_2	471
8.23 ~~9~~ Soziolinguistik_3	472
8.24 ~~0~~ Soziolinguistik_4	473
8.24 ~~1~~ Erwerb_1_1	474
8.24 ~~2~~ Erwerb_1_2	475
8.24 ~~3~~ Erwerb_1_3	476
8.24 ~~4~~ Erwerb_1_4	477
8.24 ~~5~~ Erwerb_1_5	478
8.24 ~~6~~ Erwerb_1	479
8.24 ~~7~~ Erwerb_2	480
8.24 ~~8~~ Erwerb_3	481
8.24 ~~9~~ Erwerb_4	482
8.25 ~~0~~ Erwerb_5	483
8.25 ~~1~~ Erwerb_6	484

INHALTSVERZEICHNIS

8.252	Erwerb_8	485
8.253	Erwerb_10	486
8.254	Erwerb_11	487
8.255	Erwerb_13	488
8.256	Erwerb_14	489
8.257	Erwerb_16_1	490
8.258	Erwerb_16_2	491
8.259	Erwerb_16_3	492
8.260	Erwerb_16_4	493
8.261	Erwerb_16_5	494
8.262	Erwerb_16	495
8.263	Erwerb_17	496
8.264	Erwerb_19	497
8.265	Erwerb_31	498
8.266	Erwerb_24_1	499
8.267	Erwerb_24_2	500
8.268	Erwerb_24_3	501
8.269	Erwerb_24_4	502
8.270	Erwerb_24	503
8.271	Erwerb_25	504
8.272	Erwerb_26	505
8.273	Erwerb_28_1	506
8.274	Erwerb_28_2	507
8.275	Erwerb_28_3	508
8.276	Erwerb_28_4	509
8.277	Erwerb_28_5	510
8.278	Erwerb_28_6	511
8.279	Erwerb_28	512
8.280	Erwerb_29	513
8.281	Erwerb_30	514
8.282	Sprachdiagnostik_1	515
8.283	Sprachdiagnostik_2	516
8.284	Sprachdiagnostik_4	517
8.285	Sprachdiagnostik_5	518
8.286	Sprachdiagnostik_6	519
8.287	Sprachdiagnostik_7	520
8.288	Sprachdiagnostik_8	521

INHALTSVERZEICHNIS

8.28	Sprachdiagnostik_10	522
8.29	Sprachdiagnostik_12	523
8.29	Sprachdiagnostik_13	524
8.29	Sprachdiagnostik_14_1	525
8.29	Sprachdiagnostik_14_2	526
8.29	Sprachdiagnostik_14_3	527
8.29	Sprachdiagnostik_14_4	528
8.29	Sprachdiagnostik_14_5	529
8.29	Sprachdiagnostik_14_6	530
8.29	Sprachdiagnostik_14_7	531
8.29	Sprachdiagnostik_14_8	532
8.30	Sprachdiagnostik_14	533
8.30	Sprachdiagnostik_15_1	534
8.30	Sprachdiagnostik_15_2	535
8.30	Sprachdiagnostik_15_3	536
8.30	Sprachdiagnostik_15_4	537
8.30	Sprachdiagnostik_15_5	538
8.30	Sprachdiagnostik_15_6	539
8.30	Sprachdiagnostik_15	540
8.30	KoennenMethSprBerPhon_1	541
8.30	KoennenMethSprBerPhon_2	542
8.31	KoennenMethSprBerPhon_3	543
8.31	KoennenMethSprBerPhon_6_AL	544
8.31	KoennenMethSprBerPhon_7	545
8.31	KoennenMethSprBerPhon_8	546
8.31	KoennenMethSprBerPhon	547
8.31	StratKomm_Team2_1	548
8.31	StratKomm_Team2_2	549
8.31	StratKomm_Team2_3	550
8.31	StratKomm_Team2_4	551
8.31	StratKomm_Team2_5	552
8.32	StratKomm_Team2	553
8.32	KoennenStrategieFiltr_1	554
8.32	KoennenStrategieFiltr_2	555
8.32	KoennenStrategieFiltr_3	556
8.32	KoennenStrategieFiltr_4	557
8.32	KoennenStrategieFiltr_5	558

INHALTSVERZEICHNIS

8.326	KoennenStrategieFiltr_6	559
8.327	KoennenStrategieFiltr_7	560
8.328	KoennenStrategieFiltr_8	561
8.329	KoennenStrategieFiltr_9	562
8.330	KoennenStrategieFiltr_10	563
8.331	KoennenStrategieFiltr_11	564
8.332	KoennenStrategieFiltr	565
8.333	KoennenStraPlanVWort	566
8.334	KoennenMethSprBerPraep_1	567
8.335	KoennenMethSprBerPraep_2	568
8.336	KoennenMethSprBerPraep_3	569
8.337	KoennenMethSprBerPraep_4	570
8.338	KoennenMethSprBerPraep_5	571
8.339	KoennenMethSprBerPraep_6	572
8.340	KoennenMethSprBerPraep_7	573
8.341	KoennenMethSprBerPraep_8	574
8.342	KoennenMethSprBerPraep	575
8.343	KoennenDiagnSynDaM_01	576
8.344	KoennenBerichtInfo_4	577
8.345	KoennenBerichtInfo_5	578
8.346	KoennenBerichtInfo_7	579
8.347	KoennenBerichtInfo	580
8.348	KoennenMethodikSelek1	581
8.349	KoennenDiagnSynDaZ_1	582
8.350	Strategie_L1_L2	583
8.351	KoennenStrategieRefl_1	584
8.352	KoennenStrategieRefl_2	585
8.353	KoennenStrategieRefl_3	586
8.354	KoennenStrategieRefl_4	587
8.355	KoennenStrategieRefl_5	588
8.356	KoennenStrategieRefl_3	589
8.357	KoennenStrategieRefl_4	590
8.358	KoennenStrategieRefl_5	591
8.359	KoennenStrategieRefl	592
8.360	KoennenStraPlanWort_S	593
8.361	KoennenStraPlanWort_A	594
8.362	KoennenStraPlanWort_V	595

INHALTSVERZEICHNIS

8.363	KoennenStraPlanWortgruppen	596
8.364	KoennenDiagnPhon_01	597
8.365	KoennenStraPlankeinD	598
8.366	KoennenMethMonitReflx_1_AL	599
8.367	KoennenMethMonitReflx_3_AL	600
8.368	KoennenMethMonitReflxAL	601
8.369	KoennenMethodikAnpass_1	602
8.370	KoennenMethodikAnpass_2	603
8.371	KoennenMethodikAnpass_3	604
8.372	KoennenMethodikAnpass_4	605
8.373	KoennenMethodikAnpass_6	606
8.374	KoennenMethodikAnpass_7	607
8.375	KoennenMethodikAnpass	608
8.376	KoennenDiagSelektion	609
8.377	KoennenMethMoniVari_1	610
8.378	KoennenMethMoniVari_2	611
8.379	KoennenMethMoniVari_3	612
8.380	KoennenMethMoniVari_4	613
8.381	KoennenMethMoniVari	614
9	Sprachförderung Block 2	615
9.1	pBearbeitungsdauer	615
9.2	psubmitdate	616
9.3	pstartdate	617
9.4	pTechnik1	618
9.5	pTechnik2	619
9.6	pTechnik3	620
9.7	pSprachfoerderung_1_F1	621
9.8	pSprachfoerderung_1_F2	622
9.9	pSprachfoerderung_1_F3	623
9.10	pSprachfoerderung_1_F4	624
9.11	pSprachfoerderung_1_F5	625
9.12	pSprachfoerderung_1_F6	626
9.13	pSprachfoerderung_1_F7	627
9.14	pSprachfoerderung_2	628
9.15	pSprachfoerderung_3	629
9.16	pSprachfoerderung_4	630
9.17	pSprachstand_1	631

INHALTSVERZEICHNIS

9.18pSprachstand_2	632
9.19pPhonologie_1	633
9.20pPhonologie_4	634
9.21pPhonologie_5_1	635
9.22pPhonologie_5_2	636
9.23pPhonologie_5_3	637
9.24pPhonologie_5_4	638
9.25pPhonologie_7	639
9.26pLexikon_2_1	640
9.27pLexikon_2_2	641
9.28pLexikon_2_3	642
9.29pLexikon_2_4	643
9.30pLexikon_2_5	644
9.31pLexikon_2_6	645
9.32pLexikon_2_7	646
9.33pLexikon_2_8	647
9.34pLexikon_2_9	648
9.35pLexikon_2_10	649
9.36pLexikon_2_11	650
9.37pLexikon_4	651
9.38pLexikon_6_1	652
9.39pLexikon_6_2	653
9.40pLexikon_6_3	654
9.41pLexikon_6_4	655
9.42pMorphologie_1	656
9.43pMorphologie_4	657
9.44pMorphologie_5	658
9.45pMorphologie_6	659
9.46pSyntax_1	660
9.47pSyntax_2	661
9.48pSyntax_3	662
9.49pSyntax_4	663
9.50pSyntax_5	664
9.51pSemantik_Pragmatik_1_1	665
9.52pSemantik_Pragmatik_1_2	666
9.53pSemantik_Pragmatik_1_3	667
9.54pSemantik_Pragmatik_1_4	668

INHALTSVERZEICHNIS

9.55pSemantik_Pragmatik_3	669
9.56pSemantik_Pragmatik_4	670
9.57pSoziolinguistik_2	671
9.58pSoziolinguistik_3	672
9.59pSoziolinguistik_4	673
9.60pErwerb_1_1	675
9.61pErwerb_1_2	676
9.62pErwerb_1_3	677
9.63pErwerb_1_4	678
9.64pErwerb_1_5	679
9.65pErwerb_2	680
9.66pErwerb_3	681
9.67pErwerb_4	682
9.68pErwerb_5	683
9.69pErwerb_6	685
9.70pErwerb_8	686
9.71pErwerb_10	687
9.72pErwerb_11	688
9.73pErwerb_13	689
9.74pErwerb_14	690
9.75pErwerb_16_1	691
9.76pErwerb_16_2	692
9.77pErwerb_16_3	693
9.78pErwerb_16_4	694
9.79pErwerb_16_5	695
9.80pErwerb_17	696
9.81pErwerb_19	698
9.82pErwerb_31	699
9.83pErwerb_24_1	700
9.84pErwerb_24_2	701
9.85pErwerb_24_3	702
9.86pErwerb_24_4	703
9.87pErwerb_25	704
9.88pErwerb_26	705
9.89pErwerb_28_1	706
9.90pErwerb_28_2	707
9.91pErwerb_28_3	708

INHALTSVERZEICHNIS

9.92pErwerb_28_4	709
9.93pErwerb_28_5	710
9.94pErwerb_28_6	711
9.95pErwerb_29	712
9.96pErwerb_30	713
9.97pSprachdiagnostik_1	714
9.98pSprachdiagnostik_2	716
9.99pSprachdiagnostik_4	718
9.100pSprachdiagnostik_5	720
9.101pSprachdiagnostik_6	721
9.102pSprachdiagnostik_7	722
9.103pSprachdiagnostik_8	724
9.104pSprachdiagnostik_10	726
9.105pSprachdiagnostik_12	727
9.106pSprachdiagnostik_13	728
9.107pSprachdiagnostik_14_1	729
9.108pSprachdiagnostik_14_2	730
9.109pSprachdiagnostik_14_3	731
9.110pSprachdiagnostik_14_4	732
9.111pSprachdiagnostik_14_5	733
9.112pSprachdiagnostik_14_6	734
9.113pSprachdiagnostik_14_7	735
9.114pSprachdiagnostik_14_8	736
9.115pSprachdiagnostik_15_1	737
9.116pSprachdiagnostik_15_2	738
9.117pSprachdiagnostik_15_3	739
9.118pSprachdiagnostik_15_4	740
9.119pSprachdiagnostik_15_5	741
9.120pSprachdiagnostik_15_6	742
9.121pKoennenMethSprBerPhon_1	743
9.122pKoennenMethSprBerPhon_2	744
9.123pKoennenMethSprBerPhon_3	745
9.124pKoennenMethSprBerPhon_4	746
9.125pKoennenMethSprBerPhon_5	747
9.126pKoennenMethSprBerPhon_6	748
9.127pKoennenMethSprBerPhon_7	749
9.128pKoennenMethSprBerPhon_8	750

INHALTSVERZEICHNIS

9.129	StratKomm_Team2_1	751
9.130	StratKomm_Team2_2	752
9.131	StratKomm_Team2_3	753
9.132	StratKomm_Team2_4	754
9.133	StratKomm_Team2_5	755
9.134	KoennenStrategieFiltr_1	756
9.135	KoennenStrategieFiltr_2	757
9.136	KoennenStrategieFiltr_3	758
9.137	KoennenStrategieFiltr_4	759
9.138	KoennenStrategieFiltr_5	760
9.139	KoennenStrategieFiltr_6	761
9.140	KoennenStrategieFiltr_7	762
9.141	KoennenStrategieFiltr_8	763
9.142	KoennenStrategieFiltr_9	764
9.143	KoennenStrategieFiltr_10	765
9.144	KoennenStrategieFiltr_11	766
9.145	KoennenStraPlanVWort	767
9.146	KoennenMethSprBerPraep_1	769
9.147	KoennenMethSprBerPraep_2	770
9.148	KoennenMethSprBerPraep_3	771
9.149	KoennenMethSprBerPraep_4	772
9.150	KoennenMethSprBerPraep_5	773
9.151	KoennenMethSprBerPraep_6	774
9.152	KoennenMethSprBerPraep_7	775
9.153	KoennenMethSprBerPraep_8	776
9.154	KoennenDiagnSynDaM_01	777
9.155	KoennenBerichtInfo_1	778
9.156	KoennenBerichtInfo_2	779
9.157	KoennenBerichtInfo_3	780
9.158	KoennenBerichtInfo_4	781
9.159	KoennenBerichtInfo_5	782
9.160	KoennenBerichtInfo_6	783
9.161	KoennenBerichtInfo_7	784
9.162	KoennenBerichtInfo_8	785
9.163	KoennenMethodikSelek1	786
9.164	KoennenDiagnSynDaZ_1	788
9.165	Strategie_L1_L2	789

INHALTSVERZEICHNIS

9.166	KoennenStrategieReflk_1	791
9.167	KoennenStrategieReflk_2	793
9.168	KoennenStrategieReflk_3	795
9.169	KoennenStrategieReflk_4	797
9.170	KoennenStrategieReflk_5	799
9.171	KoennenStraPlanWort_01	801
9.172	KoennenStraPlanWort_02	802
9.173	KoennenStraPlanWort_03	803
9.174	KoennenStraPlanWort_04	804
9.175	KoennenStraPlanWort_05	805
9.176	KoennenStraPlanWort_06	806
9.177	KoennenStraPlanWort_07	807
9.178	KoennenStraPlanWort_08	808
9.179	KoennenDiagnPhon_01	809
9.180	KoennenStraPlankeinD	810
9.181	KoennenMethMonitReflx_1	812
9.182	KoennenMethMonitReflx_2	813
9.183	KoennenMethMonitReflx_3	814
9.184	KoennenMethodikAnpass_1	815
9.185	KoennenMethodikAnpass_2	816
9.186	KoennenMethodikAnpass_3	817
9.187	KoennenMethodikAnpass_4	818
9.188	KoennenMethodikAnpass_5	819
9.189	KoennenMethodikAnpass_6	820
9.190	KoennenMethodikAnpass_7	821
9.191	KoennenDiagSelektion_1	822
9.192	KoennenDiagSelektion_2	823
9.193	KoennenDiagSelektion_3	824
9.194	KoennenDiagSelektion_4	825
9.195	KoennenDiagSelektion_5	826
9.196	KoennenDiagSelektion_6	827
9.197	KoennenDiagSelektion_7	828
9.198	KoennenMethMoniVari_1	829
9.199	KoennenMethMoniVari_2	830
9.200	KoennenMethMoniVari_3	831
9.201	KoennenMethMoniVari_4	832
9.202	xPhonologie_1	833

INHALTSVERZEICHNIS

9.203xPhonologie_4	834
9.204xPhonologie_5_1	835
9.205xPhonologie_5_2	836
9.206xPhonologie_5_3	837
9.207xPhonologie_5_4	838
9.208xPhonologie_5	839
9.209xPhonologie_7	840
9.210xLexikon_2_1	841
9.211xLexikon_2_2	842
9.212xLexikon_2_3	843
9.213xLexikon_2_4	844
9.214xLexikon_2_5	845
9.215xLexikon_2_6	846
9.216xLexikon_2_7	847
9.217xLexikon_2_8	848
9.218xLexikon_2_9	849
9.219xLexikon_2_10	850
9.220xLexikon_2_11	851
9.221xLexikon_2	852
9.222xLexikon_4	853
9.223xLexikon_6_1	854
9.224xLexikon_6_2	855
9.225xLexikon_6_3	856
9.226xLexikon_6_4	857
9.227xLexikon_6	858
9.228xMorphologie_1	859
9.229xMorphologie_4	860
9.230xMorphologie_5	861
9.231xMorphologie_6	862
9.232xSyntax_1	863
9.233xSyntax_2	864
9.234xSyntax_3	865
9.235xSyntax_4	866
9.236xSyntax_5	867
9.237xSemantik_Pragmatik_1_1	868
9.238xSemantik_Pragmatik_1_2	869
9.239xSemantik_Pragmatik_1_3	870

INHALTSVERZEICHNIS

9.240xSemantik_Pragmatik_1_4	871
9.241xSemantik_Pragmatik_1	872
9.242xSemantik_Pragmatik_3	873
9.243xSemantik_Pragmatik_4	874
9.244xSoziolinguistik_2	875
9.245xSoziolinguistik_3	876
9.246xSoziolinguistik_4	877
9.247xErwerb_1_1	878
9.248xErwerb_1_2	879
9.249xErwerb_1_3	880
9.250xErwerb_1_4	881
9.251xErwerb_1_5	882
9.252xErwerb_1	883
9.253xErwerb_2	884
9.254xErwerb_3	885
9.255xErwerb_4	886
9.256xErwerb_5	887
9.257xErwerb_6	888
9.258xErwerb_8	889
9.259xErwerb_10	890
9.260xErwerb_11	891
9.261xErwerb_13	892
9.262xErwerb_14	893
9.263xErwerb_16_1	894
9.264xErwerb_16_2	895
9.265xErwerb_16_3	896
9.266xErwerb_16_4	897
9.267xErwerb_16_5	898
9.268xErwerb_16	899
9.269xErwerb_17	900
9.270xErwerb_19	901
9.271xErwerb_31	902
9.272xErwerb_24_1	903
9.273xErwerb_24_2	904
9.274xErwerb_24_3	905
9.275xErwerb_24_4	906
9.276xErwerb_24	907

INHALTSVERZEICHNIS

9.277xErwerb_25	908
9.278xErwerb_26	909
9.279xErwerb_28_1	910
9.280xErwerb_28_2	911
9.281xErwerb_28_3	912
9.282xErwerb_28_4	913
9.283xErwerb_28_5	914
9.284xErwerb_28_6	915
9.285xErwerb_28	916
9.286xErwerb_29	917
9.287xErwerb_30	918
9.288xSprachdiagnostik_1	919
9.289xSprachdiagnostik_2	920
9.290xSprachdiagnostik_4	921
9.291xSprachdiagnostik_5	922
9.292xSprachdiagnostik_6	923
9.293xSprachdiagnostik_7	924
9.294xSprachdiagnostik_8	925
9.295xSprachdiagnostik_10	926
9.296xSprachdiagnostik_12	927
9.297xSprachdiagnostik_13	928
9.298xSprachdiagnostik_14_1	929
9.299xSprachdiagnostik_14_2	930
9.300xSprachdiagnostik_14_3	931
9.301xSprachdiagnostik_14_4	932
9.302xSprachdiagnostik_14_5	933
9.303xSprachdiagnostik_14_6	934
9.304xSprachdiagnostik_14_7	935
9.305xSprachdiagnostik_14_8	936
9.306xSprachdiagnostik_14	937
9.307xSprachdiagnostik_15_1	938
9.308xSprachdiagnostik_15_2	939
9.309xSprachdiagnostik_15_3	940
9.310xSprachdiagnostik_15_4	941
9.311xSprachdiagnostik_15_5	942
9.312xSprachdiagnostik_15_6	943
9.313xSprachdiagnostik_15	944

INHALTSVERZEICHNIS

9.314xKoennenMethSprBerPhon_1	945
9.315xKoennenMethSprBerPhon_2	946
9.316xKoennenMethSprBerPhon_3	947
9.317xKoennenMethSprBerPhon_6_AL	948
9.318xKoennenMethSprBerPhon_7	949
9.319xKoennenMethSprBerPhon_8	950
9.320xKoennenMethSprBerPhon	951
9.321xStratKomm_Team2_1	952
9.322xStratKomm_Team2_2	953
9.323xStratKomm_Team2_3	954
9.324xStratKomm_Team2_4	955
9.325xStratKomm_Team2_5	956
9.326xStratKomm_Team2	957
9.327xKoennenStrategieFiltr_1	958
9.328xKoennenStrategieFiltr_2	959
9.329xKoennenStrategieFiltr_3	960
9.330xKoennenStrategieFiltr_4	961
9.331xKoennenStrategieFiltr_5	962
9.332xKoennenStrategieFiltr_6	963
9.333xKoennenStrategieFiltr_7	964
9.334xKoennenStrategieFiltr_8	965
9.335xKoennenStrategieFiltr_9	966
9.336xKoennenStrategieFiltr_10	967
9.337xKoennenStrategieFiltr_11	968
9.338xKoennenStrategieFiltr	969
9.339xKoennenStraPlanVWort	970
9.340xKoennenMethSprBerPraep_1	971
9.341xKoennenMethSprBerPraep_2	972
9.342xKoennenMethSprBerPraep_3	973
9.343xKoennenMethSprBerPraep_4	974
9.344xKoennenMethSprBerPraep_5	975
9.345xKoennenMethSprBerPraep_6	976
9.346xKoennenMethSprBerPraep_7	977
9.347xKoennenMethSprBerPraep_8	978
9.348xKoennenMethSprBerPraep	979
9.349xKoennenDiagnSynDaM_01	980
9.350xKoennenBerichtInfo_4	981

INHALTSVERZEICHNIS

9.351xKoennenBerichtInfo_5	982
9.352xKoennenBerichtInfo_7	983
9.353xKoennenBerichtInfo	984
9.354xKoennenMethodikSelek1	985
9.355xKoennenDiagnSynDaZ_1	986
9.356xStrategie_L1_L2	987
9.357nKoennenStrategieRefl_1	988
9.358nKoennenStrategieRefl_2	989
9.359nKoennenStrategieRefl_3	990
9.360nKoennenStrategieRefl_4	991
9.361nKoennenStrategieRefl_5	992
9.362xKoennenStrategieRefl_3	993
9.363xKoennenStrategieRefl_4	994
9.364xKoennenStrategieRefl_5	995
9.365xKoennenStrategieRefl	996
9.366KoennenStraPlanWort_S	997
9.367KoennenStraPlanWort_A	998
9.368KoennenStraPlanWort_V	999
9.369xKoennenStraPlanWortgruppen	1000
9.370xKoennenDiagnPhon_01	1001
9.371xKoennenStraPlankeinD	1002
9.372xKoennenMethMonitReflx_1_AL	1003
9.373xKoennenMethMonitReflx_3_AL	1004
9.374xKoennenMethMonitReflxAL	1005
9.375xKoennenMethodikAnpass_1	1006
9.376xKoennenMethodikAnpass_2	1007
9.377xKoennenMethodikAnpass_3	1008
9.378xKoennenMethodikAnpass_4	1009
9.379xKoennenMethodikAnpass_6	1010
9.380xKoennenMethodikAnpass_7	1011
9.381xKoennenMethodikAnpass	1012
9.382xKoennenDiagSelektion	1013
9.383xKoennenMethMoniVari_1	1014
9.384xKoennenMethMoniVari_2	1015
9.385xKoennenMethMoniVari_3	1016
9.386xKoennenMethMoniVari_4	1017
9.387xKoennenMethMoniVari	1018

9.38	Alter__	1019
II	AGTB	1020
1	Allgemeine Infos	1020
1.1	Code	1020
1.2	t1AGTBBemerk	1021
1.3	t1AGTBGebdat	1022
1.4	t1AGTBGebdat_FDZ	1023
1.5	t1AGTBTestdat	1024
1.6	t1AGTBTestdat2	1025
1.7	t1AGTBAbbruch	1026
1.8	t1AGTBNachtestung	1027
1.9	t1AGTBVoll	1028
2	AGTB Testzeitpunkt 1	1029
2.1	t1wv_ma1	1029
2.2	t1zv_ma1	1030
2.3	t1wr_ma1	1031
2.4	t1zr_ma1	1032
2.5	t1AGTB_age	1033
2.6	t1AGTB_age2	1034
2.7	t1AG_ageAG	1035
2.8	t1agtbage	1036
2.9	t1agtbage2	1038
2.10	t1wr_m4	1039
2.11	t1wv_m4	1040
2.12	t1zr_m4	1041
2.13	t1zv_m4	1042
2.14	t1wr_ca	1043
2.15	t1wr_ls	1044
2.16	t1wr_l2s	1045
2.17	t1wr_ma	1046
2.18	t1wv_ca	1047
2.19	t1wv_ls	1048
2.20	t1wv_l2s	1049
2.21	t1wv_ma	1050
2.22	t1zr_ca	1051
2.23	t1zr_ls	1052

INHALTSVERZEICHNIS

2.24t1zr_l2s	1053
2.25t1zr_ma	1054
2.26t1zv_ca	1055
2.27t1zv_ls	1056
2.28t1zv_l2s	1057
2.29t1zv_ma	1058
2.30t1wv_s1	1059
2.31t1wv_s2	1060
2.32t1wv_s3	1061
2.33t1wv_s4	1062
2.34t1wv_s5	1063
2.35t1wv_s6	1064
2.36t1wv_s7	1065
2.37t1wv_s8	1066
2.38t1wv_s9	1067
2.39t1wv_s10	1068
2.40t1wv_l1	1069
2.41t1wv_l2	1070
2.42t1wv_l3	1071
2.43t1wv_l4	1072
2.44t1wv_l5	1073
2.45t1wv_l6	1074
2.46t1wv_l7	1075
2.47t1wv_l8	1076
2.48t1wv_l9	1077
2.49t1wv_l10	1078
2.50t1wv_i1	1079
2.51t1wv_i2	1080
2.52t1wv_i3	1081
2.53t1wv_i4	1082
2.54t1wv_i5	1083
2.55t1wv_i6	1084
2.56t1wv_i7	1085
2.57t1wv_i8	1086
2.58t1wv_i9	1087
2.59t1wv_i10	1088
2.60t1wv_r1	1089

INHALTSVERZEICHNIS

2.61t1wv_r2	.1090
2.62t1wv_r3	.1091
2.63t1wv_r4	.1092
2.64t1wv_r5	.1093
2.65t1wv_r6	.1094
2.66t1wv_r7	.1095
2.67t1wv_r8	.1096
2.68t1wv_r9	.1097
2.69t1wv_r10	.1098
2.70t1zv_s1	.1099
2.71t1zv_s2	.1100
2.72t1zv_s3	.1101
2.73t1zv_s4	.1102
2.74t1zv_s5	.1103
2.75t1zv_s6	.1104
2.76t1zv_s7	.1105
2.77t1zv_s8	.1106
2.78t1zv_s9	.1107
2.79t1zv_s10	.1108
2.80t1zv_11	.1109
2.81t1zv_12	.1110
2.82t1zv_13	.1111
2.83t1zv_14	.1112
2.84t1zv_15	.1113
2.85t1zv_16	.1114
2.86t1zv_17	.1115
2.87t1zv_18	.1116
2.88t1zv_19	.1117
2.89t1zv_110	.1118
2.90t1zv_i1	.1119
2.91t1zv_i2	.1120
2.92t1zv_i3	.1121
2.93t1zv_i4	.1122
2.94t1zv_i5	.1123
2.95t1zv_i6	.1124
2.96t1zv_i7	.1125
2.97t1zv_i8	.1126

INHALTSVERZEICHNIS

2.98t1zv_i9	.1127
2.99t1zv_i10	.1128
2.100t1zv_r1	.1129
2.101t1zv_r2	.1130
2.102t1zv_r3	.1131
2.103t1zv_r4	.1132
2.104t1zv_r5	.1133
2.105t1zv_r6	.1134
2.106t1zv_r7	.1135
2.107t1zv_r8	.1136
2.108t1zv_r9	.1137
2.109t1zv_r10	.1138
2.110t1wr_s1	.1139
2.111t1wr_s2	.1140
2.112t1wr_s3	.1141
2.113t1wr_s4	.1142
2.114t1wr_s5	.1143
2.115t1wr_s6	.1144
2.116t1wr_s7	.1145
2.117t1wr_s8	.1146
2.118t1wr_s9	.1147
2.119t1wr_s10	.1148
2.120t1wr_l1	.1149
2.121t1wr_l2	.1150
2.122t1wr_l3	.1151
2.123t1wr_l4	.1152
2.124t1wr_l5	.1153
2.125t1wr_l6	.1154
2.126t1wr_l7	.1155
2.127t1wr_l8	.1156
2.128t1wr_l9	.1157
2.129t1wr_l10	.1158
2.130t1wr_i1	.1159
2.131t1wr_i2	.1160
2.132t1wr_i3	.1161
2.133t1wr_i4	.1162
2.134t1wr_i5	.1163

INHALTSVERZEICHNIS

2.135lwr_i6	.1164
2.136lwr_i7	.1165
2.137lwr_i8	.1166
2.138lwr_i9	.1167
2.139lwr_i10	.1168
2.140lwr_r1	.1169
2.141lwr_r2	.1170
2.142lwr_r3	.1171
2.143lwr_r4	.1172
2.144lwr_r5	.1173
2.145lwr_r6	.1174
2.146lwr_r7	.1175
2.147lwr_r8	.1176
2.148lwr_r9	.1177
2.149lwr_r10	.1178
2.150lwr_s1	.1179
2.151lwr_s2	.1180
2.152lwr_s3	.1181
2.153lwr_s4	.1182
2.154lwr_s5	.1183
2.155lwr_s6	.1184
2.156lwr_s7	.1185
2.157lwr_s8	.1186
2.158lwr_s9	.1187
2.159lwr_s10	.1188
2.160lwr_l1	.1189
2.161lwr_l2	.1190
2.162lwr_l3	.1191
2.163lwr_l4	.1192
2.164lwr_l5	.1193
2.165lwr_l6	.1194
2.166lwr_l7	.1195
2.167lwr_l8	.1196
2.168lwr_l9	.1197
2.169lwr_l10	.1198
2.170lwr_i1	.1199
2.171lwr_i2	.1200

INHALTSVERZEICHNIS

2.172l_zr_i3	1201
2.173l_zr_i4	1202
2.174l_zr_i5	1203
2.175l_zr_i6	1204
2.176l_zr_i7	1205
2.177l_zr_i8	1206
2.178l_zr_i9	1207
2.179l_zr_i10	1208
2.180l_zr_r1	1209
2.181l_zr_r2	1210
2.182l_zr_r3	1211
2.183l_zr_r4	1212
2.184l_zr_r5	1213
2.185l_zr_r6	1214
2.186l_zr_r7	1215
2.187l_zr_r8	1216
2.188l_zr_r9	1217
2.189l_zr_r10	1218
2.190l_zr_l2t	1219
2.191l_wv_l2t	1220
2.192l_zv_l2t	1221
2.193l_zr_m4t	1222
2.194l_wv_m4t	1223
2.195l_zv_m4t	1224
2.196l_zr_mat	1225
2.197l_wv_mat	1226
2.198l_zv_mat	1227
3 AGTB Testzeitpunkt 2	1228
3.1 t2AGTBDropout	1228
3.2 t2AGTBBemerkungen_speziell	1229
3.3 t2AGTBGebdat	1230
3.4 t2AGTBGebdat_FDZ	1231
3.5 t2AGTBTestdat	1232
3.6 t2AGTBTestdat2	1233
3.7 t2AGTBTestdat3	1234
3.8 t2AGTBAbbruch	1235
3.9 t2AGTBNachtestung	1236

INHALTSVERZEICHNIS

3.10t2AGTBVoll	1237
3.11t2wv_ma1	1238
3.12t2zv_ma1	1239
3.13t2wr_ma1	1240
3.14t2zr_ma1	1241
3.15t2AG_age1	1242
3.16t2AG_age2	1243
3.17t2AG_age3	1244
3.18t2agtbage1	1245
3.19t2agtbage2	1247
3.20t2agtbage3	1249
3.21t2agtbagekn	1251
3.22t2ar_mat	1253
3.23t2ar_mt1	1254
3.24t2ar_mt2	1255
3.25t2ar_mt	1256
3.26t2ar	1257
3.27t2ar_1	1258
3.28t2ar_2	1259
3.29t2kn_lis	1260
3.30t2kn_ca	1261
3.31t2kn_cla	1262
3.32t2kn_clm	1263
3.33t2kn_cln	1264
3.34t2kn_cma	1265
3.35t2kn_cmm	1266
3.36t2kn_cmn	1267
3.37t2kn_csa	1268
3.38t2kn_csm	1269
3.39t2kn_csn	1270
3.40t2wr_ca	1271
3.41t2wr_ls	1272
3.42t2wr_l2s	1273
3.43t2wr_ma	1274
3.44t2wr_m4	1275
3.45t2wv_ca	1276
3.46t2wv_ls	1277

INHALTSVERZEICHNIS

3.47t2wv_l2s	1278
3.48t2wv_ma	1279
3.49t2wv_m4	1280
3.50t2zr_ca	1281
3.51t2zr_ls	1282
3.52t2zr_l2s	1283
3.53t2zr_ma	1284
3.54t2zr_m4	1285
3.55t2zv_ca	1286
3.56t2zv_ls	1287
3.57t2zv_l2s	1288
3.58t2zv_ma	1289
3.59t2zv_m4	1290
3.60t2ar_s1	1291
3.61t2ar_s2	1292
3.62t2ar_i1	1293
3.63t2ar_i2	1294
3.64t2ar_rt1	1295
3.65t2ar_rt2	1296
3.66t2ar1_1	1297
3.67t2ar1_2	1298
3.68t2ar2_1	1299
3.69t2ar2_2	1300
3.70t2ar3_1	1301
3.71t2ar3_2	1302
3.72t2ar4_1	1303
3.73t2ar4_2	1304
3.74t2ar5_1	1305
3.75t2ar5_2	1306
3.76t2ar6_1	1307
3.77t2ar6_2	1308
3.78t2ar7_1	1309
3.79t2ar7_2	1310
3.80t2ar8_1	1311
3.81t2ar8_2	1312
3.82t2ar9_1	1313
3.83t2ar9_2	1314

INHALTSVERZEICHNIS

3.84t2ar10_1	1315
3.85t2ar10_2	1316
3.86t2kn_s1	1317
3.87t2kn_s2	1318
3.88t2kn_s3	1319
3.89t2kn_s4	1320
3.90t2kn_s5	1321
3.91t2kn_s6	1322
3.92t2kn_s7	1323
3.93t2kn_s8	1324
3.94t2kn_s9	1325
3.95t2kn_s10	1326
3.96t2kn_s11	1327
3.97t2kn_s12	1328
3.98t2kn_s13	1329
3.99t2kn_s14	1330
3.100t2kn_s15	1331
3.101t2kn_s16	1332
3.102t2kn_s17	1333
3.103t2kn_s18	1334
3.104t2kn_s19	1335
3.105t2kn_s20	1336
3.106t2kn_s21	1337
3.107t2kn_s22	1338
3.108t2kn_s23	1339
3.109t2kn_s24	1340
3.110t2kn_i1	1341
3.111t2kn_i2	1342
3.112t2kn_i3	1343
3.113t2kn_i4	1344
3.114t2kn_i5	1345
3.115t2kn_i6	1346
3.116t2kn_i7	1347
3.117t2kn_i8	1348
3.118t2kn_i9	1349
3.119t2kn_i10	1350
3.120t2kn_i11	1351

INHALTSVERZEICHNIS

3.1212kn_i12	1352
3.1222kn_i13	1353
3.1232kn_i14	1354
3.1242kn_i15	1355
3.1252kn_i16	1356
3.1262kn_i17	1357
3.1272kn_i18	1358
3.1282kn_i19	1359
3.1292kn_i20	1360
3.1302kn_i21	1361
3.1312kn_i22	1362
3.1322kn_i23	1363
3.1332kn_i24	1364
3.1342kn_y1	1365
3.1352kn_y2	1366
3.1362kn_y3	1367
3.1372kn_y4	1368
3.1382kn_y5	1369
3.1392kn_y6	1370
3.1402kn_y7	1371
3.1412kn_y8	1372
3.1422kn_y9	1373
3.1432kn_y10	1374
3.1442kn_y11	1375
3.1452kn_y12	1376
3.1462kn_y13	1377
3.1472kn_y14	1378
3.1482kn_y15	1379
3.1492kn_y16	1380
3.1502kn_y17	1381
3.1512kn_y18	1382
3.1522kn_y19	1383
3.1532kn_y20	1384
3.1542kn_y21	1385
3.1552kn_y22	1386
3.1562kn_y23	1387
3.1572kn_y24	1388

INHALTSVERZEICHNIS

3.15 ~~8~~ kn_m1	1389
3.15 ~~0~~ kn_m2	1390
3.16 ~~0~~ kn_m3	1391
3.16 ~~1~~ kn_m4	1392
3.16 ~~2~~ kn_m5	1393
3.16 ~~3~~ kn_m6	1394
3.16 ~~4~~ kn_m7	1395
3.16 ~~5~~ kn_m8	1396
3.16 ~~6~~ kn_m9	1397
3.16 ~~7~~ kn_m10	1398
3.16 ~~8~~ kn_m11	1399
3.16 ~~9~~ kn_m12	1400
3.17 ~~0~~ kn_m13	1401
3.17 ~~1~~ kn_m14	1402
3.17 ~~2~~ kn_m15	1403
3.17 ~~3~~ kn_m16	1404
3.17 ~~4~~ kn_m17	1405
3.17 ~~5~~ kn_m18	1406
3.17 ~~6~~ kn_m19	1407
3.17 ~~7~~ kn_m20	1408
3.17 ~~8~~ kn_m21	1409
3.17 ~~9~~ kn_m22	1410
3.18 ~~0~~ kn_m23	1411
3.18 ~~1~~ kn_m24	1412
3.18 ~~2~~ kn_r1	1413
3.18 ~~3~~ kn_r2	1414
3.18 ~~4~~ kn_r3	1415
3.18 ~~5~~ kn_r4	1416
3.18 ~~6~~ kn_r5	1417
3.18 ~~7~~ kn_r6	1418
3.18 ~~8~~ kn_r7	1419
3.18 ~~9~~ kn_r8	1420
3.19 ~~0~~ kn_r9	1421
3.19 ~~1~~ kn_r10	1422
3.19 ~~2~~ kn_r11	1423
3.19 ~~3~~ kn_r12	1424
3.19 ~~4~~ kn_r13	1425

INHALTSVERZEICHNIS

3.19 ~~6~~ 2kn_r14	.1426
3.19 ~~6~~ 2kn_r15	.1427
3.19 ~~7~~ 2kn_r16	.1428
3.19 ~~8~~ 2kn_r17	.1429
3.19 ~~9~~ 2kn_r18	.1430
3.20 ~~0~~ 2kn_r19	.1431
3.20 ~~1~~ 2kn_r20	.1432
3.20 ~~2~~ 2kn_r21	.1433
3.20 ~~3~~ 2kn_r22	.1434
3.20 ~~4~~ 2kn_r23	.1435
3.20 ~~5~~ 2kn_r24	.1436
3.20 ~~6~~ 2wv_s1	.1437
3.20 ~~7~~ 2wv_s2	.1438
3.20 ~~8~~ 2wv_s3	.1439
3.20 ~~9~~ 2wv_s4	.1440
3.21 ~~0~~ 2wv_s5	.1441
3.21 ~~1~~ 2wv_s6	.1442
3.21 ~~2~~ 2wv_s7	.1443
3.21 ~~3~~ 2wv_s8	.1444
3.21 ~~4~~ 2wv_s9	.1445
3.21 ~~5~~ 2wv_s10	.1446
3.21 ~~6~~ 2wv_i1	.1447
3.21 ~~7~~ 2wv_i2	.1448
3.21 ~~8~~ 2wv_i3	.1449
3.21 ~~9~~ 2wv_i4	.1450
3.22 ~~0~~ 2wv_i5	.1451
3.22 ~~1~~ 2wv_i6	.1452
3.22 ~~2~~ 2wv_i7	.1453
3.22 ~~3~~ 2wv_i8	.1454
3.22 ~~4~~ 2wv_i9	.1455
3.22 ~~5~~ 2wv_i10	.1456
3.22 ~~6~~ 2wv_i1	.1457
3.22 ~~7~~ 2wv_i2	.1458
3.22 ~~8~~ 2wv_i3	.1459
3.22 ~~9~~ 2wv_i4	.1460
3.23 ~~0~~ 2wv_i5	.1461
3.23 ~~1~~ 2wv_i6	.1462

INHALTSVERZEICHNIS

3.232wv_i7	1463
3.232wv_i8	1464
3.232wv_i9	1465
3.232wv_i10	1466
3.232wv_r1	1467
3.232wv_r2	1468
3.232wv_r3	1469
3.232wv_r4	1470
3.242wv_r5	1471
3.242wv_r6	1472
3.242wv_r7	1473
3.242wv_r8	1474
3.242wv_r9	1475
3.242wv_r10	1476
3.242zv_s1	1477
3.242zv_s2	1478
3.242zv_s3	1479
3.242zv_s4	1480
3.252zv_s5	1481
3.252zv_s6	1482
3.252zv_s7	1483
3.252zv_s8	1484
3.252zv_s9	1485
3.252zv_s10	1486
3.252zv_11	1487
3.252zv_12	1488
3.252zv_13	1489
3.252zv_14	1490
3.262zv_15	1491
3.262zv_16	1492
3.262zv_17	1493
3.262zv_18	1494
3.262zv_19	1495
3.262zv_110	1496
3.262zv_i1	1497
3.262zv_i2	1498
3.262zv_i3	1499

INHALTSVERZEICHNIS

3.26 ~~0~~ zv_i4		1500
3.27 ~~0~~ zv_i5		1501
3.27 ~~1~~ zv_i6		1502
3.27 ~~2~~ zv_i7		1503
3.27 ~~3~~ zv_i8		1504
3.27 ~~4~~ zv_i9		1505
3.27 ~~5~~ zv_i10		1506
3.27 ~~6~~ zv_r1		1507
3.27 ~~7~~ zv_r2		1508
3.27 ~~8~~ zv_r3		1509
3.27 ~~9~~ zv_r4		1510
3.28 ~~0~~ zv_r5		1511
3.28 ~~1~~ zv_r6		1512
3.28 ~~2~~ zv_r7		1513
3.28 ~~3~~ zv_r8		1514
3.28 ~~4~~ zv_r9		1515
3.28 ~~5~~ zv_r10		1516
3.28 ~~6~~ wr_s1		1517
3.28 ~~7~~ wr_s2		1518
3.28 ~~8~~ wr_s3		1519
3.28 ~~9~~ wr_s4		1520
3.29 ~~0~~ wr_s5		1521
3.29 ~~1~~ wr_s6		1522
3.29 ~~2~~ wr_s7		1523
3.29 ~~3~~ wr_s8		1524
3.29 ~~4~~ wr_s9		1525
3.29 ~~5~~ wr_s10		1526
3.29 ~~6~~ wr_11		1527
3.29 ~~7~~ wr_12		1528
3.29 ~~8~~ wr_13		1529
3.29 ~~9~~ wr_14		1530
3.30 ~~0~~ wr_15		1531
3.30 ~~1~~ wr_16		1532
3.30 ~~2~~ wr_17		1533
3.30 ~~3~~ wr_18		1534
3.30 ~~4~~ wr_19		1535
3.30 ~~5~~ wr_110		1536

INHALTSVERZEICHNIS

3.306wr_i1	1537
3.307wr_i2	1538
3.308wr_i3	1539
3.309wr_i4	1540
3.310wr_i5	1541
3.311wr_i6	1542
3.312wr_i7	1543
3.313wr_i8	1544
3.314wr_i9	1545
3.315wr_i10	1546
3.316wr_r1	1547
3.317wr_r2	1548
3.318wr_r3	1549
3.319wr_r4	1550
3.320wr_r5	1551
3.321wr_r6	1552
3.322wr_r7	1553
3.323wr_r8	1554
3.324wr_r9	1555
3.325wr_r10	1556
3.326zr_s1	1557
3.327zr_s2	1558
3.328zr_s3	1559
3.329zr_s4	1560
3.330zr_s5	1561
3.331zr_s6	1562
3.332zr_s7	1563
3.333zr_s8	1564
3.334zr_s9	1565
3.335zr_s10	1566
3.336zr_11	1567
3.337zr_12	1568
3.338zr_13	1569
3.339zr_14	1570
3.340zr_15	1571
3.341zr_16	1572
3.342zr_17	1573

INHALTSVERZEICHNIS

3.34 ~~8~~ 2zr_18	1574
3.34 ~~4~~ 2zr_19	1575
3.34 ~~6~~ 2zr_110	1576
3.34 ~~6~~ 2zr_i1	1577
3.34 ~~7~~ 2zr_i2	1578
3.34 ~~8~~ 2zr_i3	1579
3.34 ~~9~~ 2zr_i4	1580
3.35 ~~0~~ 2zr_i5	1581
3.35 ~~1~~ 2zr_i6	1582
3.35 ~~2~~ 2zr_i7	1583
3.35 ~~3~~ 2zr_i8	1584
3.35 ~~4~~ 2zr_i9	1585
3.35 ~~5~~ 2zr_i10	1586
3.35 ~~6~~ 2zr_r1	1587
3.35 ~~7~~ 2zr_r2	1588
3.35 ~~8~~ 2zr_r3	1589
3.35 ~~9~~ 2zr_r4	1590
3.36 ~~0~~ 2zr_r5	1591
3.36 ~~1~~ 2zr_r6	1592
3.36 ~~2~~ 2zr_r7	1593
3.36 ~~3~~ 2zr_r8	1594
3.36 ~~4~~ 2zr_r9	1595
3.36 ~~5~~ 2zr_r10	1596
3.36 ~~6~~ 2zr_l2t	1597
3.36 ~~7~~ 2wv_l2t	1598
3.36 ~~8~~ 2zv_l2t	1599
3.36 ~~9~~ 2zr_m4t	1600
3.37 ~~0~~ 2wv_m4t	1601
3.37 ~~1~~ 2zv_m4t	1602
3.37 ~~2~~ 2zr_mat	1603
3.37 ~~3~~ 2wv_mat	1604
3.37 ~~4~~ 2zv_mat	1605
3.37 ~~5~~ 2kn_cn	1606
3.37 ~~6~~ 2kn_cm	1607
3.37 ~~7~~ 2kn_aT	1608
3.37 ~~8~~ 2kn_nT	1609
3.37 ~~9~~ 2kn_mT	1610

4 AGTB Testzeitpunkt 3	1611
4.1 t3AGTBGebdat	1611
4.2 t3AGTBGebdat_FDZ	1612
4.3 t3AGTBBemerk_allgemein	1613
4.4 t3AGTBBemerk_speziell	1614
4.5 t3AGTBTestdat	1615
4.6 t3AGTBTestdat3	1616
4.7 t3AGTBDropout	1617
4.8 t3AGTBNachtestung	1618
4.9 t3AGTBVoll	1619
4.10t3AGTBAbbruch	1620
4.11t3wv_ma1	1621
4.12t3zv_ma1	1623
4.13t3wr_ma1	1625
4.14t3zr_ma1	1626
4.15t3AG_age	1627
4.16t3AG_age2	1628
4.17t3AGTBageNorm	1629
4.18t3AGTBageNorm2	1631
4.19t3wr_ca	1633
4.20t3wr_ls	1634
4.21t3wr_l2s	1635
4.22t3wr_ma	1636
4.23t3wr_m4	1637
4.24t3wv_ca	1638
4.25t3wv_ls	1639
4.26t3wv_l2s	1640
4.27t3wv_ma	1641
4.28t3wv_m4	1642
4.29t3zr_ca	1643
4.30t3zr_ls	1644
4.31t3zr_l2s	1645
4.32t3zr_ma	1646
4.33t3zr_m4	1647
4.34t3zv_ca	1648
4.35t3zv_ls	1649
4.36t3zv_l2s	1650

INHALTSVERZEICHNIS

4.37t3zv_ma	1651
4.38t3zv_m4	1652
4.39t3wv_s1	1653
4.40t3wv_s2	1654
4.41t3wv_s3	1655
4.42t3wv_s4	1656
4.43t3wv_s5	1657
4.44t3wv_s6	1658
4.45t3wv_s7	1659
4.46t3wv_s8	1660
4.47t3wv_s9	1661
4.48t3wv_s10	1662
4.49t3wv_l1	1663
4.50t3wv_l2	1664
4.51t3wv_l3	1665
4.52t3wv_l4	1666
4.53t3wv_l5	1667
4.54t3wv_l6	1668
4.55t3wv_l7	1669
4.56t3wv_l8	1670
4.57t3wv_l9	1671
4.58t3wv_l10	1672
4.59t3wv_i1	1673
4.60t3wv_i2	1674
4.61t3wv_i3	1675
4.62t3wv_i4	1676
4.63t3wv_i5	1677
4.64t3wv_i6	1678
4.65t3wv_i7	1679
4.66t3wv_i8	1680
4.67t3wv_i9	1681
4.68t3wv_i10	1682
4.69t3wv_r1	1683
4.70t3wv_r2	1684
4.71t3wv_r3	1685
4.72t3wv_r4	1686
4.73t3wv_r5	1687

INHALTSVERZEICHNIS

4.74t3wv_r6	.1688
4.75t3wv_r7	.1689
4.76t3wv_r8	.1690
4.77t3wv_r9	.1691
4.78t3wv_r10	.1692
4.79t3zv_s1	.1693
4.80t3zv_s2	.1694
4.81t3zv_s3	.1695
4.82t3zv_s4	.1696
4.83t3zv_s5	.1697
4.84t3zv_s6	.1698
4.85t3zv_s7	.1699
4.86t3zv_s8	.1700
4.87t3zv_s9	.1701
4.88t3zv_s10	.1702
4.89t3zv_11	.1703
4.90t3zv_12	.1704
4.91t3zv_13	.1705
4.92t3zv_14	.1706
4.93t3zv_15	.1707
4.94t3zv_16	.1708
4.95t3zv_17	.1709
4.96t3zv_18	.1710
4.97t3zv_19	.1711
4.98t3zv_110	.1712
4.99t3zv_i1	.1713
4.100t3zv_i2	.1714
4.101t3zv_i3	.1715
4.102t3zv_i4	.1716
4.103t3zv_i5	.1717
4.104t3zv_i6	.1718
4.105t3zv_i7	.1719
4.106t3zv_i8	.1720
4.107t3zv_i9	.1721
4.108t3zv_i10	.1722
4.109t3zv_r1	.1723
4.110t3zv_r2	.1724

INHALTSVERZEICHNIS

4.1113zv_r3	1725
4.1113zv_r4	1726
4.1113zv_r5	1727
4.1113zv_r6	1728
4.1113zv_r7	1729
4.1113zv_r8	1730
4.1113zv_r9	1731
4.1113zv_r10	1732
4.1113wr_s1	1733
4.1213wr_s2	1734
4.1213wr_s3	1735
4.1213wr_s4	1736
4.1213wr_s5	1737
4.1213wr_s6	1738
4.1213wr_s7	1739
4.1213wr_s8	1740
4.1213wr_s9	1741
4.1213wr_s10	1742
4.1213wr_l1	1743
4.1313wr_l2	1744
4.1313wr_l3	1745
4.1313wr_l4	1746
4.1313wr_l5	1747
4.1313wr_l6	1748
4.1313wr_l7	1749
4.1313wr_l8	1750
4.1313wr_l9	1751
4.1313wr_l10	1752
4.1313wr_i1	1753
4.1413wr_i2	1754
4.1413wr_i3	1755
4.1413wr_i4	1756
4.1413wr_i5	1757
4.1413wr_i6	1758
4.1413wr_i7	1759
4.1413wr_i8	1760
4.1413wr_i9	1761

INHALTSVERZEICHNIS

4.148wr_i10	1762
4.148wr_r1	1763
4.150wr_r2	1764
4.1513wr_r3	1765
4.1523wr_r4	1766
4.1533wr_r5	1767
4.1543wr_r6	1768
4.1553wr_r7	1769
4.1563wr_r8	1770
4.1573wr_r9	1771
4.1583wr_r10	1772
4.1593zr_s1	1773
4.1603zr_s2	1774
4.1613zr_s3	1775
4.1623zr_s4	1776
4.1633zr_s5	1777
4.1643zr_s6	1778
4.1653zr_s7	1779
4.1663zr_s8	1780
4.1673zr_s9	1781
4.1683zr_s10	1782
4.1693zr_11	1783
4.1703zr_12	1784
4.1713zr_13	1785
4.1723zr_14	1786
4.1733zr_15	1787
4.1743zr_16	1788
4.1753zr_17	1789
4.1763zr_18	1790
4.1773zr_19	1791
4.1783zr_110	1792
4.1793zr_i1	1793
4.1803zr_i2	1794
4.1813zr_i3	1795
4.1823zr_i4	1796
4.1833zr_i5	1797
4.1843zr_i6	1798

INHALTSVERZEICHNIS

4.18 ~~5~~ zr_i7	1799
4.18 ~~6~~ zr_i8	1800
4.18 ~~7~~ zr_i9	1801
4.18 ~~8~~ zr_i10	1802
4.18 ~~9~~ zr_r1	1803
4.19 ~~0~~ zr_r2	1804
4.19 ~~1~~ zr_r3	1805
4.19 ~~2~~ zr_r4	1806
4.19 ~~3~~ zr_r5	1807
4.19 ~~4~~ zr_r6	1808
4.19 ~~5~~ zr_r7	1809
4.19 ~~6~~ zr_r8	1810
4.19 ~~7~~ zr_r9	1811
4.19 ~~8~~ zr_r10	1812
4.19 ~~9~~ zr_l2t	1813
4.20 ~~0~~ zr_m4t	1814
4.20 ~~1~~ zr_mat	1815
4.20 ~~2~~ wv_l2t	1816
4.20 ~~3~~ wv_m4t	1817
4.20 ~~4~~ wv_mat	1818
4.20 ~~5~~ zv_l2t	1819
4.20 ~~6~~ zv_m4t	1820
4.20 ~~7~~ zv_mat	1821
III HTKS	1822
1 HTKS Testzeitpunkt 1	1822
1.1 Code	1822
1.2 t1HTKSD	1823
1.3 t1HTKSB	1824
1.4 t1HTKS_vorhanden	1825
1.5 t1HTKSA1	1826
1.6 t1HTKSA2	1827
1.7 t1HTKSB1	1828
1.8 t1HTKSB2	1829
1.9 t1HTKSB3	1830
1.10t1HTKSB4	1831
1.11t1HTKSZ1	1832

INHALTSVERZEICHNIS

1.12t1HTKS1	1833
1.13t1HTKS2	1834
1.14t1HTKS3	1835
1.15t1HTKS4	1836
1.16t1HTKS5	1837
1.17t1HTKS6	1838
1.18t1HTKS7	1839
1.19t1HTKS8	1840
1.20t1HTKS9	1841
1.21t1HTKS10	1842
1.22t1HTKSC1	1843
1.23t1HTKSD1	1844
1.24t1HTKSD2	1845
1.25t1HTKSD3	1846
1.26t1HTKSD4	1847
1.27t1HTKSZ2	1848
1.28t1HTKS11	1849
1.29t1HTKS12	1850
1.30t1HTKS13	1851
1.31t1HTKS14	1852
1.32t1HTKS15	1853
1.33t1HTKS16	1854
1.34t1HTKS17	1855
1.35t1HTKS18	1856
1.36t1HTKS19	1857
1.37t1HTKS20	1858
1.38t1HTKSE1	1859
1.39t1HTKSE2	1860
1.40t1HTKSF1	1861
1.41t1HTKSF2	1862
1.42t1HTKSF3	1863
1.43t1HTKSF4	1864
1.44t1HTKSZ3	1865
1.45t1HTKS21	1866
1.46t1HTKS22	1867
1.47t1HTKS23	1868
1.48t1HTKS24	1869

INHALTSVERZEICHNIS

1.49t1HTKS25	1870
1.50t1HTKS26	1871
1.51t1HTKS27	1872
1.52t1HTKS28	1873
1.53t1HTKS29	1874
1.54t1HTKS30	1875
1.55t1HTKSS1	1876
1.56t1HTKSS2	1877
1.57t1HTKSS3	1878
1.58t1HTKSRW	1879
1.59t1HTKSS1_miss	1880
1.60t1HTKSS2_miss	1881
1.61t1HTKSS3_miss	1882
2 HTKS Testzeitpunkt 2	1883
2.1 t2HTKS_Bemerk	1883
2.2 t2HTKS_vorhanden	1884
2.3 t2HTKSD	1885
2.4 t2HTKSA1	1886
2.5 t2HTKSA2	1887
2.6 t2HTKSB1	1888
2.7 t2HTKSB2	1889
2.8 t2HTKSB3	1890
2.9 t2HTKSB4	1891
2.10t2HTKSZ1	1892
2.11t2HTKS1	1893
2.12t2HTKS2	1894
2.13t2HTKS3	1895
2.14t2HTKS4	1896
2.15t2HTKS5	1897
2.16t2HTKS6	1898
2.17t2HTKS7	1899
2.18t2HTKS8	1900
2.19t2HTKS9	1901
2.20t2HTKS10	1902
2.21t2HTKSC1	1903
2.22t2HTKSD1	1904
2.23t2HTKSD2	1905

INHALTSVERZEICHNIS

2.24t2HTKSD3	1906
2.25t2HTKSD4	1907
2.26t2HTKSZ2	1908
2.27t2HTKS11	1909
2.28t2HTKS12	1910
2.29t2HTKS13	1911
2.30t2HTKS14	1912
2.31t2HTKS15	1913
2.32t2HTKS16	1914
2.33t2HTKS17	1915
2.34t2HTKS18	1916
2.35t2HTKS19	1917
2.36t2HTKS20	1918
2.37t2HTKSE1	1919
2.38t2HTKSE2	1920
2.39t2HTKSF1	1921
2.40t2HTKSF2	1922
2.41t2HTKSF3	1923
2.42t2HTKSF4	1924
2.43t2HTKSZ3	1925
2.44t2HTKS21	1926
2.45t2HTKS22	1927
2.46t2HTKS23	1928
2.47t2HTKS24	1929
2.48t2HTKS25	1930
2.49t2HTKS26	1931
2.50t2HTKS27	1932
2.51t2HTKS28	1933
2.52t2HTKS29	1934
2.53t2HTKS30	1935
2.54t2HTKSS1	1936
2.55t2HTKSS2	1937
2.56t2HTKSS3	1938
2.57t2HTKSRW	1939
2.58t2HTKSS1_miss	1940
2.59t2HTKSS2_miss	1941
2.60t2HTKSS3_miss	1942

3 HTKS Testzeitpunkt 3	1943
3.1 HTKS_Bemerk_1	1943
3.2 t3HTKS_vorhanden	1944
3.3 t3HTKSD	1945
3.4 t3HTKSA1	1946
3.5 t3HTKSA2	1947
3.6 t3HTKSB1	1948
3.7 t3HTKSB2	1949
3.8 t3HTKSB3	1950
3.9 t3HTKSB4	1951
3.10t3HTKSZ1	1952
3.11t3HTKS1	1953
3.12t3HTKS2	1954
3.13t3HTKS3	1955
3.14t3HTKS4	1956
3.15t3HTKS5	1957
3.16t3HTKS6	1958
3.17t3HTKS7	1959
3.18t3HTKS8	1960
3.19t3HTKS9	1961
3.20t3HTKS10	1962
3.21t3HTKSC1	1963
3.22t3HTKSD1	1964
3.23t3HTKSD2	1965
3.24t3HTKSD3	1966
3.25t3HTKSD4	1967
3.26t3HTKSZ2	1968
3.27t3HTKS11	1969
3.28t3HTKS12	1970
3.29t3HTKS13	1971
3.30t3HTKS14	1972
3.31t3HTKS15	1973
3.32t3HTKS16	1974
3.33t3HTKS17	1975
3.34t3HTKS18	1976
3.35t3HTKS19	1977
3.36t3HTKS20	1978

INHALTSVERZEICHNIS

3.37t3HTKSE1	1979
3.38t3HTKSE2	1980
3.39t3HTKSF1	1981
3.40t3HTKSF2	1982
3.41t3HTKSF3	1983
3.42t3HTKSF4	1984
3.43t3HTKSZ3	1985
3.44t3HTKS21	1986
3.45t3HTKS22	1987
3.46t3HTKS23	1988
3.47t3HTKS24	1989
3.48t3HTKS25	1990
3.49t3HTKS26	1991
3.50t3HTKS27	1992
3.51t3HTKS28	1993
3.52t3HTKS29	1994
3.53t3HTKS30	1995
3.54t3HTKSS1	1996
3.55t3HTKSS2	1997
3.56t3HTKSS3	1998
3.57t3HTKSRW	1999
3.58t3HTKSS1_miss	2000
3.59t3HTKSS2_miss	2001
3.60t3HTKSS3_miss	2002

IV LiSe 2003

1 Allgemeine Infos	2003
1.1 Code	2003
1.2 Gebdat	2004
1.3 Gebdat_FDZ	2005
1.4 Kohorte	2006
1.5 LangDaZ	2007
1.6 Lang	2008
1.7 DeuAge	2009
1.8 sex	2010
1.9 Bemerkung	2011
1.10Kita_Gr	2012

INHALTSVERZEICHNIS

1.11Kita_gr2	2013
1.12KitaNr	2014
1.13t1t2lise	2015
1.14t2t3lise	2016
1.15t1t3lise	2017
2 LiSe-DaZ Testzeitpunkt 1	2018
2.1 t1LiSeD	2018
2.2 t1LiSeND	2019
2.3 t1LiSeda	2020
2.4 t1Lise1_Bemerk	2021
2.5 t1Lise2_Bemerk	2022
2.6 t1Lise3_Bemerk	2023
2.7 t1Lise4_Bemerk	2024
2.8 t1_All	2025
2.9 t1v_01	2026
2.10t1v_02	2027
2.11t1v_03	2028
2.12t1v_04	2029
2.13t1v_05	2030
2.14t1v_06	2031
2.15t1v_07	2032
2.16t1v_08	2033
2.17t1v_09	2034
2.18t1v_10	2035
2.19t1v_11	2036
2.20t1v_12	2037
2.21t1v_u1	2038
2.22t1v_u2	2039
2.23t1v_u3	2040
2.24t1v_u4	2041
2.25t1v_RW	2042
2.26t1w_01	2043
2.27t1w_02	2044
2.28t1w_03	2045
2.29t1w_04	2046
2.30t1w_05	2047
2.31t1w_06	2048

INHALTSVERZEICHNIS

2.32t1w_07	.2049
2.33t1w_08	.2050
2.34t1w_09	.2051
2.35t1w_10	.2052
2.36t1w_u1	.2053
2.37t1w_u2	.2054
2.38t1w_RW	.2055
2.39t1ws_01	.2056
2.40t1ws_02	.2057
2.41t1ws_03	.2058
2.42t1ws_04	.2059
2.43t1ws_05	.2060
2.44t1ws_06	.2061
2.45t1ws_07	.2062
2.46t1ws_08	.2063
2.47t1ws_09	.2064
2.48t1ws_10	.2065
2.49t1ws_u1	.2066
2.50t1ws_u2	.2067
2.51t1w_RWs	.2068
2.52t1n_01	.2069
2.53t1n_02	.2070
2.54t1n_03	.2071
2.55t1n_04	.2072
2.56t1n_05	.2073
2.57t1n_06	.2074
2.58t1n_07	.2075
2.59t1n_08	.2076
2.60t1n_09	.2077
2.61t1n_10	.2078
2.62t1n_11	.2079
2.63t1n_12	.2080
2.64t1n_u1	.2081
2.65t1n_u2	.2082
2.66t1n_RW	.2083
2.67t1sk_01	.2084
2.68t1sk_02	.2085

INHALTSVERZEICHNIS

2.69t1sk_03	.2086
2.70t1sk_04	.2087
2.71t1sk_05	.2088
2.72t1sk_06	.2089
2.73t1sk_07	.2090
2.74t1sk_08	.2091
2.75t1sk_09	.2092
2.76t1sk_10	.2093
2.77t1sk_11	.2094
2.78t1sk_12	.2095
2.79t1sk_13	.2096
2.80t1sk_14	.2097
2.81t1sk_15	.2098
2.82t1sk_16	.2099
2.83t1sk_17	.2100
2.84t1sk_18	.2101
2.85t1sk_19	.2102
2.86t1sv_1	.2103
2.87t1sv_2	.2104
2.88t1wk_P	.2105
2.89t1wk_F	.2106
2.90t1wk_V	.2107
2.91t1wk_M	.2108
2.92t1wk_K	.2109
2.93t1ka_1	.2110
2.94t1ka_2	.2111
2.95t1ka_3	.2112
2.96t1ka_4	.2113
2.97t1kd_1	.2114
2.98t1kd_2	.2115
2.99t1kd_3	.2116
2.100t1kd_4	.2117
2.101t1kd_5	.2118
2.102t1sk_4	.2119
2.103t1sk_3	.2120
2.104t1sk_2	.2121
2.105t1sk_1	.2122

INHALTSVERZEICHNIS

2.106	sk_0		.2123
2.107	sk_ESS		.2124
2.108	sv_RW		.2125
2.109	sv_RWQ		.2126
2.110	ka_RW		.2127
2.111	kd_RW		.2128
2.112	k_RW		.2129
2.113	sk_ESa		.2130
2.114	Liseagem		.2131
2.115	LiseNagem		.2132
2.116	DeuKon		.2133
2.117	DeuKonN		.2134
2.118	Lise_Ngr		.2135
2.119	Lise_NNgr		.2136
2.120	Lise_NgrK		.2137
2.121	Lise_NNgrK		.2138
2.122	v_T		.2139
2.123	v_Tb		.2140
2.124	w_T		.2141
2.125	w_Tb		.2142
2.126	w_Ts		.2143
2.127	w_Tsb		.2144
2.128	n_T		.2145
2.129	n_Tb		.2146
2.130	sk_P		.2147
2.131	sk_Pb		.2148
2.132	sv_RWQ_Q		.2149
2.133	sv_RWQ_Qb		.2150
2.134	wkP_T		.2151
2.135	wkP_Tb		.2152
2.136	wkF_T		.2153
2.137	wkF_Tb		.2154
2.138	wkV_T		.2155
2.139	wkV_Tb		.2156
2.140	wkM_T		.2157
2.141	wkM_Tb		.2158
2.142	wkK_T		.2159

INHALTSVERZEICHNIS

2.148	wkK_Tb	.2160
2.149	Kad_T	.2161
2.149	Kad_Tb	.2162
2.149	PVsum	.2163
2.149	EVsum	.2164
2.149	SFsum	.2165
2.149	OFsum	.2166
2.150	AFsum	.2167
2.151	ZNsum	.2168
2.152	nZNsum	.2169
2.153	SSESHSV	.2170
2.154	SSESHSV_b	.2171
2.155	SSESHSP	.2172
2.156	SSESHSP_b	.2173
2.157	SSESH	.2174
2.158	SSESH_b	.2175
2.159	SSES	.2176
2.160	SSES3	.2177
2.161	SSES_bm	.2178
2.162	SSES3_bm	.2179
2.163	kd_io	.2180
2.164	kd_p	.2181
2.165	Foe_Sk	.2182
2.166	Foe_P	.2183
2.167	Foe_F	.2184
2.168	Foe_VV	.2185
2.169	Foe_MV	.2186
2.170	Foe_K	.2187
2.171	Foe_A	.2188
2.172	Foe_D	.2189
2.173	Foe_PV	.2190
2.174	Foe_EV	.2191
2.175	Foe_SF	.2192
2.176	Foe_OF	.2193
2.177	Foe_AF	.2194
2.178	Foe_ZN	.2195
2.179	Foe_nZN	.2196

3 LiSe-DaZ Testzeitpunkt 2	2197
3.1 t2Liseagem	2197
3.2 t2LiseNagem	2198
3.3 t2LiSeD	2199
3.4 t2LiSeND	2200
3.5 t2LiSeda	2201
3.6 t2Lise1_Bemerk	2202
3.7 t2Lise2_Bemerk	2203
3.8 t2Lise3_Bemerk	2204
3.9 t2Lise4_Bemerk	2205
3.10t2_All	2206
3.11t2v_01	2207
3.12t2v_02	2208
3.13t2v_03	2209
3.14t2v_04	2210
3.15t2v_05	2211
3.16t2v_06	2212
3.17t2v_07	2213
3.18t2v_08	2214
3.19t2v_09	2215
3.20t2v_10	2216
3.21t2v_11	2217
3.22t2v_12	2218
3.23t2v_u1	2219
3.24t2v_u2	2220
3.25t2v_u3	2221
3.26t2v_u4	2222
3.27t2v_RW	2223
3.28t2w_01	2224
3.29t2w_02	2225
3.30t2w_03	2226
3.31t2w_04	2227
3.32t2w_05	2228
3.33t2w_06	2229
3.34t2w_07	2230
3.35t2w_08	2231
3.36t2w_09	2232

INHALTSVERZEICHNIS

3.37t2w_10	.2233
3.38t2w_u1	.2234
3.39t2w_u2	.2235
3.40t2w_RW	.2236
3.41t2ws_01	.2237
3.42t2ws_02	.2238
3.43t2ws_03	.2239
3.44t2ws_04	.2240
3.45t2ws_05	.2241
3.46t2ws_06	.2242
3.47t2ws_07	.2243
3.48t2ws_08	.2244
3.49t2ws_09	.2245
3.50t2ws_10	.2246
3.51t2ws_u1	.2247
3.52t2ws_u2	.2248
3.53t2w_RWs	.2249
3.54t2n_01	.2250
3.55t2n_02	.2251
3.56t2n_03	.2252
3.57t2n_04	.2253
3.58t2n_05	.2254
3.59t2n_06	.2255
3.60t2n_07	.2256
3.61t2n_08	.2257
3.62t2n_09	.2258
3.63t2n_10	.2259
3.64t2n_11	.2260
3.65t2n_12	.2261
3.66t2n_u1	.2262
3.67t2n_u2	.2263
3.68t2n_RW	.2264
3.69t2sk_01	.2265
3.70t2sk_02	.2266
3.71t2sk_03	.2267
3.72t2sk_04	.2268
3.73t2sk_05	.2269

INHALTSVERZEICHNIS

3.74t2sk_06	.2270
3.75t2sk_07	.2271
3.76t2sk_08	.2272
3.77t2sk_09	.2273
3.78t2sk_10	.2274
3.79t2sk_11	.2275
3.80t2sk_12	.2276
3.81t2sk_13	.2277
3.82t2sk_14	.2278
3.83t2sk_15	.2279
3.84t2sk_16	.2280
3.85t2sk_17	.2281
3.86t2sk_18	.2282
3.87t2sk_19	.2283
3.88t2sv_1	.2284
3.89t2sv_2	.2285
3.90t2wk_P	.2286
3.91t2wk_F	.2287
3.92t2wk_V	.2288
3.93t2wk_M	.2289
3.94t2wk_K	.2290
3.95t2ka_1	.2291
3.96t2ka_2	.2292
3.97t2ka_3	.2293
3.98t2ka_4	.2294
3.99t2kd_1	.2295
3.100t2kd_2	.2296
3.101t2kd_3	.2297
3.102t2kd_4	.2298
3.103t2kd_5	.2299
3.104t2sk_4	.2300
3.105t2sk_3	.2301
3.106t2sk_2	.2302
3.107t2sk_1	.2303
3.108t2sk_0	.2304
3.109t2sk_ESS	.2305
3.110t2sv_RW	.2306

INHALTSVERZEICHNIS

3.1112sv_RWQ	.2307
3.112ka_RW	.2308
3.112kd_RW	.2309
3.112k_RW	.2310
3.112sk_ESa	.2311
3.112DeuKon	.2312
3.112DeuKonN	.2313
3.112Lise_Ngr	.2314
3.112Lise_NNgr	.2315
3.122Lise_NgrK	.2316
3.122Lise_NNgrK	.2317
3.122v_T	.2318
3.122v_Tb	.2319
3.122w_T	.2320
3.122w_Tb	.2321
3.122w_Ts	.2322
3.122w_Tsb	.2323
3.122n_T	.2324
3.122n_Tb	.2325
3.132sk_P	.2326
3.132sk_Pb	.2327
3.132sv_RWQ_Q	.2328
3.132sv_RWQ_Qb	.2329
3.132wkP_T	.2330
3.132wkP_Tb	.2331
3.132wkF_T	.2332
3.132wkF_Tb	.2333
3.132wkV_T	.2334
3.132wkV_Tb	.2335
3.142wkM_T	.2336
3.142wkM_Tb	.2337
3.142wkK_T	.2338
3.142wkK_Tb	.2339
3.142Kad_T	.2340
3.142Kad_Tb	.2341
3.142PVsum	.2342
3.142EVsum	.2343

INHALTSVERZEICHNIS

3.142SFsum	.2344
3.142OFsum	.2345
3.152AFsum	.2346
3.152ZNsum	.2347
3.152nZNsum	.2348
3.152SSESHSV	.2349
3.152SSESHSV_b	.2350
3.152SSESHSP	.2351
3.152SSESHSP_b	.2352
3.152SSESH	.2353
3.152SSESH_b	.2354
3.152SSES	.2355
3.162SSES_b	.2356
3.162SSES3	.2357
3.162SSES3_b	.2358
3.162SSES_bm	.2359
3.162SSES3_bm	.2360
3.162kd_io	.2361
3.162kd_p	.2362
3.162Foe_Sk	.2363
3.162Foe_P	.2364
3.162Foe_F	.2365
3.172Foe_VV	.2366
3.172Foe_MV	.2367
3.172Foe_K	.2368
3.172Foe_A	.2369
3.172Foe_D	.2370
3.172Foe_PV	.2371
3.172Foe_EV	.2372
3.172Foe_SF	.2373
3.172Foe_OF	.2374
3.172Foe_AF	.2375
3.182Foe_ZN	.2376
3.182Foe_nZN	.2377
4 LiSe-DaZ Testzeitpunkt 3	.2378
4.1 t3LiSeD	.2378
4.2 t3LiSeda	.2379

INHALTSVERZEICHNIS

4.3 t3LiSeND	.2380
4.4 t3Lise1_Bemerk	.2381
4.5 t3Lise2_Bemerk	.2382
4.6 t3Lise4_Bemerk	.2383
4.7 t3All	.2384
4.8 t3MZIP	.2385
4.9 t3v_01	.2386
4.10t3v_02	.2387
4.11t3v_03	.2388
4.12t3v_04	.2389
4.13t3v_05	.2390
4.14t3v_06	.2391
4.15t3v_07	.2392
4.16t3v_08	.2393
4.17t3v_09	.2394
4.18t3v_10	.2395
4.19t3v_11	.2396
4.20t3v_12	.2397
4.21t3v_u1	.2398
4.22t3v_u2	.2399
4.23t3v_u3	.2400
4.24t3v_u4	.2401
4.25t3v_RW	.2402
4.26t3w_01	.2403
4.27t3w_02	.2404
4.28t3w_03	.2405
4.29t3w_04	.2406
4.30t3w_05	.2407
4.31t3w_06	.2408
4.32t3w_07	.2409
4.33t3w_08	.2410
4.34t3w_09	.2411
4.35t3w_10	.2412
4.36t3w_u1	.2413
4.37t3w_u2	.2414
4.38t3w_RW	.2415
4.39t3ws_01	.2416

INHALTSVERZEICHNIS

4.40t3ws_02	.2417
4.41t3ws_03	.2418
4.42t3ws_04	.2419
4.43t3ws_05	.2420
4.44t3ws_06	.2421
4.45t3ws_07	.2422
4.46t3ws_08	.2423
4.47t3ws_09	.2424
4.48t3ws_10	.2425
4.49t3ws_u1	.2426
4.50t3ws_u2	.2427
4.51t3w_RWs	.2428
4.52t3n_01	.2429
4.53t3n_02	.2430
4.54t3n_03	.2431
4.55t3n_04	.2432
4.56t3n_05	.2433
4.57t3n_06	.2434
4.58t3n_07	.2435
4.59t3n_08	.2436
4.60t3n_09	.2437
4.61t3n_10	.2438
4.62t3n_11	.2439
4.63t3n_12	.2440
4.64t3n_u1	.2441
4.65t3n_u2	.2442
4.66t3n_RW	.2443
4.67t3sk_01	.2444
4.68t3sk_02	.2445
4.69t3sk_03	.2446
4.70t3sk_04	.2447
4.71t3sk_05	.2448
4.72t3sk_06	.2449
4.73t3sk_07	.2450
4.74t3sk_08	.2451
4.75t3sk_09	.2452
4.76t3sk_10	.2453

INHALTSVERZEICHNIS

4.77t3sk_11	.2454
4.78t3sk_12	.2455
4.79t3sk_13	.2456
4.80t3sk_14	.2457
4.81t3sk_15	.2458
4.82t3sk_16	.2459
4.83t3sk_17	.2460
4.84t3sk_18	.2461
4.85t3sk_19	.2462
4.86t3sv_1	.2463
4.87t3sv_2	.2464
4.88t3wk_P	.2465
4.89t3wk_F	.2466
4.90t3wk_V	.2467
4.91t3wk_M	.2468
4.92t3wk_K	.2469
4.93t3ka_1	.2470
4.94t3ka_2	.2471
4.95t3ka_3	.2472
4.96t3ka_4	.2473
4.97t3kd_1	.2474
4.98t3kd_2	.2475
4.99t3kd_3	.2476
4.100t3kd_4	.2477
4.101t3kd_5	.2478
4.102t3sk_4	.2479
4.103t3sk_3	.2480
4.104t3sk_2	.2481
4.105t3sk_1	.2482
4.106t3sk_0	.2483
4.107t3sk_ESS	.2484
4.108t3sv_RW	.2485
4.109t3sv_RWQ	.2486
4.110t3ka_RW	.2487
4.111t3kd_RW	.2488
4.112t3k_RW	.2489
4.113t3sk_ESa	.2490

INHALTSVERZEICHNIS

4.114Liseagem	.2491
4.115LiseNagem	.2492
4.116DeuKon	.2493
4.117DeuKonN	.2494
4.118Lise_2J	.2495
4.119Lise_Ngr	.2496
4.120Lise_NNgr	.2497
4.121Lise_NgrK	.2498
4.122Lise_NNgrK	.2499
4.123v_T	.2500
4.124v_Tb	.2501
4.125w_T	.2502
4.126w_Tb	.2503
4.127w_Ts	.2504
4.128w_Tsb	.2505
4.129n_T	.2506
4.130n_Tb	.2507
4.1313sk_P	.2508
4.1323sk_Pb	.2509
4.133sv_RWQ_Q	.2510
4.134sv_RWQ_Qb	.2511
4.135wkP_T	.2512
4.136wkP_Tb	.2513
4.137wkF_T	.2514
4.138wkF_Tb	.2515
4.139wkV_T	.2516
4.140wkV_Tb	.2517
4.141wkM_T	.2518
4.142wkM_Tb	.2519
4.143wkK_T	.2520
4.144wkK_Tb	.2521
4.145Kad_T	.2522
4.146Kad_Tb	.2523
4.147PVsum	.2524
4.148EVsum	.2525
4.149SFsum	.2526
4.150OFsum	.2527

INHALTSVERZEICHNIS

4.1513AFsum	.2528
4.1523ZNsum	.2529
4.1533nZNsum	.2530
4.1543SSESHSV	.2531
4.1553SSESHSV_b	.2532
4.1563SSESHSP	.2533
4.1573SSESHSP_b	.2534
4.1583SSESH	.2535
4.1593SSESH_b	.2536
4.1603SSES	.2537
4.1613SSES_bm	.2538
4.1623SSES3	.2539
4.1633SSES3_bm	.2540
V SET	2541
1 SET Testzeitpunkt 1	2541
1.1 Code	.2541
1.2 t1SETD	.2542
1.3 t1SETND	.2543
1.4 t1SETh_vorh	.2544
1.5 t1SETh_Bemerk	.2545
1.6 t1SETb_vorh	.2546
1.7 t1SETb_Bemerk	.2547
1.8 t1SETp_vorh	.2548
1.9 t1SETp_Bemerk	.2549
1.10t1SETs_vorh	.2550
1.11t1SETs_Bemerk	.2551
1.12t1SETs_Abbruch	.2552
1.13t1s_01b	.2553
1.14t1s_02b	.2554
1.15t1s_03b	.2555
1.16t1s_04b	.2556
1.17t1s_05b	.2557
1.18t1s_06b	.2558
1.19t1s_07b	.2559
1.20t1s_08b	.2560
1.21t1s_09b	.2561

INHALTSVERZEICHNIS

1.22t1s_10b	.2562
1.23t1s_11b	.2563
1.24t1s_12b	.2564
1.25t1SETb01	.2565
1.26t1SETb02	.2566
1.27t1SETb03	.2567
1.28t1SETb04	.2568
1.29t1SETb05	.2569
1.30t1SETb06	.2570
1.31t1SETb07	.2571
1.32t1SETb08	.2572
1.33t1seth01	.2573
1.34t1seth02	.2574
1.35t1seth03	.2575
1.36t1seth04	.2576
1.37t1seth05	.2577
1.38t1seth06	.2578
1.39t1seth07	.2579
1.40t1seth08	.2580
1.41t1seth09	.2581
1.42t1seth10	.2582
1.43t1seth11	.2583
1.44t1seth12	.2584
1.45t1sethu1	.2585
1.46t1sethu2	.2586
1.47t1setpr1	.2587
1.48t1setpr2	.2588
1.49t1setpr3	.2589
1.50t1setpr4	.2590
1.51t1setpr5	.2591
1.52t1setpr6	.2592
1.53t1setpr7	.2593
1.54t1setpr8	.2594
1.55t1setpr9	.2595
1.56t1setpp1	.2596
1.57t1setpp2	.2597
1.58t1setpp3	.2598

INHALTSVERZEICHNIS

1.59t1setpp4	.2599
1.60t1setpp5	.2600
1.61t1setpp6	.2601
1.62t1setpp7	.2602
1.63t1setpp8	.2603
1.64t1setpp9	.2604
1.65t1h_RW	.2605
1.66t1s_RW	.2606
1.67t1pr_RW	.2607
1.68t1pp_RW	.2608
1.69bg_01	.2609
1.70bg_02	.2610
1.71bg_03	.2611
1.72bg_04	.2612
1.73bg_05	.2613
1.74t1bg_RWm	.2614
1.75t1bg_RW	.2615
1.76t1SETagem	.2616
1.77t1SETNagem	.2617
1.78t1SET_Ngr	.2618
1.79t1SET_NNgr	.2619
1.80t1sp_sum	.2620
1.81t1h_T	.2621
1.82t1s_T	.2622
1.83t1sp_T	.2623
1.84t1bg_T	.2624
2 SET Testzeitpunkt 2	2625
2.1 t2SETD	.2625
2.2 t2SETND	.2626
2.3 t2SET_Bemerk	.2627
2.4 t2SETh_vorh	.2628
2.5 t2SETh_Bemerk	.2629
2.6 t2SETb_vorh	.2630
2.7 t2SETb_Bemerk	.2631
2.8 t2SETs_vorh	.2632
2.9 t2SETs_Bemerk	.2633
2.10t2SETp_vorh	.2634

INHALTSVERZEICHNIS

2.11t2SETp_Bemerk	.2635
2.12t2SETs_Abbruch	.2636
2.13t2sets01	.2637
2.14t2sets02	.2638
2.15t2sets03	.2639
2.16t2sets04	.2640
2.17t2sets05	.2641
2.18t2sets06	.2642
2.19t2sets07	.2643
2.20t2sets08	.2644
2.21t2sets09	.2645
2.22t2sets10	.2646
2.23t2sets11	.2647
2.24t2sets12	.2648
2.25t2SETb_BemerkA	.2649
2.26t2SETb01	.2650
2.27t2SETb02	.2651
2.28t2SETb03	.2652
2.29t2SETb04	.2653
2.30t2SETb05	.2654
2.31t2SETb06	.2655
2.32t2SETb07	.2656
2.33t2SETb08	.2657
2.34t2seth01	.2658
2.35t2seth02	.2659
2.36t2seth03	.2660
2.37t2seth04	.2661
2.38t2seth05	.2662
2.39t2seth06	.2663
2.40t2seth07	.2664
2.41t2seth08	.2665
2.42t2seth09	.2666
2.43t2seth10	.2667
2.44t2seth11	.2668
2.45t2seth12	.2669
2.46t2sethu1	.2670
2.47t2sethu2	.2671

INHALTSVERZEICHNIS

2.48t2setpr1	.2672
2.49t2setpr2	.2673
2.50t2setpr3	.2674
2.51t2setpr4	.2675
2.52t2setpr5	.2676
2.53t2setpr6	.2677
2.54t2setpr7	.2678
2.55t2setpr8	.2679
2.56t2setpr9	.2680
2.57t2setpp1	.2681
2.58t2setpp2	.2682
2.59t2setpp3	.2683
2.60t2setpp4	.2684
2.61t2setpp5	.2685
2.62t2setpp6	.2686
2.63t2setpp7	.2687
2.64t2setpp8	.2688
2.65t2setpp9	.2689
2.66t2h_RW	.2690
2.67t2s_RW	.2691
2.68t2pr_RW	.2692
2.69t2pp_RW	.2693
2.70t2bg_01	.2694
2.71t2bg_02	.2695
2.72t2bg_03	.2696
2.73t2bg_04	.2697
2.74t2bg_05	.2698
2.75t2bg_RWm	.2699
2.76t2bg_RW	.2700
2.77t2SETagem	.2701
2.78t2SETNagem	.2702
2.79t2SET_Ngr	.2703
2.80t2SET_NNgr	.2704
2.81t2sp_sum	.2705
2.82t2h_T	.2706
2.83t2s_T	.2707
2.84t2sp_T	.2708

2.85t2bg_T	.2709
3 SET Testzeitpunkt 3	2710
3.1 t3SETD	.2710
3.2 t3SETND	.2711
3.3 t3SETND2	.2712
3.4 t3SETh_vorh	.2713
3.5 t3SETh_Bemerk	.2714
3.6 t3SETb_vorh	.2715
3.7 t3SETb_Bemerk	.2716
3.8 t3SETs_vorh	.2717
3.9 t3SETs_Bemerk	.2718
3.10t3SETp_vorh	.2719
3.11t3SETp_Bemerk	.2720
3.12t3SETs_Abbruch	.2721
3.13t3sets01	.2722
3.14t3sets02	.2723
3.15t3sets03	.2724
3.16t3sets04	.2725
3.17t3sets05	.2726
3.18t3sets06	.2727
3.19t3sets07	.2728
3.20t3sets08	.2729
3.21t3sets09	.2730
3.22t3sets10	.2731
3.23t3sets11	.2732
3.24t3sets12	.2733
3.25t3SETb_BemerkA	.2734
3.26t3SETb01	.2735
3.27t3SETb02	.2736
3.28t3SETb03	.2737
3.29t3SETb04	.2738
3.30t3SETb05	.2739
3.31t3SETb06	.2740
3.32t3SETb07	.2741
3.33t3SETb08	.2742
3.34t3seth01	.2743
3.35t3seth02	.2744

INHALTSVERZEICHNIS

3.36t3seth03	.2745
3.37t3seth04	.2746
3.38t3seth05	.2747
3.39t3seth06	.2748
3.40t3seth07	.2749
3.41t3seth08	.2750
3.42t3seth09	.2751
3.43t3seth10	.2752
3.44t3seth11	.2753
3.45t3seth12	.2754
3.46t3sethu1	.2755
3.47t3sethu2	.2756
3.48t3setpr1	.2757
3.49t3setpr2	.2758
3.50t3setpr3	.2759
3.51t3setpr4	.2760
3.52t3setpr5	.2761
3.53t3setpr6	.2762
3.54t3setpr7	.2763
3.55t3setpr8	.2764
3.56t3setpr9	.2765
3.57t3setpp1	.2766
3.58t3setpp2	.2767
3.59t3setpp3	.2768
3.60t3setpp4	.2769
3.61t3setpp5	.2770
3.62t3setpp6	.2771
3.63t3setpp7	.2772
3.64t3setpp8	.2773
3.65t3setpp9	.2774
3.66t3h_RW	.2775
3.67t3s_RW	.2776
3.68t3pr_RW	.2777
3.69t3pp_RW	.2778
3.70t3bg_01	.2779
3.71t3bg_02	.2780
3.72t3bg_03	.2781

INHALTSVERZEICHNIS

3.73t3bg_04	.2782
3.74t3bg_05	.2783
3.75t3bg_RWm	.2784
3.76t3bg_RW	.2785
3.77t3SETagem	.2786
3.78t3SETNagem	.2787
3.79t3SET_Ngr	.2788
3.80t3SET_NNgr	.2789
3.81t3sp_sum	.2790
3.82t3h_T	.2791
3.83t3s_T	.2792
3.84t3sp_T	.2793
3.85t3bg_T	.2794
VI Testdatensatz	2795
1 T4 ELFE	2795
1.1 Code	.2795
1.2 t4elf_dat	.2796
1.3 t4_Schulbeginn	.2797
1.4 t4elfe2_Bemerk	.2798
1.5 t4elfe3_Bemerk	.2799
1.6 t4elfe2_vorhanden	.2800
1.7 t4elfe3_vorhanden	.2801
1.8 t4elfe2_1	.2802
1.9 t4elfe2_2	.2803
1.10t4elfe2_3	.2804
1.11t4elfe2_4	.2805
1.12t4elfe2_5	.2806
1.13t4elfe2_6	.2807
1.14t4elfe2_7	.2808
1.15t4elfe2_8	.2809
1.16t4elfe2_9	.2810
1.17t4elfe2_10	.2811
1.18t4elfe2_11	.2812
1.19t4elfe2_12	.2813
1.20t4elfe2_13	.2814
1.21t4elfe2_14	.2815

INHALTSVERZEICHNIS

1.22t4elfe2_15	.2816
1.23t4elfe2_16	.2817
1.24t4elfe2_17	.2818
1.25t4elfe2_18	.2819
1.26t4elfe2_19	.2820
1.27t4elfe2_20	.2821
1.28t4elfe2_21	.2822
1.29t4elfe2_22	.2823
1.30t4elfe2_23	.2824
1.31t4elfe2_24	.2825
1.32t4elfe2_25	.2826
1.33t4elfe2_26	.2827
1.34t4elfe2_27	.2828
1.35t4elfe2_28	.2829
1.36t4elfe2_29	.2830
1.37t4elfe2_30	.2831
1.38t4elfe2_31	.2832
1.39t4elfe2_32	.2833
1.40t4elfe2_33	.2834
1.41t4elfe2_34	.2835
1.42t4elfe2_35	.2836
1.43t4elfe2_36	.2837
1.44t4elfe3_1	.2838
1.45t4elfe3_2	.2839
1.46t4elfe3_3	.2840
1.47t4elfe3_4	.2841
1.48t4elfe3_5	.2842
1.49t4elfe3_6	.2843
1.50t4elfe3_7	.2844
1.51t4elfe3_8	.2845
1.52t4elfe3_9	.2846
1.53t4elfe3_10	.2847
1.54t4elfe3_11	.2848
1.55t4elfe3_12	.2849
1.56t4elfe3_13	.2850
1.57t4elfe3_14	.2851
1.58t4elfe3_15	.2852

INHALTSVERZEICHNIS

1.59t4elfe3_16	.2853
1.60t4elfe3_17	.2854
1.61t4elfe3_18	.2855
1.62t4elfe3_19	.2856
1.63t4elfe3_20	.2857
1.64t4elfe3_21	.2858
1.65t4elfe3_22	.2859
1.66t4elfe3_23	.2860
1.67t4elfe3_24	.2861
1.68t4elfe3_25	.2862
1.69t4elfe3_26	.2863
1.70t4elf2rw_pc	.2864
1.71t4elf3rw_pc	.2865
1.72t4elfM	.2866
1.73t4elfNgr_Rueck	.2867
1.74t4elfNgr	.2868
1.75t4elf2rt	.2869
1.76t4elf3rt	.2870
1.77t4elf2bt	.2871
1.78t4elf3bt	.2872
1.79t4elf2miss	.2873
1.80t4elf3miss	.2874
1.81t4elf2bi	.2875
1.82t4elf3bi	.2876
1.83t4elf2RWsK	.2877
1.84t4elf3RWsK	.2878
1.85t4elf2RWs	.2879
1.86t4elf3RWs	.2880
1.87t4elf2rp	.2881
1.88t4elf3rp	.2882
1.89t4elf2bp	.2883
1.90t4elf3bp	.2884
1.91t4Diff23	.2885
1.92t4Diff23Vz	.2886
1.93t4Dis10	.2887
1.94t4Dis05	.2888
1.95t4DisGR	.2889

INHALTSVERZEICHNIS

1.96t4Diff2	.2890
1.97t4Diff3	.2891
1.98t4AS2	.2892
1.99t4AS3	.2893
1.100t4AS2d10	.2894
1.101t4AS3d10	.2895
1.102t4AS2d05	.2896
1.103t4AS3d05	.2897
2 T4 WURT	.2898
2.1 t4wurt_dat	.2898
2.2 t4wurt_Bemerk	.2899
2.3 t4wurt_vorhanden	.2900
2.4 t4wurt1_1	.2901
2.5 t4wurt1_2	.2902
2.6 t4wurt1_3	.2903
2.7 t4wurt1_4	.2904
2.8 t4wurt1_5	.2905
2.9 t4wurt1_6	.2906
2.10t4wurt1_7	.2907
2.11t4wurt1_8	.2908
2.12t4wurt1_9	.2909
2.13t4wurt1_RW	.2910
2.14t4wurt2_1	.2911
2.15t4wurt2_2	.2912
2.16t4wurt2_3	.2913
2.17t4wurt2_4	.2914
2.18t4wurt2_5	.2915
2.19t4wurt2_6	.2916
2.20t4wurt2_7	.2917
2.21t4wurt2_8	.2918
2.22t4wurt2_9	.2919
2.23t4wurt2_10	.2920
2.24t4wurt2_RW	.2921
2.25t4wurt3_1	.2922
2.26t4wurt3_2	.2923
2.27t4wurt3_3	.2924
2.28t4wurt3_4	.2925

INHALTSVERZEICHNIS

2.29t4wurt3_5	.2926
2.30t4wurt3_6	.2927
2.31t4wurt3_7	.2928
2.32t4wurt3_8	.2929
2.33t4wurt3_9	.2930
2.34t4wurt3_RW	.2931
2.35t4wurt4_1	.2932
2.36t4wurt4_2	.2933
2.37t4wurt4_3	.2934
2.38t4wurt4_4	.2935
2.39t4wurt4_5	.2936
2.40t4wurt4_6	.2937
2.41t4wurt4_7	.2938
2.42t4wurt4_8	.2939
2.43t4wurt4_RW	.2940
2.44t4wurt_ZrW	.2941
2.45t4wurt_ZrW_PR	.2942
2.46t4wurt_ZrW_T	.2943
2.47t4wurt_A	.2944
2.48t4wurt_H	.2945
2.49t4wurt_LV	.2946
2.50t4wurt_U	.2947
2.51t4wurt_SW	.2948
2.52t4wurt_GK	.2949
2.53t4wurt_LF	.2950
2.54t4wurt_AW	.2951
2.55t4wurt_R	.2952
2.56t4wurt_AFoer	.2953
2.57t4wurt_HFoer	.2954
2.58t4wurt_LVFoer	.2955
2.59t4wurt_UFoer	.2956
2.60t4wurt_LfFoer	.2957
2.61t4wurt_group	.2958
2.62t4wurtMi	.2959
2.63t4wurtMe	.2960
2.64t4wurtNa	.2961
2.65t4wurt_ZrW_TB	.2962

INHALTSVERZEICHNIS

2.66t4wurt1_ABI	.2963
2.67t4wurt2_ABI	.2964
2.68t4wurt3_ABI	.2965
2.69t4wurt4_ABI	.2966
2.70t4wurt_ABI	.2967
2.71t4wurt1_miss	.2968
2.72t4wurt2_miss	.2969
2.73t4wurt3_miss	.2970
2.74t4wurt4_miss	.2971
2.75t4wurt_miss	.2972
3 T4 NFC	.2973
3.1 t4nfc_testdat	.2973
3.2 t4nfc_Bemerk	.2974
3.3 t4nfc_1	.2975
3.4 t4nfc_2	.2976
3.5 t4nfc_3	.2977
3.6 t4nfc_4	.2978
3.7 t4nfc_5	.2979
3.8 t4nfc_6	.2980
3.9 t4nfc_7	.2981
3.10t4nfc_8	.2982
3.11t4nfc_9	.2983
3.12t4nfc_10	.2984
3.13t4nfc_11	.2985
3.14t4nfc_12	.2986
3.15t4nfc_13	.2987
3.16t4nfc_14	.2988
3.17t4nfc_miss	.2989
3.18NFC_auswertung	.2990
3.19NFC_rw	.2991
3.20NFC_PR	.2992
3.21NFC_T	.2993
4 T4 DILE-D	.2994
4.1 t4dileDat	.2994
4.2 t4dile_Bemerk	.2995
4.3 t4dile1_vorhanden	.2996
4.4 t4dile2_vorhanden	.2997

INHALTSVERZEICHNIS

4.5 t4dile1_W	.2998
4.6 t4dile1_F	.2999
4.7 t4dile1_A	.3000
4.8 t4dile1_K	.3001
4.9 t4dile1_RW	.3002
4.10t4dile2_W	.3003
4.11t4dile2_F	.3004
4.12t4dile2_A	.3005
4.13t4dile2_K	.3006
4.14t4dile2_RW	.3007
4.15t4dil1zG	.3008
4.16t4dil1z	.3009
4.17t4dil1zb	.3010
4.18t4dil2zG	.3011
4.19t4dil2z	.3012
4.20t4dil2zb	.3013
4.21t4dil1PG	.3014
4.22t4dil1P	.3015
4.23t4dil1Pb	.3016
4.24t4dil2PG	.3017
4.25t4dil2P	.3018
4.26t4dil2Pb	.3019
4.27t4dil1_TnG	.3020
4.28t4dil2_TnG	.3021
4.29t4dil1_Tn	.3022
4.30t4dil2_Tn	.3023
4.31t4dil1_Tnb	.3024
4.32t4dil2_Tnb	.3025
VII Anhang	3026
Literaturverzeichnis	3026
Abkürzungsverzeichnis	3027

I Teachers

1 Allgemeine Infos

1.1 ProbandenID

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: ProbandenID

Label: ProbandenID

Variablentyp: Zeichenfolge

1.2 ProbGruppe

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: ProbGruppe

Label: Probandengruppe

Kategorien: 1 = *EG1_FF*; 2 = *EG1_WI*; 3 = *EG2*; 4 = *KG*

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	EG1_FF	21.7	21.7
2	EG1_WI	29.0	29.0
3	EG2	26.1	26.1
4	KG	23.2	23.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.3 TandemNr

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: TandemNr

Label: Nummer des Tandems

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	(kein Label vergeben)	2.9	2.9
2	(kein Label vergeben)	4.3	4.3
3	(kein Label vergeben)	4.3	4.3
4	(kein Label vergeben)	10.1	10.1
5	(kein Label vergeben)	4.3	4.3
6	(kein Label vergeben)	8.7	8.7
7	(kein Label vergeben)	5.8	5.8
8	(kein Label vergeben)	10.1	10.1
9	(kein Label vergeben)	5.8	5.8
10	(kein Label vergeben)	11.6	11.6
11	(kein Label vergeben)	1.4	1.4
12	(kein Label vergeben)	4.3	4.3
13	(kein Label vergeben)	7.2	7.2
14	(kein Label vergeben)	10.1	10.1
15	(kein Label vergeben)	2.9	2.9
16	(kein Label vergeben)	5.8	5.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.4 PraePost

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: PraePost

Label: Vollstaendigkeit

Kategorien: 0 = *unvollstaendig*; 1 = *vollstaendig*

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unvollstaendig	42.0	42.0
1	vollstaendig	58.0	58.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2 Wissen

2.1 TN_M1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: TN_M1
 Label: Fortbildung_1
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
TN_M1	53	0.75	0.43

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-99	missing	—	23.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 53$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.2 TN_M2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: TN_M2
 Label: Fortbildung_2
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
TN_M2	53	0.89	0.32

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-99	missing	–	23.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 53$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.3 TN_M3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: TN_M3
 Label: Fortbildung_3
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
TN_M3	53	0.66	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-99	missing	–	23.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 53$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.4 TN_M4_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: TN_M4_1
 Label: Fortbildung_4_1
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
TN_M4_1	53	0.55	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-99	missing	–	23.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 53$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.5 TN_M4_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: TN_M4_2
 Label: Fortbildung_4_2
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
TN_M4_2	53	0.62	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-99	missing	–	23.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 53$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.6 TN_M5_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: TN_M5_1
 Label: Fortbildung_5_1
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
TN_M5_1	53	0.49	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-99	missing	–	23.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 53$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.7 TN_M5_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: TN_M5_2
 Label: Fortbildung_5_2
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
TN_M5_2	53	0.62	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-99	missing	–	23.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 53$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

I TEACHERS

2 WISSEN

2.8 TN_erfuellt

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: TN_erfuellt
Label: Anwesenheit erfuehlt?
Kategorien: 0–1
Fehlende Werte: -99 = *missing*

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	(kein Label vergeben)	17.0	13.0
1	(kein Label vergeben)	83.0	63.8
-99	missing	–	23.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{\text{valid}} = 53$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{\text{total}} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

I TEACHERS

2 WISSEN

2.9 LehrErz

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: LehrErz

Label: Berufsgruppe

Kategorien: 1 = *Lehrkraft*; 2 = *ErzieherIn*

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Lehrkraft	44.9	44.9
2	ErzieherIn	55.1	55.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

I TEACHERS

2 WISSEN

2.10 Sc_xWissen

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sc_xWissen

Label: WISSEN

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
Sc_xWissen	69	0.40	0.19	0.0	0.8

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.

N_{total} = 69.

2.11 Sc_xlingWissen

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sc_xlingWissen

Label: linguistisches Wissen

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
Sc_xlingWissen	69	0.42	0.25	-0.1	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.

N_{total} = 69.

2.12 Sc_xpraxWissen

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sc_xpraxWissen

Label: anwendungsbezogenes Wissen

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
Sc_xpraxWissen	69	0.38	0.18	-0.0	0.8

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.

N_{total} = 69.

2.13 Sc_xKoennen

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sc_xKoennen

Label: KOENNEN

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
Sc_xKoennen	69	0.22	0.14	-0.1	0.6

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.

N_{total} = 69.

2.14 Sc_xGesamt

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sc_xGesamt

Label: Gesamtscore SprachKoPF

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
Sc_xGesamt	69	0.31	0.13	-0.0	0.6

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

I TEACHERS

2 WISSEN

2.15 Sc_xWissen35

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sc_xWissen35

Label: WISSEN (35 Items)

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
Sc_xWissen35	69	0.41	0.24	-0.0	0.9

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

2.16 Sc_Wissen_ling_35

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sc_Wissen_ling_35

Label: linguistisches Wissen (Kurzversion)

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
Sc_Wissen_ling_35	69	0.45	0.30	-0.1	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.

N_{total} = 69.

2.17 Sc_Wissen_prax_35

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sc_Wissen_prax_35

Label: anwendungsbezogenes Wissen (Kurzversion)

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
Sc_Wissen_prax_35	69	0.37	0.23	-0.1	0.8

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

I TEACHERS

2 WISSEN

2.18 pSc_xWissen_Post

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSc_xWissen_Post

Label: WISSEN (Post)

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pSc_xWissen_Post	44	0.47	0.18	0.1	0.9

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

2.19 pSc_xlingWissen_Post

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSc_xlingWissen_Post

Label: linguistisches Wissen (Post)

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pSc_xlingWissen_Post	44	0.48	0.21	0.1	0.9

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.

N_{total} = 69.

I TEACHERS

2 WISSEN

2.20 pSc_xpraxWissen_Post

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSc_xpraxWissen_Post

Label: anwendungsbezogenes Wissen (Post)

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pSc_xpraxWissen_Post	44	0.46	0.20	0.0	0.9

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

2.21 pSc_xKoennen_Post

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSc_xKoennen_Post

Label: KOeNNEN (Post)

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pSc_xKoennen_Post	43	0.30	0.15	-0.1	0.6

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.

N_{total} = 69.

2.22 pSc_xGesamt_Post

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSc_xGesamt_Post

Label: Gesamtscore SprachKoPF (Post)

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pSc_xGesamt_Post	43	0.40	0.15	0.1	0.7

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

I TEACHERS

2 WISSEN

2.23 pSc_xWissen35_Post

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSc_xWissen35_Post

Label: WISSEN (35 Items) (Post)

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pSc_xWissen35_Post	44	0.49	0.23	-0.1	0.9

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.

N_{total} = 69.

2.24 pSc_Wissen_ling_35_Post

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSc_Wissen_ling_35_Post

Label: linguistisches Wissen (Kurzversion) (Post)

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pSc_Wissen_ling_35_Post	44	0.50	0.26	0.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.

N_{total} = 69.

2.25 pSc_Wissen_prax_35_Post

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSc_Wissen_prax_35_Post

Label: anwendungsbezogenes Wissen (Kurzversion) (Post)

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pSc_Wissen_prax_35_Post	44	0.48	0.25	-0.1	0.9

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

2.26 Bearbeitungsdauer

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Bearbeitungsdauer

Label: Bearbeitungszeit in Minuten

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
Bearbeitungsdauer	69	85.58	24.35	46.0	140.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.

$N_{total} = 69$.

I TEACHERS

2 WISSEN

2.27 submitdate

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: submitdate

Label: submitdate

Variablentyp: Zeichenfolge

I TEACHERS

2 WISSEN

2.28 startdate

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: startdate
Label: startdate
Variablentyp: Zeichenfolge

2.29 Technik1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Technik1

Label: Hatten Sie während des Tests technische Schwierigkeiten?

Kategorien: 1 = *Ja*; 2 = *Nein*

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Ja	11.6	11.6
2	Nein	88.4	88.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

I TEACHERS

2 WISSEN

2.30 Technik2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Technik2

Label: Bitte beschreiben Sie die technischen Schwierigkeiten moeglichst genau.

Variablentyp: Zeichenfolge

I TEACHERS

2 WISSEN

2.31 Technik3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Technik3

Label: Bei welchen Fragen traten die technischen Schwierigkeiten auf?

Variablentyp: Zeichenfolge

3 Demografie

3.1 AlterVar

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: AlterVar

Label: Alter

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
25	(kein Label vergeben)	1.4	1.4
26	(kein Label vergeben)	2.9	2.9
27	(kein Label vergeben)	2.9	2.9
28	(kein Label vergeben)	2.9	2.9
29	(kein Label vergeben)	5.8	5.8
30	(kein Label vergeben)	1.4	1.4
32	(kein Label vergeben)	1.4	1.4
33	(kein Label vergeben)	2.9	2.9
35	(kein Label vergeben)	2.9	2.9
36	(kein Label vergeben)	1.4	1.4
37	(kein Label vergeben)	1.4	1.4
39	(kein Label vergeben)	7.2	7.2
40	(kein Label vergeben)	2.9	2.9
41	(kein Label vergeben)	1.4	1.4
43	(kein Label vergeben)	4.3	4.3
44	(kein Label vergeben)	4.3	4.3
45	(kein Label vergeben)	2.9	2.9
46	(kein Label vergeben)	2.9	2.9
47	(kein Label vergeben)	1.4	1.4
48	(kein Label vergeben)	4.3	4.3
49	(kein Label vergeben)	1.4	1.4

Fortsetzung auf der nächsten Seite

I TEACHERS

2 WISSEN

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
50	(kein Label vergeben)	4.3	4.3
51	(kein Label vergeben)	7.2	7.2
52	(kein Label vergeben)	2.9	2.9
53	(kein Label vergeben)	1.4	1.4
54	(kein Label vergeben)	1.4	1.4
56	(kein Label vergeben)	2.9	2.9
57	(kein Label vergeben)	2.9	2.9
58	(kein Label vergeben)	1.4	1.4
59	(kein Label vergeben)	4.3	4.3
60	(kein Label vergeben)	4.3	4.3
61	(kein Label vergeben)	5.8	5.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.2 Geschlecht

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Geschlecht

Label: Geschlecht

Kategorien: 1 = weiblich; 2 = maennlich

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Geschlecht	69	1.03	0.17

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	weiblich	97.1	97.1
2	maennlich	2.9	2.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.3 Land

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Land

Label: In welchem Land arbeiten Sie?

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
D	(kein Label vergeben)	100.0	100.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{\text{valid}} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{\text{total}} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.4 Bundesland

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Bundesland

Label: In welchem Bundesland arbeiten Sie?

Kategorien: 10 = *Nordrhein-Westfalen*;

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
10	Nordrhein-Westfalen	0.0	0.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

I TEACHERS

2 WISSEN

3.5 Gruppe

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Gruppe

Label: Ich bin...

Kategorien: 1 = *paedagogische Fachkraft*; 2 = *ErzieherIn in Ausbildung (FachschuelerIn)*;
3 = *Grundschullehrkraft*; 4 = *studentische Sprachfoerderkraft*;
5 = *LogopaedIn/SprachtherapeutIn*

Fehlende Werte: -99 = *missing*

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	paedagogische Fachkraft	67.7	63.8
2	ErzieherIn in Ausbildung (FachschuelerIn)	23.1	21.7
3	Grundschullehrkraft	9.2	8.7
4	studentische Sprachfoerderkraft	0.0	0.0
5	LogopaedIn/SprachtherapeutIn	0.0	0.0
-99	missing	–	5.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 65$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.6 Kinder

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Kinder
 Label: Haben Sie Kinder?
 Kategorien: 1 = *Ja*; 2 = *Nein*
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Ja	28.6	23.2
2	Nein	8.9	7.2
-99	missing	–	18.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 56$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.7 Kinder_Alter_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Kinder_Alter_1

Label: [0-1 Jahre] Wie alt sind Ihre Kinder? Kreuzen Sie alle zutreffenden Antworten an.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	98.6	98.6
1	Ja	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.8 Kinder_Alter_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Kinder_Alter_2

Label: [2 Jahre] Wie alt sind Ihre Kinder? Kreuzen Sie alle zutreffenden Antworten an.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Kinder_Alter_2	69	0.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	100.0	100.0
1	Ja	0.0	0.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.9 Kinder_Alter_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Kinder_Alter_3

Label: [3 Jahre] Wie alt sind Ihre Kinder? Kreuzen Sie alle zutreffenden Antworten an.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Kinder_Alter_3	69	0.01	0.12

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	98.6	98.6
1	Ja	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.10 Kinder_Alter_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Kinder_Alter_4

Label: [4 Jahre] Wie alt sind Ihre Kinder? Kreuzen Sie alle zutreffenden Antworten an.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Kinder_Alter_4	69	0.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	100.0	100.0
1	Ja	0.0	0.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.11 Kinder_Alter_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Kinder_Alter_5

Label: [5 Jahre] Wie alt sind Ihre Kinder? Kreuzen Sie alle zutreffenden Antworten an.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Kinder_Alter_5	69	0.01	0.12

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	98.6	98.6
1	Ja	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.12 Kinder_Alter_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Kinder_Alter_6

Label: [6 Jahre] Wie alt sind Ihre Kinder? Kreuzen Sie alle zutreffenden Antworten an.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Kinder_Alter_6	69	0.01	0.12

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	98.6	98.6
1	Ja	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.13 Kinder_Alter_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Kinder_Alter_7

Label: [7 Jahre] Wie alt sind Ihre Kinder? Kreuzen Sie alle zutreffenden Antworten an.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Kinder_Alter_7	69	0.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	100.0	100.0
1	Ja	0.0	0.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.14 Kinder_Alter_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Kinder_Alter_8

Label: [8 Jahre] Wie alt sind Ihre Kinder? Kreuzen Sie alle zutreffenden Antworten an.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Kinder_Alter_8	69	0.01	0.12

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	98.6	98.6
1	Ja	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.15 Kinder_Alter_9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Kinder_Alter_9

Label: [9 Jahre] Wie alt sind Ihre Kinder? Kreuzen Sie alle zutreffenden Antworten an.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Kinder_Alter_9	69	0.06	0.24

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	94.2	94.2
1	Ja	5.8	5.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.16 Kinder_Alter_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Kinder_Alter_10

Label: [10 Jahre] Wie alt sind Ihre Kinder? Kreuzen Sie alle zutreffenden Antworten an.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Kinder_Alter_10	69	0.10	0.30

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	89.9	89.9
1	Ja	10.1	10.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.17 Kinder_Alter_11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Kinder_Alter_11

Label: [11-15 Jahre] Wie alt sind Ihre Kinder? Kreuzen Sie alle zutreffenden Antworten an.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Kinder_Alter_11	69	0.33	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	66.7	66.7
1	Ja	33.3	33.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.18 Kinder_Alter_12

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Kinder_Alter_12

Label: [16 Jahre und älter] Wie alt sind Ihre Kinder? Kreuzen Sie alle zutreffenden Antworten an.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewählt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Kinder_Alter_12	34	0.47	0.51

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewählt	52.9	26.1
1	Ja	47.1	23.2
-99	missing	–	50.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 34$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4 Berufliche Position

4.1 Arbeit_Position_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Arbeit_Position_1

Label: [Kita-/Kigaleitung] Welche Position haben Sie zurzeit in der Einrichtung, in der Sie taetig sind? (Mehrfachnennung moeglich)

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Arbeit_Position_1	69	0.10	0.30

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	89.9	89.9
1	Ja	10.1	10.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.2 Arbeit_Position_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Arbeit_Position_2

Label: [Gruppenleitung] Welche Position haben Sie zurzeit in der Einrichtung, in der Sie taetig sind? (Mehrfachnennung moeglich)

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Arbeit_Position_2	69	0.35	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	65.2	65.2
1	Ja	34.8	34.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.3 Arbeit_Position_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Arbeit_Position_3

Label: [Zweitkraft] Welche Position haben Sie zurzeit in der Einrichtung, in der Sie tätig sind? (Mehrfachnennung möglich)

Kategorien: 0 = *Nicht Gewählt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Arbeit_Position_3	69	0.07	0.26

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewählt	92.8	92.8
1	Ja	7.2	7.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.4 Arbeit_Position_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Arbeit_Position_4

Label: [Springkraft] Welche Position haben Sie zurzeit in der Einrichtung, in der Sie taetig sind? (Mehrfachnennung moeglich)

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Arbeit_Position_4	69	0.06	0.24

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	94.2	94.2
1	Ja	5.8	5.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.5 Arbeit_Position_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Arbeit_Position_5

Label: [Sprachfoerderkraft/MultiplikatorIn] Welche Position haben Sie zurzeit in der Einrichtung, in der Sie taetig sind? (Mehrfachnennung moeglich)

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Arbeit_Position_5	69	0.23	0.43

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	76.8	76.8
1	Ja	23.2	23.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.6 Arbeit_Position_other

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Arbeit_Position_other

Label: [Sonstiges] Welche Position haben Sie zurzeit in der Einrichtung, in der Sie taetig sind? (Mehrfachnennung moeglich)

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
	(kein Label vergeben)	52.2	52.2
Eingangsstufe	(kein Label vergeben)	1.4	1.4
Erzieherin	(kein Label vergeben)	2.9	2.9
Foerderschulleiterin	(kein Label vergeben)	2.9	2.9
Grundschullehrer	(kein Label vergeben)	4.3	4.3
gruppenerzieherin	(kein Label vergeben)	1.4	1.4
gRUPPENERZIEHERIN	(kein Label vergeben)	1.4	1.4
Gruppenerzieherin	(kein Label vergeben)	1.4	1.4
Lehrerin	(kein Label vergeben)	14.5	14.5
Lehrerin	(kein Label vergeben)	1.4	1.4
Vorlaufkurs			
Lehrkraft	(kein Label vergeben)	4.3	4.3
Leitung	(kein Label vergeben)	1.4	1.4
Vorschulgruppe			
nicht	(kein Label vergeben)	1.4	1.4
hierarchiebedingt			
Schulleiterin	(kein Label vergeben)	2.9	2.9
Schulleitung	(kein Label vergeben)	1.4	1.4
Sicherheitsbeauftragter	(kein Label vergeben)	1.4	1.4

Fortsetzung auf der nächsten Seite

I TEACHERS

4 BERUFLICHE POSITION

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
Stellv.	(kein Label vergeben)	1.4	1.4
Leitung			
Vorschulprogramm	(kein Label vergeben)	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.7 Arbeit_Zeit

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Arbeit_Zeit

Label: Wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie zur Zeit?

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
Arbeit_Zeit	69	31.27	9.11	15.0	60.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

4.8 Arbeit_Kinderalter_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Arbeit_Kinderalter_1

Label: [0-3 Jahren (Krippe)] Ich betreue Kinder im Alter von...

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Arbeit_Kinderalter_1	69	0.07	0.26

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	92.8	92.8
1	Ja	7.2	7.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.9 Arbeit_Kinderalter_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Arbeit_Kinderalter_2

Label: [3-6 Jahren (Kindergarten/-tagesstaette)] Ich betreue Kinder im Alter von...

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Arbeit_Kinderalter_2	69	0.62	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	37.7	37.7
1	Ja	62.3	62.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.10 Arbeit_Kinderalter_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Arbeit_Kinderalter_3

Label: [6-10 Jahren (Hort/Schule)] Ich betreue Kinder im Alter von...

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Arbeit_Kinderalter_3	69	0.48	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	52.2	52.2
1	Ja	47.8	47.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.11 Arbeit_Kinderalter_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Arbeit_Kinderalter_4

Label: [11 Jahren oder älter] Ich betreue Kinder im Alter von...

Kategorien: 0 = *Nicht Gewählt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Arbeit_Kinderalter_4	69	0.03	0.17

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewählt	97.1	97.1
1	Ja	2.9	2.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.12 Arbeit_Kinderalter_other

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Arbeit_Kinderalter_other

Label: [Sonstiges] Ich betreue Kinder im Alter von...

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Arbeit_Kinderalter_other	69	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		94.2	94.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.13 Arbeit_Nichtdeutsch_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Arbeit_Nichtdeutsch_1

Label: [Schaetzen Sie bitte den Anteil: | keines | alle] Wie viele Kinder in Ihrer
Einrichtung sprechen zuhause eine andere Sprache als Deutsch?

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
Arbeit_Nichtdeutsch_1	69	46.74	26.88	5.0	100.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

5 Sprachbiografie

5.1 Sprachbiografie_1a_1_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachbiografie_1a_1_1
 Label: [Meine Muttersprache ist] [Muttersprache 1] Was ist Ihre Muttersprache? (zur Anonymisierung aggregiert (FDZ))
 Kategorien: 1 = *Deutsch*; 2 = *nicht-deutsch*
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachbiografie_1a_1_1	67	1.06	0.24

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Deutsch	94.0	91.3
2	nicht-deutsch	6.0	5.8
-99	missing	–	2.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 67$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

5.2 Sprachbiografie_1a_1_2

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachbiografie_1a_1_2
 Label: [Meine Muttersprache ist] [Muttersprache 2] Was ist Ihre Muttersprache? (zur Anonymisierung aggregiert (FDZ))
 Kategorien: 1 = *Deutsch*; 2 = *nicht-deutsch*
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachbiografie_1a_1_2	3	1.67	0.58

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Deutsch	33.3	1.4
2	nicht-deutsch	66.7	2.9
-99	missing	–	95.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 3$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

5.3 Sprachbiografie_1a_1_3

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachbiografie_1a_1_3
 Label: [Meine Muttersprache ist] [Muttersprache 3] Was ist Ihre Muttersprache? (zur Anonymisierung aggregiert (FDZ))
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachbiografie_1a_1_3	0	NaN	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-99	missing	–	100.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 0$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

5.4 Sprachbiografie_1b_1_1

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachbiografie_1b_1_1
 Label: [Ich spreche sehr gut:] [Fremdsprache 1] Welche Fremdsprache(n) sprechen Sie sehr gut? (zur Anonymisierung aggregiert (FDZ))
 Kategorien: 1 = *Deutsch*; 2 = *nicht-deutsch*
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachbiografie_1b_1_1	19	1.84	0.37

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Deutsch	15.8	4.3
2	nicht-deutsch	84.2	23.2
-99	missing	–	72.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 19$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

5.5 Sprachbiografie_1b_1_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachbiografie_1b_1_2
 Label: [Ich spreche sehr gut:] [Fremdsprache 2] Welche Fremdsprache(n) sprechen Sie sehr gut? (zur Anonymisierung aggregiert (FDZ))
 Kategorien: 2 = *nicht-deutsch*;
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachbiografie_1b_1_2	3	2.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
2	nicht-deutsch	100.0	4.3
-99	missing	–	95.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 3$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

5.6 Sprachbiografie_1b_1_3

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachbiografie_1b_1_3
 Label: [Ich spreche sehr gut:] [Fremdsprache 3] Welche Fremdsprache(n) sprechen Sie sehr gut? (zur Anonymisierung aggregiert (FDZ))
 Kategorien: 2 = *nicht-deutsch*;
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachbiografie_1b_1_3	2	2.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
2	nicht-deutsch	100.0	2.9
-99	missing	–	97.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 2$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

5.7 Sprachbiografie_1b_1_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachbiografie_1b_1_4
 Label: [Ich spreche sehr gut:] [Fremdsprache 4] Welche Fremdsprache(n) sprechen Sie sehr gut? (zur Anonymisierung aggregiert (FDZ))
 Kategorien: 2 = *nicht-deutsch*;
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachbiografie_1b_1_4	1	2.00	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung]Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
2	nicht-deutsch	100.0	1.4
-99	missing	–	98.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 1$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

5.8 Sprachbiografie_1c_1_1

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachbiografie_1c_1_1
 Label: [Ich spreche gut:] [Fremdsprache 1] Welche Fremdsprache(n) sprechen Sie gut?
 (zur Anonymisierung aggregiert (FDZ))
 Kategorien: 2 = *nicht-deutsch*;
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachbiografie_1c_1_1	39	2.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
2	nicht-deutsch	100.0	56.5
-99	missing	–	43.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 39$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

5.9 Sprachbiografie_1c_1_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachbiografie_1c_1_2
 Label: [Ich spreche gut:] [Fremdsprache 2] Welche Fremdsprache(n) sprechen Sie gut?
 (zur Anonymisierung aggregiert (FDZ))
 Kategorien: 2 = *nicht-deutsch*;
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachbiografie_1c_1_2	4	2.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
2	nicht-deutsch	100.0	5.8
-99	missing	–	94.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 4$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

5.10 Sprachbiografie_1c_1_3

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachbiografie_1c_1_3
 Label: [Ich spreche gut:] [Fremdsprache 3] Welche Fremdsprache(n) sprechen Sie gut?
 (zur Anonymisierung aggregiert (FDZ))
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachbiografie_1c_1_3	0	NaN	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-99	missing	–	100.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 0$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

5.11 Sprachbiografie_1c_1_4

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachbiografie_1c_1_4
 Label: [Ich spreche gut:] [Fremdsprache 4] Welche Fremdsprache(n) sprechen Sie gut?
 (zur Anonymisierung aggregiert (FDZ))
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachbiografie_1c_1_4	0	NaN	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-99	missing	–	100.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 0$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

5.12 Sprachbiografie_1d_1_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachbiografie_1d_1_1
 Label: [Ich spreche ein wenig:] [Fremdsprache 1] Welche Fremdsprache(n) sprechen Sie ein wenig? (zur Anonymisierung aggregiert (FDZ))
 Kategorien: 2 = *nicht-deutsch*;
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachbiografie_1d_1_1	46	2.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
2	nicht-deutsch	100.0	66.7
-99	missing	–	33.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 46$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

5.13 Sprachbiografie_1d_1_2

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachbiografie_1d_1_2
 Label: [Ich spreche ein wenig:] [Fremdsprache 2] Welche Fremdsprache(n) sprechen Sie ein wenig? (zur Anonymisierung aggregiert (FDZ))
 Kategorien: 1 = *Deutsch*; 2 = *nicht-deutsch*
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachbiografie_1d_1_2	7	1.86	0.38

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Deutsch	14.3	1.4
2	nicht-deutsch	85.7	8.7
-99	missing	–	89.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 7$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

5.14 Sprachbiografie_1d_1_3

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachbiografie_1d_1_3
 Label: [Ich spreche ein wenig:] [Fremdsprache 3] Welche Fremdsprache(n) sprechen Sie ein wenig? (zur Anonymisierung aggregiert (FDZ))
 Kategorien: 2 = *nicht-deutsch*;
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachbiografie_1d_1_3	3	2.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
2	nicht-deutsch	100.0	4.3
-99	missing	–	95.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 3$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

5.15 Sprachbiografie_1d_1_4

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachbiografie_1d_1_4
 Label: [Ich spreche ein wenig:] [Fremdsprache 4] Welche Fremdsprache(n) sprechen Sie ein wenig? (zur Anonymisierung aggregiert (FDZ))
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachbiografie_1d_1_4	0	NaN	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-99	missing	–	100.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 0$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

5.16 Sprachbiografie_2_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachbiografie_2_1

Label: [Deutsch ist meine Muttersprache] Wenn Deutsch nicht Ihre Muttersprache ist, wo haben Sie Deutsch gelernt?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachbiografie_2_1	69	0.93	0.26

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	7.2	7.2
1	Ja	92.8	92.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

5.17 Sprachbiografie_2_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachbiografie_2_2

Label: [in Deutschland als Kind] Wenn Deutsch nicht Ihre Muttersprache ist, wo haben Sie Deutsch gelernt?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachbiografie_2_2	69	0.03	0.17

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	97.1	97.1
1	Ja	2.9	2.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

5.18 Sprachbiografie_2_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachbiografie_2_3

Label: [in Deutschland als Jugendliche(r)] Wenn Deutsch nicht Ihre Muttersprache ist, wo haben Sie Deutsch gelernt?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachbiografie_2_3	69	0.01	0.12

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	98.6	98.6
1	Ja	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

5.19 Sprachbiografie_2_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachbiografie_2_4

Label: [in Deutschland als Erwachsene(r)] Wenn Deutsch nicht Ihre Muttersprache ist, wo haben Sie Deutsch gelernt?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachbiografie_2_4	69	0.01	0.12

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	98.6	98.6
1	Ja	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

5.20 Sprachbiografie_2_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachbiografie_2_5

Label: [in meinem Heimatland als Kind] Wenn Deutsch nicht Ihre Muttersprache ist, wo haben Sie Deutsch gelernt?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachbiografie_2_5	69	0.01	0.12

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	98.6	98.6
1	Ja	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

5.21 Sprachbiografie_2_6

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachbiografie_2_6
 Label: [in meinem Heimatland als Jugendliche(r)] Wenn Deutsch nicht Ihre Muttersprache ist, wo haben Sie Deutsch gelernt?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewählt*;

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachbiografie_2_6	69	0.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewählt	100.0	100.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

5.22 Sprachbiografie_2_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachbiografie_2_7
 Label: [in meinem Heimatland als Erwachsene(r)] Wenn Deutsch nicht Ihre Muttersprache ist, wo haben Sie Deutsch gelernt?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachbiografie_2_7	69	0.01	0.12

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	98.6	98.6
1	Ja	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

6 Ausbildung

6.1 Schulbildung_1

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Schulbildung_1
 Label: Was ist Ihr hoechster Schulabschluss?
 Kategorien: 1 = *Haupt-/Volksschulabschluss (9 Jahre Schulbesuch)*;
 2 = *Realschulabschluss/Mittlere Reife (10 Jahre Schulbesuch)*;
 3 = *Fachhochschulreife (12 Jahre Schulbesuch)*; 4 = *allgemeine Hochschulreife/Abitur (12/13 Jahre Schulbesuch)*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Schulbildung_1	69	3.32	0.81

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Haupt-/Volksschulabschluss (9 Jahre Schulbesuch)	0.0	0.0
2	Realschulabschluss/Mittlere Reife (10 Jahre Schulbesuch)	21.7	21.7
3	Fachhochschulreife (12 Jahre Schulbesuch)	24.6	24.6
4	allgemeine Hochschulreife/Abitur (12/13 Jahre Schulbesuch)	53.6	53.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

6.2 Schulbildung_2

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Schulbildung_2
 Label: Welche Gesamtnote hatten Sie in Ihrem Abschlusszeugnis dieser Schule?
 Kategorien: 1 = *sehr gut* (Gesamtnote 1,0-1,5); 2 = *gut* (Gesamtnote 1,6-2,5);
 3 = *befriedigend* (Gesamtnote 2,6-3,5); 4 = *ausreichend* (Gesamtnote 3,6-4,0)

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Schulbildung_2	69	2.33	0.68

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	sehr gut (Gesamtnote 1,0-1,5)	11.6	11.6
2	gut (Gesamtnote 1,6-2,5)	43.5	43.5
3	befriedigend (Gesamtnote 2,6-3,5)	44.9	44.9
4	ausreichend (Gesamtnote 3,6-4,0)	0.0	0.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

6.3 Schulbildung_3

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Schulbildung_3
 Label: Wie gut waren Sie im Schulfach Deutsch?
 Kategorien: 1 = *sehr gut*; 2 = *gut*; 3 = *befriedigend*; 4 = *ausreichend*; 5 = *mangelhaft*;
 6 = *ungenuegend*; 7 = *Ich hatte Deutsch nicht als Schulfach*.

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Schulbildung_3	69	2.12	0.65

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	sehr gut	14.5	14.5
2	gut	60.9	60.9
3	befriedigend	23.2	23.2
4	ausreichend	1.4	1.4
5	mangelhaft	0.0	0.0
6	ungenuegend	0.0	0.0
7	Ich hatte Deutsch nicht als Schulfach.	0.0	0.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

6.4 Schulbildung_4

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Schulbildung_4
Label: Hatten Sie in der Schule Grammatikunterricht?
Kategorien: 1 = ja, z.B. im Deutsch- und Fremdsprachenunterricht; 2 = nein

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Schulbildung_4	69	1.06	0.24

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	ja, z.B. im Deutsch- und Fremdsprachenunterricht	94.2	94.2
2	nein	5.8	5.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

6.5 Schulbildung_5_1

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Schulbildung_5_1
 Label: [Ich mochte den Grammatikunterricht...] Wie gerne haben Sie Grammatikunterricht in der Schule gemacht?
 Kategorien: 1 = 1 = *ueberhaupt nicht gerne*; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5; 6 = 6 = *sehr gerne*
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Schulbildung_5_1	65	3.57	1.44

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 = ueberhaupt nicht gerne	6.2	5.8
2	2	18.5	17.4
3	3	27.7	26.1
4	4	20.0	18.8
5	5	15.4	14.5
6	6 = sehr gerne	12.3	11.6
-99	missing	–	5.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 65$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

6.6 Schulbildung_6_SQ001

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Schulbildung_6_SQ001

Label: [Ich beschaeftige mich mit Sprache...] Beschaeftigen Sie sich gerne mit Sprache?

Kategorien: 1 = 1 = ueberhaupt nicht gerne; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5; 6 = 6 = sehr gerne

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Schulbildung_6_SQ001	69	4.20	1.18

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 = ueberhaupt nicht gerne	0.0	0.0
2	2	10.1	10.1
3	3	18.8	18.8
4	4	23.2	23.2
5	5	36.2	36.2
6	6 = sehr gerne	11.6	11.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

6.7 Schulbildung_7_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Schulbildung_7_1

Label: [Ich lese gerne Buecher.] Waehlen Sie aus, welche der folgenden Aussagen auf Sie zutreffen.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Schulbildung_7_1	69	0.94	0.24

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	5.8	5.8
1	Ja	94.2	94.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

6.8 Schulbildung_7_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Schulbildung_7_2

Label: [Ich lese gerne Zeitschriften/Zeitungen.] Waehlen Sie aus, welche der folgenden Aussagen auf Sie zutreffen.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Schulbildung_7_2	69	0.77	0.43

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	23.2	23.2
1	Ja	76.8	76.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

6.9 Schulbildung_7_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Schulbildung_7_3
 Label: [Ich schreibe gerne (z.B. Briefe, Geschichten, Gedichte oder Lieder).] Wählen Sie aus, welche der folgenden Aussagen auf Sie zutreffen.
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewählt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Schulbildung_7_3	69	0.39	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewählt	60.9	60.9
1	Ja	39.1	39.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

6.10 Schulbildung_7_4

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Schulbildung_7_4
 Label: [Ich mache Fremdsprachenkurse (z.B. fuer den Urlaub).] Waehlen Sie aus, welche der folgenden Aussagen auf Sie zutreffen.
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Schulbildung_7_4	69	0.13	0.34

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	87.0	87.0
1	Ja	13.0	13.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

6.11 Schulbildung_7_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Schulbildung_7_5
 Label: [Ich lese gerne vor.] Waehlen Sie aus, welche der folgenden Aussagen auf Sie zutreffen.
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Schulbildung_7_5	69	0.93	0.26

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	7.2	7.2
1	Ja	92.8	92.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

6.12 Schulbildung_7_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Schulbildung_7_6

Label: [Ich mache gerne Sprachspiele.] Waehlen Sie aus, welche der folgenden Aussagen auf Sie zutreffen.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Schulbildung_7_6	69	0.64	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	36.2	36.2
1	Ja	63.8	63.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

6.13 Schulbildung_7_7

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Schulbildung_7_7
 Label: [Ich diskutiere gerne ueber Sprache.] Waehlen Sie aus, welche der folgenden Aussagen auf Sie zutreffen.
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Schulbildung_7_7	69	0.30	0.46

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	69.6	69.6
1	Ja	30.4	30.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

6.14 Beruf

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Beruf
Label: Beruf
Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*
Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Beruf	33	1.45	0.56

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	3.0	1.4
1	Ja	48.5	23.2
-99	missing	–	52.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 33$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

6.15 Ausbildung_1_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Ausbildung_1_1
 Label: [ErzieherIn] Welchen Beruf haben Sie erlernt?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Ausbildung_1_1	69	0.48	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	52.2	52.2
1	Ja	47.8	47.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

6.16 Ausbildung_1_2

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Ausbildung_1_2
Label: [KinderpflegerIn] Welchen Beruf haben Sie erlernt?
Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Ausbildung_1_2	69	0.07	0.26

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	92.8	92.8
1	Ja	7.2	7.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

6.17 Ausbildung_1_3

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Ausbildung_1_3
 Label: [SozialpaedagogIn/LehrerIn] Welchen Beruf haben Sie erlernt?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Ausbildung_1_3	69	0.28	0.45

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	72.5	72.5
1	Ja	27.5	27.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

6.18 Ausbildung_1_4

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Ausbildung_1_4
 Label: [Logopaedie/SprachheilerzieherIn] Welchen Beruf haben Sie erlernt?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Ausbildung_1_4	69	0.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	100.0	100.0
1	Ja	0.0	0.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

6.19 Ausbildung_1_5

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Ausbildung_1_5
Label: [FruehpaedagogIn (B.A.)] Welchen Beruf haben Sie erlernt?
Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Ausbildung_1_5	69	0.01	0.12

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	98.6	98.6
1	Ja	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

6.20 Ausbildung_1_6

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Ausbildung_1_6
Label: [sonstiger sozialer Beruf] Welchen Beruf haben Sie erlernt?
Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Ausbildung_1_6	69	0.01	0.12

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	98.6	98.6
1	Ja	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

6.21 Ausbildung_1_other

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Ausbildung_1_other

Label: [Sonstiges] Welchen Beruf haben Sie erlernt? (zur Anonymisierung geleert (FDZ))

Variablentyp: Zeichenfolge

6.22 Ausbildung_2_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Ausbildung_2_1

Label: [Fachschule/Fachakademie] Welche Institution haben Sie besucht, um Ihren jetzigen Beruf zu erlernen?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Ausbildung_2_1	69	0.43	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	56.5	56.5
1	Ja	43.5	43.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

6.23 Ausbildung_2_2

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Ausbildung_2_2
 Label: [Paedagogische Hochschule] Welche Institution haben Sie besucht, um Ihren jetzigen Beruf zu erlernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Ausbildung_2_2	69	0.09	0.28

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	91.3	91.3
1	Ja	8.7	8.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

6.24 Ausbildung_2_3

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Ausbildung_2_3
 Label: [Fachhochschule] Welche Institution haben Sie besucht, um Ihren jetzigen Beruf zu erlernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Ausbildung_2_3	69	0.14	0.35

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	85.5	85.5
1	Ja	14.5	14.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

6.25 Ausbildung_2_4

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Ausbildung_2_4
 Label: [Universitaet] Welche Institution haben Sie besucht, um Ihren jetzigen Beruf zu erlernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Ausbildung_2_4	69	0.36	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	63.8	63.8
1	Ja	36.2	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

6.26 Ausbildung_2_other

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Ausbildung_2_other

Label: [Sonstiges] Welche Institution haben Sie besucht, um Ihren jetzigen Beruf zu
erlernen? (zur Anonymisierung geleert (FDZ))

Variablentyp: Zeichenfolge

6.27 Ausbildung_3

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Ausbildung_3

Label: In welchem Kalenderjahr haben Sie Ihre Ausbildung oder Ihr Studium beendet?

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
Ausbildung_3	69	1996.49	12.20	1975.0	2015.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

6.28 Ausbildung_4

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Ausbildung_4

Label: Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie schon in Ihrem Beruf (ohne Ausbildungszeit)?

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
Ausbildung_4	69	73.67	333.87	1.0	2001.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

7 Weiterbildung

7.1 Weiterbildung_1

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_1
Label: Haben Sie bereits Weiterbildungen besucht?
Kategorien: 1 = *Ja*; 2 = *Nein*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_1	69	1.01	0.12

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Ja	98.6	98.6
2	Nein	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.2 Weiterbildung_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_2
 Label: Haben Sie bereits Weiterbildungen im Bereich Sprache besucht?
 Kategorien: 1 = Ja; 2 = Nein
 Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_2	68	1.25	0.44

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Ja	75.0	73.9
2	Nein	25.0	24.6
-99	missing	–	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 68$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.3 Weiterbildung_3_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_3_1

Label: [Weiterbildung 1] Welche speziellen Weiterbildungen im Bereich Sprache haben Sie besucht? Wenn Sie sich nicht mehr genau an den Namen der Weiterbildung erinnern, beschreiben Sie sie bitte kurz! (zur Anonymisierung geleert (FDZ))

Variablentyp: Zeichenfolge

7.4 Weiterbildung_3_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_3_2

Label: [Weiterbildung 2] Welche speziellen Weiterbildungen im Bereich Sprache haben Sie besucht? Wenn Sie sich nicht mehr genau an den Namen der Weiterbildung erinnern, beschreiben Sie sie bitte kurz! (zur Anonymisierung geleert (FDZ))

Variablentyp: Zeichenfolge

7.5 Weiterbildung_3_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_3_3

Label: [Weiterbildung 3] Welche speziellen Weiterbildungen im Bereich Sprache haben Sie besucht? Wenn Sie sich nicht mehr genau an den Namen der Weiterbildung erinnern, beschreiben Sie sie bitte kurz! (zur Anonymisierung geleert (FDZ))

Variablentyp: Zeichenfolge

7.6 Weiterbildung_3_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_3_4

Label: [Weiterbildung 4] Welche speziellen Weiterbildungen im Bereich Sprache haben Sie besucht? Wenn Sie sich nicht mehr genau an den Namen der Weiterbildung erinnern, beschreiben Sie sie bitte kurz! (zur Anonymisierung geleert (FDZ))

Variablentyp: Zeichenfolge

7.7 Weiterbildung_3_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_3_5

Label: [Weiterbildung 5] Welche speziellen Weiterbildungen im Bereich Sprache haben Sie besucht? Wenn Sie sich nicht mehr genau an den Namen der Weiterbildung erinnern, beschreiben Sie sie bitte kurz! (zur Anonymisierung geleert (FDZ))

Variablentyp: Zeichenfolge

7.8 Weiterbildung_3_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_3_6

Label: [Weiterbildung 6] Welche speziellen Weiterbildungen im Bereich Sprache haben Sie besucht? Wenn Sie sich nicht mehr genau an den Namen der Weiterbildung erinnern, beschreiben Sie sie bitte kurz! (zur Anonymisierung geleert (FDZ))

Variablentyp: Zeichenfolge

7.9 Weiterbildung_4_1

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_4_1
 Label: [Weiterbildung_3_1] Wie lange haben die Weiterbildungen in Stunden
 gedauert? (Bitte rechnen Sie 6h fuer eine ganztägige Weiterbildung.)
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
Weiterbildung_4_1	50	18.24	18.20	1.0	120.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

7.10 Weiterbildung_4_2

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_4_2
 Label: [Weiterbildung_3_2] Wie lange haben die Weiterbildungen in Stunden
 gedauert? (Bitte rechnen Sie 6h fuer eine ganztägige Weiterbildung.)
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
Weiterbildung_4_2	33	18.94	23.65	1.0	90.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

7.11 Weiterbildung_4_3

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_4_3
 Label: [Weiterbildung_3_3] Wie lange haben die Weiterbildungen in Stunden
 gedauert? (Bitte rechnen Sie 6h fuer eine ganztägige Weiterbildung.)
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
Weiterbildung_4_3	24	15.54	19.77	1.0	90.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

7.12 Weiterbildung_4_4

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_4_4
 Label: [Weiterbildung_3_4] Wie lange haben die Weiterbildungen in Stunden
 gedauert? (Bitte rechnen Sie 6h fuer eine ganztägige Weiterbildung.)
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
Weiterbildung_4_4	14	9.93	4.29	5.0	18.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

7.13 Weiterbildung_4_5

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_4_5
 Label: [Weiterbildung_3_5] Wie lange haben die Weiterbildungen in Stunden
 gedauert? (Bitte rechnen Sie 6h fuer eine ganztägige Weiterbildung.)
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
Weiterbildung_4_5	9	16.44	21.72	0.0	72.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

7.14 Weiterbildung_4_6

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_4_6
 Label: [Weiterbildung_3_6] Wie lange haben die Weiterbildungen in Stunden
 gedauert? (Bitte rechnen Sie 6h fuer eine ganztägige Weiterbildung.)
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
Weiterbildung_4_6	2	15.00	4.24	12.0	18.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

7.15 Weiterbildung_5_1_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_1_1
 Label: [Phonologie] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
 INSERTANS:582664X6014X310051 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_1_1	69	0.17	0.38

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	82.6	82.6
1	Ja	17.4	17.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.16 Weiterbildung_5_1_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_1_2
 Label: [Wortschatz] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
 INSERTANS:582664X6014X310051 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_1_2	69	0.30	0.46

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	69.6	69.6
1	Ja	30.4	30.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.17 Weiterbildung_5_1_3

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_1_3
 Label: [sprachliche Strukturen (z.B. Grammatik)] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch INSERTANS:582664X6014X310051 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_1_3	69	0.20	0.41

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	79.7	79.7
1	Ja	20.3	20.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.18 Weiterbildung_5_1_4

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_1_4
 Label: [Literacy (Lese- und Schreiberwerb)] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch INSERTANS:582664X6014X310051 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_1_4	69	0.14	0.35

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	85.5	85.5
1	Ja	14.5	14.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.19 Weiterbildung_5_1_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_1_5

Label: [Spracherwerb & Sprachentwicklung] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch INSERTANS:582664X6014X310051 besonders viel dazulernen?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_1_5	69	0.39	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	60.9	60.9
1	Ja	39.1	39.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.20 Weiterbildung_5_1_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_1_6
 Label: [Sprachfoerderung] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
 INSERTANS:582664X6014X310051 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_1_6	69	0.42	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	58.0	58.0
1	Ja	42.0	42.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.21 Weiterbildung_5_1_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_1_7
 Label: [Sprachdiagnostik] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
 INSERTANS:582664X6014X310051 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_1_7	69	0.16	0.37

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	84.1	84.1
1	Ja	15.9	15.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.22 Weiterbildung_5_1_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_1_8
 Label: [Kommunikation mit Eltern] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch INSERTANS:582664X6014X310051 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_1_8	69	0.12	0.32

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	88.4	88.4
1	Ja	11.6	11.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.23 Weiterbildung_5_1_9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_1_9
 Label: [Selbstmanagement] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
 INSERTANS:582664X6014X310051 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_1_9	69	0.04	0.21

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	95.7	95.7
1	Ja	4.3	4.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.24 Weiterbildung_5_1_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_1_10
 Label: [Reime und Lieder] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
 INSERTANS:582664X6014X310051 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_1_10	69	0.16	0.37

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	84.1	84.1
1	Ja	15.9	15.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.25 Weiterbildung_5_1_11

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_1_11
 Label: [Umgang mit Multikulturalitaet] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch INSERTANS:582664X6014X310051 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_1_11	69	0.17	0.38

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	82.6	82.6
1	Ja	17.4	17.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.26 Weiterbildung_5_1_other

[
Beschreibung der Variable] **Beschreibung der Variable**

Variablenname: Weiterbildung_5_1_other

Label: [Sonstiges] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
INSERTANS:582664X6014X310051 besonders viel dazulernen?

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_1_other	69	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] **Häufigkeitsverteilung**

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		98.6	98.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.27 Weiterbildung_5_2_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_2_1
 Label: [Phonologie] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
 INSERTANS:582664X6014X310052 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_2_1	69	0.01	0.12

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	98.6	98.6
1	Ja	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.28 Weiterbildung_5_2_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_2_2
 Label: [Wortschatz] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
 INSERTANS:582664X6014X310052 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_2_2	69	0.19	0.39

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	81.2	81.2
1	Ja	18.8	18.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.29 Weiterbildung_5_2_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_2_3
 Label: [Reime und Lieder] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
 INSERTANS:582664X6014X310052 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_2_3	69	0.10	0.30

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	89.9	89.9
1	Ja	10.1	10.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.30 Weiterbildung_5_2_4

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_2_4
 Label: [Umgang mit Multikulturalitaet] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch INSERTANS:582664X6014X310052 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_2_4	69	0.12	0.32

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	88.4	88.4
1	Ja	11.6	11.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.31 Weiterbildung_5_2_5

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_2_5
 Label: [sprachliche Strukturen (z.B. Grammatik)] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch INSERTANS:582664X6014X310052 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_2_5	69	0.16	0.37

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	84.1	84.1
1	Ja	15.9	15.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.32 Weiterbildung_5_2_6

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_2_6
 Label: [Literacy (Lese- und Schreiberwerb)] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch INSERTANS:582664X6014X310052 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_2_6	69	0.14	0.35

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	85.5	85.5
1	Ja	14.5	14.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.33 Weiterbildung_5_2_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_2_7
 Label: [Kommunikation mit Eltern] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch INSERTANS:582664X6014X310052 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_2_7	69	0.09	0.28

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	91.3	91.3
1	Ja	8.7	8.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.34 Weiterbildung_5_2_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_2_8
 Label: [Selbstmanagement] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
 INSERTANS:582664X6014X310052 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_2_8	69	0.06	0.24

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	94.2	94.2
1	Ja	5.8	5.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.35 Weiterbildung_5_2_9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_2_9

Label: [Spracherwerb & Sprachentwicklung] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch INSERTANS:582664X6014X310052 besonders viel dazulernen?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_2_9	69	0.25	0.43

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	75.4	75.4
1	Ja	24.6	24.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.36 Weiterbildung_5_2_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_2_10

Label: [Sprachfoerderung] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
INSERTANS:582664X6014X310052 besonders viel dazulernen?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_2_10	69	0.20	0.41

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	79.7	79.7
1	Ja	20.3	20.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.37 Weiterbildung_5_2_11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_2_11
 Label: [Sprachdiagnostik] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
 INSERTANS:582664X6014X310052 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_2_11	69	0.10	0.30

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	89.9	89.9
1	Ja	10.1	10.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.38 Weiterbildung_5_2_other

[
Beschreibung der Variable] **Beschreibung der Variable**

Variablenname: Weiterbildung_5_2_other

Label: [Sonstiges] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
INSERTANS:582664X6014X310052 besonders viel dazulernen?

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_2_other	69	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] **Häufigkeitsverteilung**

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		98.6	98.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.39 Weiterbildung_5_3_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_3_1
 Label: [Phonologie] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
 INSERTANS:582664X6014X310053 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_3_1	69	0.07	0.26

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	92.8	92.8
1	Ja	7.2	7.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.40 Weiterbildung_5_3_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_3_2
 Label: [Wortschatz] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
 INSERTANS:582664X6014X310053 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_3_2	69	0.20	0.41

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	79.7	79.7
1	Ja	20.3	20.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.41 Weiterbildung_5_3_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_3_3
 Label: [Reime und Lieder] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
 INSERTANS:582664X6014X310053 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_3_3	69	0.12	0.32

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	88.4	88.4
1	Ja	11.6	11.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.42 Weiterbildung_5_3_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_3_4
 Label: [Umgang mit Multikulturalitaet] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch INSERTANS:582664X6014X310053 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_3_4	69	0.07	0.26

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	92.8	92.8
1	Ja	7.2	7.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.43 Weiterbildung_5_3_5

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_3_5
 Label: [sprachliche Strukturen (z.B. Grammatik)] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch INSERTANS:582664X6014X310053 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_3_5	69	0.14	0.35

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	85.5	85.5
1	Ja	14.5	14.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.44 Weiterbildung_5_3_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_3_6
 Label: [Literacy (Lese- und Schreiberwerb)] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch INSERTANS:582664X6014X310053 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_3_6	69	0.09	0.28

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	91.3	91.3
1	Ja	8.7	8.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.45 Weiterbildung_5_3_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_3_7
 Label: [Kommunikation mit Eltern] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch INSERTANS:582664X6014X310053 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_3_7	69	0.07	0.26

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	92.8	92.8
1	Ja	7.2	7.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.46 Weiterbildung_5_3_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_3_8
 Label: [Selbstmanagement] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
 INSERTANS:582664X6014X310053 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_3_8	69	0.07	0.26

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	92.8	92.8
1	Ja	7.2	7.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.47 Weiterbildung_5_3_9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_3_9

Label: [Spracherwerb & Sprachentwicklung] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch INSERTANS:582664X6014X310053 besonders viel dazulernen?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_3_9	69	0.13	0.34

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	87.0	87.0
1	Ja	13.0	13.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.48 Weiterbildung_5_3_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_3_10

Label: [Sprachfoerderung] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
INSERTANS:582664X6014X310053 besonders viel dazulernen?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_3_10	69	0.12	0.32

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	88.4	88.4
1	Ja	11.6	11.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.49 Weiterbildung_5_3_11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_3_11
 Label: [Sprachdiagnostik] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
 INSERTANS:582664X6014X310053 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_3_11	69	0.09	0.28

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	91.3	91.3
1	Ja	8.7	8.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.50 Weiterbildung_5_3_other

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_3_other

Label: [Sonstiges] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
INSERTANS:582664X6014X310053 besonders viel dazulernen?

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_3_other	69	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		100.0	100.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.51 Weiterbildung_5_4_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_4_1
 Label: [Phonologie] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
 INSERTANS:582664X6014X310054 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_4_1	69	0.04	0.21

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	95.7	95.7
1	Ja	4.3	4.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.52 Weiterbildung_5_4_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_4_2
 Label: [Wortschatz] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
 INSERTANS:582664X6014X310054 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_4_2	69	0.09	0.28

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	91.3	91.3
1	Ja	8.7	8.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.53 Weiterbildung_5_4_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_4_3
 Label: [Reime und Lieder] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
 INSERTANS:582664X6014X310054 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_4_3	69	0.04	0.21

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	95.7	95.7
1	Ja	4.3	4.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.54 Weiterbildung_5_4_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_4_4
 Label: [Umgang mit Multikulturalitaet] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch INSERTANS:582664X6014X310054 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_4_4	69	0.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	100.0	100.0
1	Ja	0.0	0.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.55 Weiterbildung_5_4_5

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_4_5
 Label: [sprachliche Strukturen (z.B. Grammatik)] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch INSERTANS:582664X6014X310054 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_4_5	69	0.07	0.26

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	92.8	92.8
1	Ja	7.2	7.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.56 Weiterbildung_5_4_6

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_4_6
 Label: [Literacy (Lese- und Schreiberwerb)] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch INSERTANS:582664X6014X310054 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_4_6	69	0.03	0.17

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	97.1	97.1
1	Ja	2.9	2.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.57 Weiterbildung_5_4_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_4_7
 Label: [Kommunikation mit Eltern] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch INSERTANS:582664X6014X310054 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_4_7	69	0.03	0.17

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	97.1	97.1
1	Ja	2.9	2.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.58 Weiterbildung_5_4_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_4_8
 Label: [Selbstmanagement] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
 INSERTANS:582664X6014X310054 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_4_8	69	0.03	0.17

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	97.1	97.1
1	Ja	2.9	2.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.59 Weiterbildung_5_4_9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_4_9

Label: [Spracherwerb & Sprachentwicklung] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch INSERTANS:582664X6014X310054 besonders viel dazulernen?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_4_9	69	0.13	0.34

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	87.0	87.0
1	Ja	13.0	13.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.60 Weiterbildung_5_4_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_4_10

Label: [Sprachfoerderung] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
INSERTANS:582664X6014X310054 besonders viel dazulernen?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_4_10	69	0.12	0.32

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	88.4	88.4
1	Ja	11.6	11.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.61 Weiterbildung_5_4_11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_4_11
 Label: [Sprachdiagnostik] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
 INSERTANS:582664X6014X310054 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_4_11	69	0.09	0.28

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	91.3	91.3
1	Ja	8.7	8.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.62 Weiterbildung_5_4_other

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_4_other

Label: [Sonstiges] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
INSERTANS:582664X6014X310054 besonders viel dazulernen?

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_4_other	69	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		98.6	98.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.63 Weiterbildung_5_5_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_5_1
 Label: [Phonologie] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
 INSERTANS:582664X6014X310055 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_5_1	69	0.06	0.24

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	94.2	94.2
1	Ja	5.8	5.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.64 Weiterbildung_5_5_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_5_2
 Label: [Wortschatz] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
 INSERTANS:582664X6014X310055 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_5_2	69	0.09	0.28

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	91.3	91.3
1	Ja	8.7	8.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.65 Weiterbildung_5_5_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_5_3
 Label: [Reime und Lieder] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
 INSERTANS:582664X6014X310055 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_5_3	69	0.01	0.12

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	98.6	98.6
1	Ja	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.66 Weiterbildung_5_5_4

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_5_4
 Label: [Umgang mit Multikulturalitaet] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch INSERTANS:582664X6014X310055 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_5_4	69	0.03	0.17

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	97.1	97.1
1	Ja	2.9	2.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.67 Weiterbildung_5_5_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_5_5
 Label: [sprachliche Strukturen (z.B. Grammatik)] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch INSERTANS:582664X6014X310055 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_5_5	69	0.04	0.21

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	95.7	95.7
1	Ja	4.3	4.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.68 Weiterbildung_5_5_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_5_6

Label: [Literacy (Lese- und Schreiberwerb)] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch INSERTANS:582664X6014X310055 besonders viel dazulernen?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_5_6	69	0.03	0.17

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	97.1	97.1
1	Ja	2.9	2.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.69 Weiterbildung_5_5_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_5_7
 Label: [Kommunikation mit Eltern] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch INSERTANS:582664X6014X310055 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_5_7	69	0.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	100.0	100.0
1	Ja	0.0	0.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.70 Weiterbildung_5_5_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_5_8
 Label: [Selbstmanagement] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
 INSERTANS:582664X6014X310055 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_5_8	69	0.01	0.12

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	98.6	98.6
1	Ja	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.71 Weiterbildung_5_5_9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_5_9

Label: [Spracherwerb & Sprachentwicklung] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch INSERTANS:582664X6014X310055 besonders viel dazulernen?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_5_9	69	0.06	0.24

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	94.2	94.2
1	Ja	5.8	5.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.72 Weiterbildung_5_5_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_5_10

Label: [Sprachfoerderung] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
INSERTANS:582664X6014X310055 besonders viel dazulernen?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_5_10	69	0.07	0.26

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	92.8	92.8
1	Ja	7.2	7.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.73 Weiterbildung_5_5_11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_5_11
 Label: [Sprachdiagnostik] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
 INSERTANS:582664X6014X310055 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_5_11	69	0.03	0.17

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	97.1	97.1
1	Ja	2.9	2.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.74 Weiterbildung_5_5_other

[
Beschreibung der Variable] **Beschreibung der Variable**

Variablenname: Weiterbildung_5_5_other

Label: [Sonstiges] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
INSERTANS:582664X6014X310055 besonders viel dazulernen?

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_5_other	69	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] **Häufigkeitsverteilung**

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		100.0	100.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.75 Weiterbildung_5_6_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_6_1
 Label: [Phonologie] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
 INSERTANS:582664X6014X310056 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_6_1	69	0.01	0.12

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	98.6	98.6
1	Ja	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.76 Weiterbildung_5_6_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_6_2
 Label: [Wortschatz] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
 INSERTANS:582664X6014X310056 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_6_2	69	0.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	100.0	100.0
1	Ja	0.0	0.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.77 Weiterbildung_5_6_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_6_3
 Label: [Reime und Lieder] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
 INSERTANS:582664X6014X310056 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_6_3	69	0.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	100.0	100.0
1	Ja	0.0	0.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.78 Weiterbildung_5_6_4

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_6_4
 Label: [Umgang mit Multikulturalitaet] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch INSERTANS:582664X6014X310056 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_6_4	69	0.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	100.0	100.0
1	Ja	0.0	0.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.79 Weiterbildung_5_6_5

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_6_5
 Label: [sprachliche Strukturen (z.B. Grammatik)] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch INSERTANS:582664X6014X310056 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_6_5	69	0.01	0.12

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	98.6	98.6
1	Ja	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.80 Weiterbildung_5_6_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_6_6
 Label: [Literacy (Lese- und Schreiberwerb)] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch INSERTANS:582664X6014X310056 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_6_6	69	0.01	0.12

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	98.6	98.6
1	Ja	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.81 Weiterbildung_5_6_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_6_7
 Label: [Kommunikation mit Eltern] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch INSERTANS:582664X6014X310056 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_6_7	69	0.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	100.0	100.0
1	Ja	0.0	0.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.82 Weiterbildung_5_6_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_6_8
 Label: [Selbstmanagement] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
 INSERTANS:582664X6014X310056 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_6_8	69	0.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	100.0	100.0
1	Ja	0.0	0.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.83 Weiterbildung_5_6_9

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_6_9
 Label: [Spracherwerb & Sprachentwicklung] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch INSERTANS:582664X6014X310056 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_6_9	69	0.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	100.0	100.0
1	Ja	0.0	0.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.84 Weiterbildung_5_6_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_6_10

Label: [Sprachfoerderung] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
INSERTANS:582664X6014X310056 besonders viel dazulernen?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_6_10	69	0.03	0.17

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	97.1	97.1
1	Ja	2.9	2.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.85 Weiterbildung_5_6_11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_5_6_11
 Label: [Sprachdiagnostik] In welchen der folgenden Bereiche konnten Sie durch
 INSERTANS:582664X6014X310056 besonders viel dazulernen?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_5_6_11	69	0.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	100.0	100.0
1	Ja	0.0	0.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.86 Weiterbildung_6_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_6_1

Label: [Jahre] Wie lange liegt Ihre letzte Weiterbildung zurueck?

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
Weiterbildung_6_1	51	47.37	284.19	0.0	2013.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

7.87 Weiterbildung_6_2

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_6_2

Label: [Monate] Wie lange liegt Ihre letzte Weiterbildung zurueck?

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
Weiterbildung_6_2	51	3.51	4.60	0.0	24.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

7.88 Weiterbildung_7_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_7_1

Label: [Die Weiterbildungen waren fuer meinen beruflichen Alltag...] Als wie nuetzlich empfinden Sie die Weiterbildungen fuer Ihren beruflichen Alltag?

Kategorien: 1 = 1 = ueberhaupt nicht nuetzlich; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5; 6 = 6 = sehr nuetzlich

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_7_1	51	4.84	1.30

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 = ueberhaupt nicht nuetzlich	3.9	2.9
2	2	3.9	2.9
3	3	2.0	1.4
4	4	23.5	17.4
5	5	27.5	20.3
6	6 = sehr nuetzlich	39.2	29.0
-99	missing	–	26.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 51$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.89 Weiterbildung_9

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_9
Label: Haben Sie schon einmal an einem Coaching im Bereich Sprache teilgenommen?
Kategorien: 1 = Ja; 2 = Nein

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_9	69	1.93	0.26

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Ja	7.2	7.2
2	Nein	92.8	92.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.90 Weiterbildung_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_10

Label: Wie lange hat das Coaching in Stunden gedauert?

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
Weiterbildung_10	5	22.40	37.83	4.0	90.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

7.91 Weiterbildung_11

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_11
 Label: Haben Sie sich selbst anderweitig im Bereich Sprachförderung/Sprache weitergebildet?
 Kategorien: 1 = Ja; 2 = Nein

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_11	69	1.65	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Ja	34.8	34.8
2	Nein	65.2	65.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.92 Weiterbildung_12_1

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_12_1
 Label: [Buecher und Zeitschriften] Wie? Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_12_1	69	0.30	0.46

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	69.6	69.6
1	Ja	30.4	30.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.93 Weiterbildung_12_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_12_2

Label: [Quellen im Internet] Wie? Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_12_2	69	0.20	0.41

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	79.7	79.7
1	Ja	20.3	20.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.94 Weiterbildung_12_3

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_12_3
 Label: [Austausch/Supervision mit Kolleg(inn)en] Wie? Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_12_3	69	0.16	0.37

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	84.1	84.1
1	Ja	15.9	15.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.95 Weiterbildung_12_4

[
Beschreibung der Variable] **Beschreibung der Variable**

Variablenname: Weiterbildung_12_4
Label: [(Fern-/Zusatz-)Studium] Wie? Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.
Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_12_4	69	0.01	0.12

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] **Häufigkeitsverteilung**

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	98.6	98.6
1	Ja	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.96 Weiterbildung_12_5

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_12_5
 Label: [Besuch von Kongressen/Tagungen] Wie? Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_12_5	69	0.13	0.34

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	87.0	87.0
1	Ja	13.0	13.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.97 Weiterbildung_12_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_12_6

Label: [Praktikum im Bereich Sprache] Wie? Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_12_6	69	0.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	100.0	100.0
1	Ja	0.0	0.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.98 Weiterbildung_12_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_12_7
 Label: [aus persönlichen Gründen (z.B. eigenes Kind mit Dyslexie)] Wie? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewählt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_12_7	69	0.04	0.21

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewählt	95.7	95.7
1	Ja	4.3	4.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.99 Weiterbildung_12_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_12_8

Label: [Beschaeftigung mit dem Thema in der eigenen Abschlussarbeit] Wie? Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_12_8	69	0.04	0.21

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	95.7	95.7
1	Ja	4.3	4.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

7.100 Weiterbildung_12_other

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Weiterbildung_12_other

Label: [Sonstiges] Wie? Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Weiterbildung_12_other	69	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		97.1	97.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8 Sprachförderung Block 1

8.1 Sprachfoerderung_1_F1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachfoerderung_1_F1

Label: [In meiner Einrichtung legen wir grossen Wert auf die Foerderung der deutschen Sprache.] Bitte kreuzen Sie fuer jede Aussage an, was am ehesten auf Sie zutrifft.

Kategorien: 1 = 1 = trifft ueberhaupt nicht zu; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5; 6 = 6 = trifft voll und ganz zu

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachfoerderung_1_F1	69	5.13	0.97

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 = trifft ueberhaupt nicht zu	0.0	0.0
2	2	0.0	0.0
3	3	10.1	10.1
4	4	10.1	10.1
5	5	36.2	36.2
6	6 = trifft voll und ganz zu	43.5	43.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.2 Sprachfoerderung_1_F2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachfoerderung_1_F2

Label: [In meinem beruflichen Alltag mache ich Sprachfoerderung.] Bitte kreuzen Sie fuer jede Aussage an, was am ehesten auf Sie zutrifft.

Kategorien: 1 = 1 = trifft ueberhaupt nicht zu; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5; 6 = 6 = trifft voll und ganz zu

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachfoerderung_1_F2	69	4.93	1.20

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 = trifft ueberhaupt nicht zu	2.9	2.9
2	2	1.4	1.4
3	3	7.2	7.2
4	4	15.9	15.9
5	5	33.3	33.3
6	6 = trifft voll und ganz zu	39.1	39.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.3 Sprachförderung_1_F3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachförderung_1_F3

Label: [Ich fühle mich persönlich verantwortlich für die sprachliche Entwicklung der Kinder in meiner Einrichtung.] Bitte kreuzen Sie für jede Aussage an, was am ehesten auf Sie zutrifft.

Kategorien: 1 = 1 = trifft überhaupt nicht zu; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5; 6 = 6 = trifft voll und ganz zu

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachförderung_1_F3	69	4.96	1.08

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 = trifft überhaupt nicht zu	1.4	1.4
2	2	0.0	0.0
3	3	10.1	10.1
4	4	14.5	14.5
5	5	37.7	37.7
6	6 = trifft voll und ganz zu	36.2	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.4 Sprachfoerderung_1_F4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachfoerderung_1_F4

Label: [Ich fuehle mich dazu in der Lage, Sprachfoerderung durchzufuehren.] Bitte kreuzen Sie fuer jede Aussage an, was am ehesten auf Sie zutrifft.

Kategorien: 1 = 1 = trifft ueberhaupt nicht zu; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5; 6 = 6 = trifft voll und ganz zu

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachfoerderung_1_F4	69	4.54	1.15

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 = trifft ueberhaupt nicht zu	0.0	0.0
2	2	4.3	4.3
3	3	15.9	15.9
4	4	24.6	24.6
5	5	31.9	31.9
6	6 = trifft voll und ganz zu	23.2	23.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.5 Sprachfoerderung_1_F5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachfoerderung_1_F5

Label: [Ich fuehle mich dazu in der Lage, den Sprachstand von Kindern festzustellen.]
 Bitte kreuzen Sie fuer jede Aussage an, was am ehesten auf Sie zutrifft.

Kategorien: 1 = 1 = trifft ueberhaupt nicht zu; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5; 6 = 6 = trifft voll
 und ganz zu

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachfoerderung_1_F5	69	3.80	1.21

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 = trifft ueberhaupt nicht zu	1.4	1.4
2	2	17.4	17.4
3	3	18.8	18.8
4	4	29.0	29.0
5	5	29.0	29.0
6	6 = trifft voll und ganz zu	4.3	4.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.6 Sprachfoerderung_1_F6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachfoerderung_1_F6

Label: [Ich foerdere lieber intuitiv und spontan als spezielle Foerdermaterialien einzusetzen.] Bitte kreuzen Sie fuer jede Aussage an, was am ehesten auf Sie zutrifft.

Kategorien: 1 = 1 = trifft ueberhaupt nicht zu; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5; 6 = 6 = trifft voll und ganz zu

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachfoerderung_1_F6	69	3.65	1.32

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 = trifft ueberhaupt nicht zu	2.9	2.9
2	2	18.8	18.8
3	3	26.1	26.1
4	4	23.2	23.2
5	5	20.3	20.3
6	6 = trifft voll und ganz zu	8.7	8.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.7 Sprachfoerderung_1_F7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachfoerderung_1_F7

Label: [Ich finde ganzheitliche Sprachfoerderung wichtiger als Foerderung in speziellen sprachlichen Bereichen.] Bitte kreuzen Sie fuer jede Aussage an, was am ehesten auf Sie zutrifft.

Kategorien: 1 = 1 = trifft ueberhaupt nicht zu; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5; 6 = 6 = trifft voll und ganz zu

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachfoerderung_1_F7	69	4.51	1.24

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 = trifft ueberhaupt nicht zu	0.0	0.0
2	2	5.8	5.8
3	3	18.8	18.8
4	4	21.7	21.7
5	5	26.1	26.1
6	6 = trifft voll und ganz zu	27.5	27.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.8 Sprachfoerderung_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachfoerderung_2

Label: Seit wann machen Sie Sprachfoerderung?

Kategorien: 1 = *seit weniger als 1 Jahr*; 2 = *seit 1-3 Jahren*; 3 = *seit 4-6 Jahren*; 4 = *seit 7-10 Jahren*; 5 = *seit 11-20 Jahren*; 6 = *seit 21-30 Jahren*; 7 = *seit mehr als 30 Jahren*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachfoerderung_2	67	3.55	1.79

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	seit weniger als 1 Jahr	11.9	11.6
2	seit 1-3 Jahren	25.4	24.6
3	seit 4-6 Jahren	13.4	13.0
4	seit 7-10 Jahren	16.4	15.9
5	seit 11-20 Jahren	17.9	17.4
6	seit 21-30 Jahren	7.5	7.2
7	seit mehr als 30 Jahren	7.5	7.2
-99	missing	–	2.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 67$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.9 Sprachfoerderung_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachfoerderung_3
 Label: Nutzen Sie ein bestimmtes Foerderprogramm?
 Kategorien: 1 = *Ja*; 2 = *Nein*
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachfoerderung_3	67	1.76	0.43

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Ja	23.9	23.2
2	Nein	76.1	73.9
-99	missing	–	2.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 67$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.10 Sprachfoerderung_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachfoerderung_4

Label: Welche(s)?

[

Häufigkeitsverteilung]Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
	(kein Label vergeben)	76.8	76.8
Deutsch	(kein Label vergeben)	1.4	1.4
als Zweit-			
sprachefu-			
er den			
Schulstart			
Deutsch	(kein Label vergeben)	5.8	5.8
fuer den			
Schulstart			
DfdS	(kein Label vergeben)	1.4	1.4
Hamburger	(kein Label vergeben)	1.4	1.4
Schreib-			
probeWu-			
erzbürger			
Sprach-			
training			
Hoeren	(kein Label vergeben)	1.4	1.4
Lauschen			
Kikus	(kein Label vergeben)	1.4	1.4

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
Teilweise	(kein Label vergeben)	1.4	1.4
Material			
fuer den			
Vorlauf-			
kurs			
Wir	(kein Label vergeben)	1.4	1.4
arbeiten			
alltagsin-			
tegriert			
mit der			
Marte			
Meo			
Methode			
und dem			
DJI Pro-			
gramm			
(alltagsin-			
tegrierte			
Sprach-			
foerde-			
rung			
Wuerzburger	(kein Label vergeben)	1.4	1.4
Program-			
mIch			
weiss die			
Titel nicht			
mehr...Sorry,			
es waren			
so eini-			
ge...Hamburger			
A			
Wuerzburger	(kein Label vergeben)	1.4	1.4
Sprach-			
training			

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
Wuppi	<i>(kein Label vergeben)</i>	1.4	1.4
Zahlenland	<i>(kein Label vergeben)</i>	1.4	1.4
Zauberbox	<i>(kein Label vergeben)</i>	1.4	1.4
und Wu- erzburger			

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.11 Sprachstand_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachstand_1

Label: Stellen Sie vor der Sprachförderung den Sprachstand der Kinder fest?

Kategorien: 1 = *Ja*; 2 = *Nein*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachstand_1	67	1.55	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Ja	44.8	43.5
2	Nein	55.2	53.6
-99	missing	–	2.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 67$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.12 Sprachstand_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachstand_2

Label: Nutzen Sie dafuer ein bestimmtes Verfahren?

Kategorien: 1 = Ja; 2 = Nein, ich beobachte die Kinder, ohne ein bestimmtes Verfahren
anzuwenden

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachstand_2	30	1.60	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Ja	40.0	17.4
2	Nein, ich beobachte die Kinder, ohne ein bestimmtes Verfahren anzuwenden	60.0	26.1
-99	missing	–	56.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 30$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.13 Phonologie_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Phonologie_1

Label: Stellen Sie sich das Wort Schneemann ausgesprochen vor. Wie viele Laute hat dieses Wort? (Hilfe: Sprechen Sie das Wort einmal leise und langsam fuer sich aus.)

Kategorien: 1 = 2; 2 = 6; 3 = 8; 4 = 10

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Phonologie_1	69	1.61	0.60

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	2	43.5	43.5
2	6	53.6	53.6
3	8	1.4	1.4
4	10	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.14 Phonologie_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Phonologie_4

Label: Welches der Woerter in der Liste hat das gleiche Betonungsmuster wie Sofa?

Kategorien: 1 = *Gesicht*; 2 = *Skandal*; 3 = *Tapete*; 4 = *Tennis*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Phonologie_4	69	2.68	1.24

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Gesicht	23.2	23.2
2	Skandal	27.5	27.5
3	Tapete	7.2	7.2
4	Tennis	42.0	42.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.15 Phonologie_5_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Phonologie_5_1

Label: [Der Mann will unter der Absperrung durchfahren.] Welche Bedeutung(en) hat der folgende Satz? Der Mann will die Absperrung umfahren. Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Phonologie_5_1	69	0.01	0.12

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	98.6	98.6
1	Ja	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.16 Phonologie_5_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Phonologie_5_2

Label: [Der Mann will die Absperrung zu Fall bringen.] Welche Bedeutung(en) hat der folgende Satz? Der Mann will die Absperrung umfahren. Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Phonologie_5_2	69	0.26	0.44

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	73.9	73.9
1	Ja	26.1	26.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.17 Phonologie_5_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Phonologie_5_3

Label: [Der Mann will um die Absperrung herumfahren.] Welche Bedeutung(en) hat der folgende Satz? Der Mann will die Absperrung umfahren. Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Phonologie_5_3	69	0.99	0.12

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	1.4	1.4
1	Ja	98.6	98.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.18 Phonologie_5_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Phonologie_5_4

Label: [Der Mann will die Absperrung woanders hinbringen.] Welche Bedeutung(en) hat der folgende Satz? Der Mann will die Absperrung umfahren. Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewählt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Phonologie_5_4	69	0.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewählt	100.0	100.0
1	Ja	0.0	0.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.19 Phonologie_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Phonologie_7

Label: Was versteht man unter „phonologischer Bewusstheit“ im engeren Sinne?

Kategorien: 1 = *Das bewusste Zuhören und Wiedergeben-Können beim Geschichten vorlesen.*; 2 = *Das bewusste, treffsichere Ausdrucksvermögen.*; 3 = *Den bewussten Einsatz von korrekten deutschen Begriffen.*; 4 = *Den bewussten Umgang mit den kleinsten Einheiten der gesprochenen Sprache.*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Phonologie_7	69	3.01	1.34

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Das bewusste Zuhören und Wiedergeben-Können beim Geschichten vorlesen.	27.5	27.5
2	Das bewusste, treffsichere Ausdrucksvermögen.	5.8	5.8
3	Den bewussten Einsatz von korrekten deutschen Begriffen.	4.3	4.3
4	Den bewussten Umgang mit den kleinsten Einheiten der gesprochenen Sprache.	62.3	62.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.20 Lexikon_2_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Lexikon_2_1

Label: [Der] Welche Woerter im untenstehenden Satz sind Pronomen? „Der soll dem Frosch doch nichts schenken“, rief sie und schmolte. Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Lexikon_2_1	69	0.49	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	50.7	50.7
1	Ja	49.3	49.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.21 Lexikon_2_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Lexikon_2_2

Label: [soll] Welche Woerter im untenstehenden Satz sind Pronomen? „Der soll dem Frosch doch nichts schenken“, rief sie und schmolte. Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Lexikon_2_2	69	0.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	100.0	100.0
1	Ja	0.0	0.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.22 Lexikon_2_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Lexikon_2_3

Label: [dem] Welche Woerter im untenstehenden Satz sind Pronomen? „Der soll dem Frosch doch nichts schenken“, rief sie und schmolte. Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Lexikon_2_3	69	0.39	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	60.9	60.9
1	Ja	39.1	39.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.23 Lexikon_2_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Lexikon_2_4

Label: [Frosch] Welche Woerter im untenstehenden Satz sind Pronomen? „Der soll dem Frosch doch nichts schenken“, rief sie und schmolte. Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Lexikon_2_4	69	0.07	0.26

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	92.8	92.8
1	Ja	7.2	7.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.24 Lexikon_2_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Lexikon_2_5

Label: [doch] Welche Woerter im untenstehenden Satz sind Pronomen? „Der soll dem Frosch doch nichts schenken“, rief sie und schmolte. Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Lexikon_2_5	69	0.12	0.32

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	88.4	88.4
1	Ja	11.6	11.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.25 Lexikon_2_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Lexikon_2_6

Label: [nichts] Welche Woerter im untenstehenden Satz sind Pronomen? „Der soll dem Frosch doch nichts schenken“, rief sie und schmolte. Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Lexikon_2_6	69	0.07	0.26

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	92.8	92.8
1	Ja	7.2	7.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.26 Lexikon_2_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Lexikon_2_7

Label: [schenken] Welche Woerter im untenstehenden Satz sind Pronomen? „Der soll dem Frosch doch nichts schenken“, rief sie und schmolte. Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Lexikon_2_7	69	0.03	0.17

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	97.1	97.1
1	Ja	2.9	2.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.27 Lexikon_2_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Lexikon_2_8

Label: [rief] Welche Woerter im untenstehenden Satz sind Pronomen? „Der soll dem Frosch doch nichts schenken“, rief sie und schmolte. Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Lexikon_2_8	69	0.01	0.12

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	98.6	98.6
1	Ja	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.28 Lexikon_2_9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Lexikon_2_9

Label: [sie] Welche Woerter im untenstehenden Satz sind Pronomen? „Der soll dem Frosch doch nichts schenken“, rief sie und schmolte. Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Lexikon_2_9	69	0.62	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	37.7	37.7
1	Ja	62.3	62.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.29 Lexikon_2_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Lexikon_2_10

Label: [und] Welche Woerter im untenstehenden Satz sind Pronomen? „Der soll dem Frosch doch nichts schenken“, rief sie und schmolte. Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Lexikon_2_10	69	0.03	0.17

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	97.1	97.1
1	Ja	2.9	2.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.30 Lexikon_2_11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Lexikon_2_11

Label: [schmollte] Welche Woerter im untenstehenden Satz sind Pronomen? „Der soll dem Frosch doch nichts schenken“, rief sie und schmollte. Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Lexikon_2_11	69	0.04	0.21

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	95.7	95.7
1	Ja	4.3	4.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.31 Lexikon_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Lexikon_4

Label: Kreuzen Sie an, zu welcher Wortklasse das unterstrichene Wort in diesem Satz
gehört. Er hat eine grosse Nase.Kategorien: 1 = *Hilfsverb*; 2 = *Modalverb*; 3 = *Vollverb*; 4 = *Partikelverb*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Lexikon_4	69	2.01	0.98

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Hilfsverb	44.9	44.9
2	Modalverb	10.1	10.1
3	Vollverb	43.5	43.5
4	Partikelverb	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.32 Lexikon_6_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Lexikon_6_1

Label: [Da bin ich aus allen Socken gefallen.] Welche der folgenden Aeusserungen wuerden Sie bei Erwachsenen fuer erwartbare Versprecher halten? Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Lexikon_6_1	69	0.59	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	40.6	40.6
1	Ja	59.4	59.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.33 Lexikon_6_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Lexikon_6_2

Label: [Die Luftballone will der haben.] Welche der folgenden Aeusserungen wuerden Sie bei Erwachsenen fuer erwartbare Versprecher halten? Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Lexikon_6_2	69	0.23	0.43

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	76.8	76.8
1	Ja	23.2	23.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.34 Lexikon_6_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Lexikon_6_3

Label: [Mit dem Zinger feigt man nicht.] Welche der folgenden Aeusserungen wuerden Sie bei Erwachsenen fuer erwartbare Versprecher halten? Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Lexikon_6_3	69	0.32	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	68.1	68.1
1	Ja	31.9	31.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.35 Lexikon_6_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Lexikon_6_4

Label: [Meine Junge ist gut im Fussball.] Welche der folgenden Aeusserungen wuerden Sie bei Erwachsenen fuer erwartbare Versprecher halten? Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Lexikon_6_4	69	0.43	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	56.5	56.5
1	Ja	43.5	43.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.36 Morphologie_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Morphologie_1

Label: Was bedeutet es, wenn man sagt, dass ein Verb im Deutschen finit ist?

Kategorien: 1 = *Das Verb darf nur am Ende eines Satzes stehen.*; 2 = *Das Verb enthaelt Informationen ueber Person, Numerus, Tempus.*; 3 = *Das Verb enthaelt Informationen ueber Kasus und Genus.*; 4 = *Das Verb zeigt an, dass die Handlung abgeschlossen ist.*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Morphologie_1	69	2.57	0.85

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Das Verb darf nur am Ende eines Satzes stehen.	4.3	4.3
2	Das Verb enthaelt Informationen ueber Person, Numerus, Tempus.	53.6	53.6
3	Das Verb enthaelt Informationen ueber Kasus und Genus.	23.2	23.2
4	Das Verb zeigt an, dass die Handlung abgeschlossen ist.	18.8	18.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.37 Morphologie_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Morphologie_4

Label: Viele Sprachen – so auch das Deutsche – haben die Möglichkeit, die wichtigsten Mitspieler neben dem Verb, das Subjekt und das Objekt, zu markieren. Diese Markierung nennt man Kasus. Für Subjekt und Objekt bedeutet dies, dass die in ihnen enthaltenen

Kategorien: 1 = *Nominativ*; 2 = *Genitiv*; 3 = *Dativ*; 4 = *Akkusativ*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Morphologie_4	69	3.30	1.23

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Nominativ	20.3	20.3
2	Genitiv	2.9	2.9
3	Dativ	2.9	2.9
4	Akkusativ	73.9	73.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.38 Morphologie_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Morphologie_5

Label: Wählen Sie das passende Genus des Nomens Krokodile.

Kategorien: 1 = weiblich; 2 = saechlich; 3 = maennlich; 4 = unbelebt

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Morphologie_5	69	1.90	0.77

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	weiblich	27.5	27.5
2	saechlich	62.3	62.3
3	maennlich	2.9	2.9
4	unbelebt	7.2	7.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.39 Morphologie_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Morphologie_6

Label: Sehen Sie sich bitte folgende systematische Darstellung der verschiedenen Nomenklassen an. Einige Artikelformen in den verschiedenen Kasus und Genera kommen doppelt oder sogar dreifach vor. Eine Form/ein Artikel, z.B. die erfüllt also mehrere Funktionen.

Kategorien: 1 = *maennliche*; 2 = *saechliche und belebte*; 3 = *saechliche*; 4 = *weibliche und saechliche*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Morphologie_6	69	1.94	1.27

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	maennliche	58.0	58.0
2	saechliche und belebte	14.5	14.5
3	saechliche	2.9	2.9
4	weibliche und saechliche	24.6	24.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.40 Syntax_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Syntax_1

Label: Betrachten Sie folgende Sätze und achten Sie besonders darauf, wo die finiten Verben stehen. Die Prinzessin wollte mit ihrer goldenen Kugel spielen. Ich habe eine goldene Kugel. Die kleine Prinzessin küsste den Frosch. In welcher Position steht normalerweise

Kategorien: 1 = die Position des Verbs ist nicht festgelegt; 2 = in der dritten Position; 3 = in der zweiten Position; 4 = in der letzten Position

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Syntax_1	69	2.45	1.01

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	die Position des Verbs ist nicht festgelegt	29.0	29.0
2	in der dritten Position	5.8	5.8
3	in der zweiten Position	56.5	56.5
4	in der letzten Position	8.7	8.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.41 Syntax_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Syntax_2

Label: Betrachten Sie nun folgende Nebensätze und achten Sie dabei ebenfalls auf die finiten Verben. ... weil die Prinzessin den Frosch nicht mehr mag. ... weil der Frosch und der Prinz mit der Prinzessin spielen wollen. In welcher Position steht normalerweise

Kategorien: 1 = *die Position ist nicht festgelegt*; 2 = *in der letzten Position*; 3 = *in der dritten Position*; 4 = *in der vorletzten Position*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Syntax_2	69	2.12	0.87

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	die Position ist nicht festgelegt	17.4	17.4
2	in der letzten Position	68.1	68.1
3	in der dritten Position	0.0	0.0
4	in der vorletzten Position	14.5	14.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.42 Syntax_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Syntax_3

Label: Lesen Sie sich den folgenden Satz durch und kreuzen Sie eine Option an. Mit der unehorsamen Prinzessin schimpfte der alte Koenig am Abend beim Festmahl. Welcher der Satzteile ist das Objekt?

Kategorien: 1 = *am Abend*; 2 = *beim Festmahl*; 3 = *der alte Koenig*; 4 = *mit der unehorsamen Prinzessin*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Syntax_3	69	3.39	0.88

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	am Abend	1.4	1.4
2	beim Festmahl	21.7	21.7
3	der alte Koenig	13.0	13.0
4	mit der unehorsamen Prinzessin	63.8	63.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.43 Syntax_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Syntax_4

Label: Woran kann man in diesem Satz verlässlich erkennen, welches Satzglied das Subjekt oder Objekt ist? Dann warf die kleine Prinzessin den Frosch an die Wand.
Verb Subjekt Objekt

Kategorien: 1 = *Bezug auf Personen (Subjekt) oder Gegenstände (Objekt)*;
2 = *Unterschiedliches Genus*; 3 = *Stellung im Satz*; 4 = *Unterschiedliche Kasusmarkierung*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Syntax_4	69	2.43	1.36

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Bezug auf Personen (Subjekt) oder Gegenstände (Objekt)	42.0	42.0
2	Unterschiedliches Genus	8.7	8.7
3	Stellung im Satz	13.0	13.0
4	Unterschiedliche Kasusmarkierung	36.2	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.44 Syntax_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Syntax_5

Label: Sobald Kinder die Struktur deutscher Sätze beherrschen, beginnen sie, Sätze miteinander zu kombinieren. Welche Sätze wurden hier in welcher Reihenfolge miteinander kombiniert? Die Prinzessin wusste nicht, dass er dann zum Prinzen wird.

Kategorien: 1 = *Nebensatz und Hauptsatz*; 2 = *Hauptsatz und Nebensatz*; 3 = *Hauptsatz und Hauptsatz*; 4 = *Hauptsatz und Relativsatz*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Syntax_5	69	2.49	1.05

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Nebensatz und Hauptsatz	14.5	14.5
2	Hauptsatz und Nebensatz	49.3	49.3
3	Hauptsatz und Hauptsatz	8.7	8.7
4	Hauptsatz und Relativsatz	27.5	27.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.45 Semantik_Pragmatik_1_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Semantik_Pragmatik_1_1

Label: [Maria dachte oft an den kleinen Jungen.] Welche der folgenden Sätze sind mehrdeutig und können nur durch zusätzliche Informationen eindeutig gemacht werden? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewählt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Semantik_Pragmatik_1_1	69	0.38	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewählt	62.3	62.3
1	Ja	37.7	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.46 Semantik_Pragmatik_1_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Semantik_Pragmatik_1_2

Label: [Picasso malte den Kardinal ohne Brille.] Welche der folgenden Sätze sind mehrdeutig und können nur durch zusätzliche Informationen eindeutig gemacht werden? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewählt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Semantik_Pragmatik_1_2	69	0.57	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewählt	43.5	43.5
1	Ja	56.5	56.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.47 Semantik_Pragmatik_1_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Semantik_Pragmatik_1_3

Label: [Alte Maenner und Frauen gingen von Bord.] Welche der folgenden Saetze sind mehrdeutig und koennen nur durch zusaetzliche Informationen eindeutig gemacht werden? Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Semantik_Pragmatik_1_3	69	0.59	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	40.6	40.6
1	Ja	59.4	59.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.48 Semantik_Pragmatik_1_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Semantik_Pragmatik_1_4

Label: [Tina trank gestern Tee.] Welche der folgenden Sätze sind mehrdeutig und können nur durch zusätzliche Informationen eindeutig gemacht werden? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewählt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Semantik_Pragmatik_1_4	69	0.17	0.38

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewählt	82.6	82.6
1	Ja	17.4	17.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.49 Semantik_Pragmatik_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Semantik_Pragmatik_3

Label: Was unterscheidet die beiden folgenden Sätze voneinander? Der Froschkönig gab der Prinzessin widerwillig den Ring. Den Ring gab der Froschkönig der Prinzessin widerwillig.

Kategorien: 1 = die Sätze liefern unterschiedliche Informationen; 2 = die gleiche Information wird unterschiedlich verpackt; 3 = falsche Kasusmarkierung im zweiten Satz; 4 = falsche Satzstellung im zweiten Satz

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Semantik_Pragmatik_3	69	2.52	0.87

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	die Sätze liefern unterschiedliche Informationen	1.4	1.4
2	die gleiche Information wird unterschiedlich verpackt	68.1	68.1
3	falsche Kasusmarkierung im zweiten Satz	7.2	7.2
4	falsche Satzstellung im zweiten Satz	23.2	23.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.50 Semantik_Pragmatik_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Semantik_Pragmatik_4

Label: Was ist am folgenden Satz auffaellig? Auch der Koenig wollte einen Froschkoenig kuessen.

Kategorien: 1 = *Der Satz vermischt Gegenwarts- und Vergangenheitsformen.*; 2 = *Er ist unverstaendlich.*; 3 = *Eine bestimmte Aussage wird als wahr vorausgesetzt.*; 4 = *Eine bestimmte Aussage wird als nicht wahr vorausgesetzt.*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Semantik_Pragmatik_4	69	2.64	0.91

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Der Satz vermischt Gegenwarts- und Vergangenheitsformen.	18.8	18.8
2	Er ist unverstaendlich.	8.7	8.7
3	Eine bestimmte Aussage wird als wahr vorausgesetzt.	62.3	62.3
4	Eine bestimmte Aussage wird als nicht wahr vorausgesetzt.	10.1	10.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.51 Soziolinguistik_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Soziolinguistik_2

Label: Woran koennte es liegen, wenn ein Kind zu fremden Erwachsenen immer „du“ sagt?

Kategorien: 1 = *Das Kind ist unhoefflich.*; 2 = *Das Kind kennt die Moeglichkeit, Hoeflichkeit auszudruecken nicht.*; 3 = *Das Kind ist zu zutraulich.*; 4 = *Das Kind kann das Genus nicht unterscheiden.*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Soziolinguistik_2	69	3.04	0.93

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Das Kind ist unhoefflich.	0.0	0.0
2	Das Kind kennt die Moeglichkeit, Hoeflichkeit auszudruecken nicht.	40.6	40.6
3	Das Kind ist zu zutraulich.	14.5	14.5
4	Das Kind kann das Genus nicht unterscheiden.	44.9	44.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.52 Soziolinguistik_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Soziolinguistik_3

Label: Ein Kind sagt immer wieder Sätze folgender Art: Wir tun immer malen. Papa tut mir ein Luftballon kaufen. Was könnte der Grund dafür sein?

Kategorien: 1 = *Das Kind kann nicht richtig zuhören.*; 2 = *Das Kind hat eine Spracherwerbsstörung.*; 3 = *Das Kind kann deutsche Verben nicht richtig verwenden.*; 4 = *Dem Kind fehlt es an anderen stilistischen Ausdrucksmitteln.*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Soziolinguistik_3	69	3.42	0.53

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Das Kind kann nicht richtig zuhören.	0.0	0.0
2	Das Kind hat eine Spracherwerbsstörung.	1.4	1.4
3	Das Kind kann deutsche Verben nicht richtig verwenden.	55.1	55.1
4	Dem Kind fehlt es an anderen stilistischen Ausdrucksmitteln.	43.5	43.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.53 Soziolinguistik_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Soziolinguistik_4

Label: Ein Junge mit Migrationshintergrund in Ihrer Einrichtung spricht Sie und Ihre Kolleginnen nicht spontan an. In der Gruppe haben Sie allerdings schon gehoert, dass er seine Freunde auf Deutsch anspricht. Was koennte die Ursache fuer dieses unterschiedliche

Kategorien: 1 = *Das Kind hat aufgrund seines kulturellen Hintergrunds bestimmte Annahmen darueber, wer wen anspricht.*; 2 = *Das Kind hat aufgrund seines Migrationshintergrundes grosse Defizite im Deutschen und kann sich nicht ausdruecken.*; 3 = *Das Kind ist schlecht erzogen.*; 4 = *Das Kind hat moeglicherweise eine Spracherwerbsstoerung.*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Soziolinguistik_4	69	1.28	0.54

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Das Kind hat aufgrund seines kulturellen Hintergrunds bestimmte Annahmen darueber, wer wen anspricht.	75.4	75.4
2	Das Kind hat aufgrund seines Migrationshintergrundes grosse Defizite im Deutschen und kann sich nicht ausdruecken.	23.2	23.2
3	Das Kind ist schlecht erzogen.	0.0	0.0

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
4	Das Kind hat moeglicherweise eine Spracherwerbsstoerung.	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.54 Erwerb_1_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_1_1

Label: [regelt die Form von Woertern; besteht aus Flexion und Wortbildung] Wenn man Sprache genauer untersucht, kann man 5 verschiedene Teilbereiche identifizieren, die unter den unten stehenden Fachbegriffen bekannt sind. Welche Definition beschreibt welches sp

Kategorien: 1 = *Morphologie*; 2 = *Pragmatik*; 3 = *Phonologie*; 4 = *Syntax*; 5 = *Semantik*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_1_1	69	2.75	1.67

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Morphologie	37.7	37.7
2	Pragmatik	14.5	14.5
3	Phonologie	7.2	7.2
4	Syntax	15.9	15.9
5	Semantik	24.6	24.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.55 Erwerb_1_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_1_2

Label: [gibt Auskunft darueber, was Sprecher in bestimmten Situationen wirklich meinen und ueber angemessenes Sprachverhalten] Wenn man Sprache genauer untersucht, kann man 5 verschiedene Teilbereiche identifizieren, die unter den unten stehenden Fachbegriffen b

Kategorien: 1 = *Morphologie*; 2 = *Pragmatik*; 3 = *Phonologie*; 4 = *Syntax*; 5 = *Semantik*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_1_2	69	2.97	1.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Morphologie	13.0	13.0
2	Pragmatik	43.5	43.5
3	Phonologie	5.8	5.8
4	Syntax	8.7	8.7
5	Semantik	29.0	29.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.56 Erwerb_1_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_1_3

Label: [gibt Auskunft ueber die Lautstruktur einer Sprache sowie ueber melodische und rhythmische Eigenschaften] Wenn man Sprache genauer untersucht, kann man 5 verschiedene Teilbereiche identifizieren, die unter den unten stehenden Fachbegriffen bekannt sind. W

Kategorien: 1 = *Morphologie*; 2 = *Pragmatik*; 3 = *Phonologie*; 4 = *Syntax*; 5 = *Semantik*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_1_3	69	2.96	0.63

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Morphologie	4.3	4.3
2	Pragmatik	4.3	4.3
3	Phonologie	87.0	87.0
4	Syntax	0.0	0.0
5	Semantik	4.3	4.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.57 Erwerb_1_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_1_4

Label: [beschäftigt sich mit dem Satzbau; System von Regeln, die beschreiben, wie aus Grundelementen (Wörtern) wohlgeformte Sätze gebildet werden] Wenn man Sprache genauer untersucht, kann man 5 verschiedene Teilbereiche identifizieren, die unter den unten st

Kategorien: 1 = *Morphologie*; 2 = *Pragmatik*; 3 = *Phonologie*; 4 = *Syntax*; 5 = *Semantik*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_1_4	69	3.67	1.05

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Morphologie	1.4	1.4
2	Pragmatik	21.7	21.7
3	Phonologie	2.9	2.9
4	Syntax	56.5	56.5
5	Semantik	17.4	17.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.58 Erwerb_1_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_1_5

Label: [beschreibt/betrifft die Bedeutung sprachlicher Zeichen] Wenn man Sprache genauer untersucht, kann man 5 verschiedene Teilbereiche identifizieren, die unter den unten stehenden Fachbegriffen bekannt sind. Welche Definition beschreibt welches sprachliche T

Kategorien: 1 = *Morphologie*; 2 = *Pragmatik*; 3 = *Phonologie*; 4 = *Syntax*; 5 = *Semantik*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_1_5	69	2.80	1.67

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Morphologie	37.7	37.7
2	Pragmatik	13.0	13.0
3	Phonologie	4.3	4.3
4	Syntax	21.7	21.7
5	Semantik	23.2	23.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.59 Erwerb_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_2

Label: Der 3-jaehrige Bruno (Deutsch als Erstsprache) lernt jeden Tag neue Woerter. Ueber mehrere Wochen spricht er sie aber anders aus. Er sagt z.B. nane fuer Banane toffel fuer Kartoffel Welche Regelmassigkeit erkennen Sie?

Kategorien: 1 = *Das Kind laesst unbetonte Silben aus.*; 2 = *Das Kind laesst bedeutungslose Silben aus.*; 3 = *Das Kind laesst komplexe Silben aus.*; 4 = *Das Kind laesst betonte Silben aus.*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_2	69	3.30	1.22

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Das Kind laesst unbetonte Silben aus.	18.8	18.8
2	Das Kind laesst bedeutungslose Silben aus.	5.8	5.8
3	Das Kind laesst komplexe Silben aus.	1.4	1.4
4	Das Kind laesst betonte Silben aus.	73.9	73.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.60 Erwerb_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_3

Label: Warum produzieren Kinder Äußerungen wie taputt dedang, ich tann neue Turm bauen, ein dantz dosse Turm mach ich?

Kategorien: 1 = *Sie koennen keine Konsonanten produzieren.*; 2 = *Sie nutzen eine Vereinfachungsstrategie.*; 3 = *Sie koennen noch nicht lesen.*; 4 = *Sie machen nach, was sie von den Eltern gehoert haben.*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_3	69	1.49	0.58

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Sie koennen keine Konsonanten produzieren.	53.6	53.6
2	Sie nutzen eine Vereinfachungsstrategie.	44.9	44.9
3	Sie koennen noch nicht lesen.	0.0	0.0
4	Sie machen nach, was sie von den Eltern gehoert haben.	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.61 Erwerb_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_4

Label: Wie erkennen Kinder im kontinuierlichen Lautstrom einzelne Bestandteile (Woerter, Silben, etc.)?

Kategorien: 1 = *Sie achten auf Akzent und Rhythmus.*; 2 = *Sie warten, bis die Woerter alleine auftauchen.*; 3 = *Sie muessen zuerst die Bedeutung lernen.*; 4 = *Sie muessen die Woerter von verschiedenen Sprechern hoeren.*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_4	69	1.58	0.95

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Sie achten auf Akzent und Rhythmus.	71.0	71.0
2	Sie warten, bis die Woerter alleine auftauchen.	2.9	2.9
3	Sie muessen zuerst die Bedeutung lernen.	23.2	23.2
4	Sie muessen die Woerter von verschiedenen Sprechern hoeren.	2.9	2.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.62 Erwerb_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_5

Label: Sie geben einem zweijährigen Kind, mit dem sie zuvor schon mehrmals über Baeren gesprochen haben, ein Baeren-Stofftier in die Hand und sagen: „Schau mal, so ein liebes Tier!“ Das Kind sagt: „Das nicht Tier, das ein Baer.“ Was könnte aus spracherwerbstheor

Kategorien: 1 = Das Kind geht davon aus, dass man mit dem Wort Baer alle Tiere bezeichnen kann.; 2 = Das Kind geht davon aus, dass jedes Objekt nur durch einen Begriff bezeichnet werden kann.; 3 = Das Kind ist nicht intelligent genug, um zu verstehen, dass Baeren auch Tiere sind.; 4 = Das Kind geht davon aus, dass Baeren keine Tiere sind.

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_5	69	2.13	0.84

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Das Kind geht davon aus, dass man mit dem Wort Baer alle Tiere bezeichnen kann.	15.9	15.9
2	Das Kind geht davon aus, dass jedes Objekt nur durch einen Begriff bezeichnet werden kann.	68.1	68.1
3	Das Kind ist nicht intelligent genug, um zu verstehen, dass Baeren auch Tiere sind.	2.9	2.9
4	Das Kind geht davon aus, dass Baeren keine Tiere sind.	13.0	13.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.63 Erwerb_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_6

Label: In welcher Reihenfolge lernen Kinder normalerweise unterschiedliche Wortarten?

Kategorien: 1 = *zuerst Nomen, dann Verben, spaeter erst Konjunktionen*; 2 = *zuerst Nomen, dann Konjunktionen, spaeter erst Verben*; 3 = *zuerst Verben, dann Nomen, spaeter erst Konjunktionen*; 4 = *zuerst Konjunktionen, dann Nomen, spaeter erst Verben*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_6	69	1.35	0.82

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	zuerst Nomen, dann Verben, spaeter erst Konjunktionen	84.1	84.1
2	zuerst Nomen, dann Konjunktionen, spaeter erst Verben	0.0	0.0
3	zuerst Verben, dann Nomen, spaeter erst Konjunktionen	13.0	13.0
4	zuerst Konjunktionen, dann Nomen, spaeter erst Verben	2.9	2.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.64 Erwerb_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_8

Label: Ein einsprachiges Kind produziert weniger als 50 Woerter wie Ball oder Mama.
Ab welchem Alter machen Sie sich zum ersten Mal Sorgen und ueberlegen, ob das Kind moeglicherweise eine Sprachentwicklungsstoerung hat?

Kategorien: 1 = ...wenn das Kind 2 Jahre alt ist.; 2 = ...wenn das Kind 1,5 Jahre alt ist.;
3 = ...wenn das Kind 3 Jahre alt ist.; 4 = ...wenn das Kind 1 Jahr alt ist.

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_8	69	1.96	0.96

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	...wenn das Kind 2 Jahre alt ist.	46.4	46.4
2	...wenn das Kind 1,5 Jahre alt ist.	13.0	13.0
3	...wenn das Kind 3 Jahre alt ist.	39.1	39.1
4	...wenn das Kind 1 Jahr alt ist.	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.65 Erwerb_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_10

Label: Ein Kind verwendet ueber einen Zeitraum von 4 Monaten die korrekte Pluralform von Bruder. Ploetzlich sagt es immer „Brudern“, wenn es mehr als einen Bruder meint. Das hat es vorher nie gemacht. Was nehmen Sie in diesem Fall an?

Kategorien: 1 = *Das Kind hat begonnen eine weitere Sprache zu erwerben.*; 2 = *Das Kind durchlauft den normalen Erwerbsprozess.*; 3 = *Das Kind hat vergessen, wie man Pluralformen bildet.*; 4 = *Das Kind hat eine Sprachstoerung im Bereich Phonologie.*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_10	69	1.99	0.63

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Das Kind hat begonnen eine weitere Sprache zu erwerben.	15.9	15.9
2	Das Kind durchlauft den normalen Erwerbsprozess.	73.9	73.9
3	Das Kind hat vergessen, wie man Pluralformen bildet.	5.8	5.8
4	Das Kind hat eine Sprachstoerung im Bereich Phonologie.	4.3	4.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.66 Erwerb_11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_11

Label: Angenommen Sie hören, wie ein Kind folgenden Satz produziert: Die willt nach Hause. Was fällt Ihnen am Verb auf?

Kategorien: 1 = *Die Verbendung ist willkuerlich gewaehlt.*; 2 = *Das Verb ist nicht flektiert.*; 3 = *Das Verb ist von der Bedeutung her nicht angemessen.*; 4 = *Die Verbendung ist uebergeneralisiert.*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_11	69	2.61	1.31

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Die Verbendung ist willkuerlich gewaehlt.	29.0	29.0
2	Das Verb ist nicht flektiert.	24.6	24.6
3	Das Verb ist von der Bedeutung her nicht angemessen.	2.9	2.9
4	Die Verbendung ist uebergeneralisiert.	43.5	43.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.67 Erwerb_13

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_13

Label: Ein 5-jähriges Kind hat seit zwei Jahren intensiven Kontakt zur deutschen Sprache. Folgende Äußerung zeigt einen typischen Hauptsatz dieses Kindes. Was ist vermutlich der Grund für die Abweichung in dieser Äußerung? Frage eines Erwachsenen: Was hast

Kategorien: 1 = Das Kind hat eine Sprachstörung.; 2 = Das ist ein Versprecher.; 3 = Das Kind stottert.; 4 = Das liegt an der Mehrsprachigkeit.

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_13	69	3.71	0.88

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Das Kind hat eine Sprachstörung.	8.7	8.7
2	Das ist ein Versprecher.	1.4	1.4
3	Das Kind stottert.	0.0	0.0
4	Das liegt an der Mehrsprachigkeit.	89.9	89.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.68 Erwerb_14

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_14

Label: Einfache Hauptsätze wie Da mal ich jetzt ne Blume, Der schläft hier im Bett
beobachtet man bei Kindern mit Deutsch als Erstsprache normalerweise ab...

Kategorien: 1 = 37-42 Monaten (3;1 bis 3;6 Jahre); 2 = 43-48 Monaten (3;7 bis 4;0 Jahre);
3 = 24-36 Monaten (2;0 bis 3;0 Jahre); 4 = 18-23 Monaten (1;6 bis 1;11 Jahre)

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_14	69	2.19	1.05

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	37-42 Monaten (3;1 bis 3;6 Jahre)	39.1	39.1
2	43-48 Monaten (3;7 bis 4;0 Jahre)	10.1	10.1
3	24-36 Monaten (2;0 bis 3;0 Jahre)	43.5	43.5
4	18-23 Monaten (1;6 bis 1;11 Jahre)	7.2	7.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.69 Erwerb_16_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_16_1

Label: [baum abgegang] Stellen Sie sich vor, Sie haben sich von einem Kind folgende Äusserungen notiert: da mama reingehn puppe apfel wauwau nicht apfel Welche der folgenden Äusserungen wuerden Sie noch erwarten? Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_16_1	69	0.43	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	56.5	56.5
1	Ja	43.5	43.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.70 Erwerb_16_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_16_2

Label: [weil mama apfel essen will] Stellen Sie sich vor, Sie haben sich von einem Kind folgende Aeusserungen notiert: da mama reingehn puppe apfel wauwau nicht apfel Welche der folgenden Aeusserungen wuerden Sie noch erwarten? Bitte waehlen Sie alle zutreffen

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_16_2	69	0.03	0.17

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	97.1	97.1
1	Ja	2.9	2.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.71 Erwerb_16_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_16_3

Label: [das auch apfel isst] Stellen Sie sich vor, Sie haben sich von einem Kind folgende Aeussierungen notiert: da mama reingehn puppe apfel wauwau nicht apfel Welche der folgenden Aeussierungen wuerden Sie noch erwarten? Bitte waehlen Sie alle zutreffenden An

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_16_3	69	0.29	0.46

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	71.0	71.0
1	Ja	29.0	29.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.72 Erwerb_16_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_16_4

Label: [mama will nicht apfel essen] Stellen Sie sich vor, Sie haben sich von einem Kind folgende Aeusserungen notiert: da mama reingehn puppe apfel wauwau nicht apfel Welche der folgenden Aeusserungen wuerden Sie noch erwarten? Bitte waehlen Sie alle zutreffen

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_16_4	69	0.06	0.24

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	94.2	94.2
1	Ja	5.8	5.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.73 Erwerb_16_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_16_5

Label: [mama auch apfel] Stellen Sie sich vor, Sie haben sich von einem Kind folgende Aeussierungen notiert: da mama reingehn puppe apfel wauwau nicht apfel Welche der folgenden Aeussierungen wuerden Sie noch erwarten? Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antwo

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_16_5	69	0.80	0.41

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	20.3	20.3
1	Ja	79.7	79.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.74 Erwerb_17

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_17

Label: Ein Erwachsener schaut sich gemeinsam mit einem Kind ein Bild an, auf dem zwei Kinder versuchen, eine kippende Lampe festzuhalten. Der Erwachsene stellt dem Kind die Frage: „Warum halten die Kinder die Lampe fest?“ Das Kind antwortet: „nnnn das sonst

Kategorien: 1 = *Das Kind hat die Wortstellung von Nebensaetzen noch nicht gelernt.*; 2 = *Das Kind weiss noch nicht, wie Verben korrekt flektiert werden.*; 3 = *Das Kind hat die Wortstellung von Hauptsatzen noch nicht gelernt.*; 4 = *Das Kind hat noch nicht die korrekte Konjunktion in seinem Wortschatz.*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_17	69	3.12	1.14

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Das Kind hat die Wortstellung von Nebensaetzen noch nicht gelernt.	17.4	17.4
2	Das Kind weiss noch nicht, wie Verben korrekt flektiert werden.	7.2	7.2
3	Das Kind hat die Wortstellung von Hauptsatzen noch nicht gelernt.	21.7	21.7
4	Das Kind hat noch nicht die korrekte Konjunktion in seinem Wortschatz.	53.6	53.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.75 Erwerb_19

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_19

Label: Sie sehen sich mit einem etwa 15 Monate alten Kind zusammen ein Bilderbuch an, in dem verschiedene Tiere abgebildet sind. Das Kind deutet auf einen Hund und sagt: „WauWau“. Auf dem naechsten Bild ist eine Kuh zu sehen und das Kind deutet darauf und sag

Kategorien: 1 = *Verwendung eines Synonyms*; 2 = *Verwendung eines Oberbegriffs*;
3 = *Untergeneralisierung eines Begriffs*; 4 = *Uebergeneralisierung eines Begriffs*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_19	69	2.64	1.27

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Verwendung eines Synonyms	24.6	24.6
2	Verwendung eines Oberbegriffs	30.4	30.4
3	Untergeneralisierung eines Begriffs	1.4	1.4
4	Uebergeneralisierung eines Begriffs	43.5	43.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.76 Erwerb_31

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_31

Label: Vergleichen Sie die folgenden Sätze. Welchen verstehen 3-jährige Kinder in der Regel besser? a) Die Fliege frisst der Frosch. b) Der Frosch frisst die Fliege

Kategorien: 1 = a); 2 = a) und b) gleich gut; 3 = b)

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_31	69	2.87	0.42

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	a)	2.9	2.9
2	a) und b) gleich gut	7.2	7.2
3	b)	89.9	89.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.77 Erwerb_24_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_24_1

Label: [Julia sieht, dass es gleich regnen wird.] Welche der untenstehenden Aeusserungen eines Kindes zeigen, dass es andere Menschen als mentale Wesen auffasst, die Wuensche, Emotionen, etc. haben? Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_24_1	69	0.14	0.35

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	85.5	85.5
1	Ja	14.5	14.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.78 Erwerb_24_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_24_2

Label: [Papa glaubt, dass Mama seinen Fussball im Keller versteckt hat.] Welche der untenstehenden Aeusserungen eines Kindes zeigen, dass es andere Menschen als mentale Wesen auffasst, die Wuensche, Emotionen, etc. haben? Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antw

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_24_2	69	0.54	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	46.4	46.4
1	Ja	53.6	53.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.79 Erwerb_24_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_24_3

Label: [Tom klettert so hoch, dass ihn keiner mehr sieht.] Welche der untenstehenden Äusserungen eines Kindes zeigen, dass es andere Menschen als mentale Wesen auffasst, die Wünsche, Emotionen, etc. haben? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewählt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_24_3	69	0.36	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewählt	63.8	63.8
1	Ja	36.2	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.80 Erwerb_24_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_24_4

Label: [Mama weiss, dass alle Kinder Eis moegen.] Welche der untenstehenden Aeusserungen eines Kindes zeigen, dass es andere Menschen als mentale Wesen auffasst, die Wuensche, Emotionen, etc. haben? Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_24_4	69	0.93	0.26

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	7.2	7.2
1	Ja	92.8	92.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.81 Erwerb_25

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_25

Label: Die Bedeutung welches Verbs erwerben Kinder eher spaet?

Kategorien: 1 = *sagen*; 2 = *denken*; 3 = *wissen*; 4 = *kochen*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_25	69	2.55	0.65

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	sagen	0.0	0.0
2	denken	53.6	53.6
3	wissen	37.7	37.7
4	kochen	8.7	8.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.82 Erwerb_26

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_26

Label: Was bedeutet es, wenn jemand eine Sprache als fruehe Zweitsprache erworben hat?

Kategorien: 1 = Die Person wuchs von Geburt an mit zwei Sprachen auf.; 2 = Die Person kam ab ca. 13 Jahren mit einer zweiten Sprache in Kontakt.; 3 = Die Person hat auch eine dritte Sprache erworben.; 4 = Die Person hat ihre Erstsprache schon seit 2 bis 4 Jahren erworben und dann kam eine zweite Sprache hinzu.

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_26	69	2.28	1.45

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Die Person wuchs von Geburt an mit zwei Sprachen auf.	53.6	53.6
2	Die Person kam ab ca. 13 Jahren mit einer zweiten Sprache in Kontakt.	5.8	5.8
3	Die Person hat auch eine dritte Sprache erworben.	0.0	0.0
4	Die Person hat ihre Erstsprache schon seit 2 bis 4 Jahren erworben und dann kam eine zweite Sprache hinzu.	40.6	40.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.83 Erwerb_28_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_28_1

Label: [...haben eher einen kleineren Wortschatz in einer Sprache als einsprachig aufwachsende Kinder.] Kinder, die mit zwei Sprachen aufwachsen... Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_28_1	69	0.51	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	49.3	49.3
1	Ja	50.7	50.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.84 Erwerb_28_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_28_2

Label: [...koennen keine ihrer Sprachen richtig.] Kinder, die mit zwei Sprachen aufwachsen... Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_28_2	69	0.12	0.32

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	88.4	88.4
1	Ja	11.6	11.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.85 Erwerb_28_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_28_3

Label: [...sprechen langsamer als einsprachig aufwachsende Kinder.] Kinder, die mit zwei Sprachen aufwachsen... Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_28_3	69	0.29	0.46

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	71.0	71.0
1	Ja	29.0	29.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.86 Erwerb_28_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_28_4

Label: [...haben bei der Loesung von Problemen, die Aufmerksamkeit und Konzentration erfordern, Vorteile gegenueber einsprachig aufwachsenden Kindern.] Kinder, die mit zwei Sprachen aufwachsen... Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_28_4	69	0.55	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	44.9	44.9
1	Ja	55.1	55.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.87 Erwerb_28_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_28_5

Label: [...sind intelligenter als einsprachig aufwachsende Kinder.] Kinder, die mit zwei Sprachen aufwachsen... Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_28_5	69	0.10	0.30

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	89.9	89.9
1	Ja	10.1	10.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.88 Erwerb_28_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_28_6

Label: [...koennen ihre Sprachen nicht auseinanderhalten.] Kinder, die mit zwei Sprachen aufwachsen... Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_28_6	69	0.14	0.35

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	85.5	85.5
1	Ja	14.5	14.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.89 Erwerb_29

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_29

Label: Sind manche Sprachen idealere Erstsprachen als andere? Ist es z.B. der Fall, dass ein Kind, das Chinesisch als Muttersprache erwirbt, es schwerer hat die Sprache zu erwerben als ein Kind, das Deutsch als Muttersprache erwirbt?

Kategorien: 1 = *nein, der Spracherwerb ist abhaengig von der Intelligenz des Kindes.*;
2 = *nein, jede Sprache kann gleich gut erworben werden.*; 3 = *nein, der Spracherwerb ist abhaengig von der Begabung, Sprachen zu erwerben.*; 4 = *ja, manche Sprachen sind schwerer zu erwerben.*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_29	69	2.36	0.80

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	nein, der Spracherwerb ist abhaengig von der Intelligenz des Kindes.	5.8	5.8
2	nein, jede Sprache kann gleich gut erworben werden.	66.7	66.7
3	nein, der Spracherwerb ist abhaengig von der Begabung, Sprachen zu erwerben.	13.0	13.0
4	ja, manche Sprachen sind schwerer zu erwerben.	14.5	14.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.90 Erwerb_30

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Erwerb_30

Label: Welcher der folgenden Punkte ist aus biologischer Sicht keine Voraussetzung fuer den Erwerb der gesprochenen Sprache?

Kategorien: 1 = *funktionierende Atemorgane*; 2 = *normale Intelligenz*; 3 = *funktionierende Hoerorgane*; 4 = *funktionierendes Gehirn*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Erwerb_30	69	1.54	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	funktionierende Atemorgane	46.4	46.4
2	normale Intelligenz	53.6	53.6
3	funktionierende Hoerorgane	0.0	0.0
4	funktionierendes Gehirn	0.0	0.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.91 Sprachdiagnostik_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachdiagnostik_1

Label: Sie haben fuer Ihre Einrichtung ein standardisiertes Verfahren zur Sprachstandsbestimmung angeschafft. Im Handbuch steht zu jeder Aufgabe wie sie durchzufuehren und auszuwerten ist. Kreuzen Sie die zutreffende Aussage an.

Kategorien: 1 = *Die Anweisungen im Handbuch dienen lediglich als Hilfestellung, wenn einem selbst nicht einfaellt, wie man dem Kind eine*; 2 = *Man sollte sich anfangs an diese Vorgaben halten. Wenn man das Verfahren einige Male durchgefuehrt hat, kann man selbst*; 3 = *Das sind Beispiele an denen man sich orientieren kann, aber nicht muss.*; 4 = *Das sind strenge Vorgaben, die man moeglichst genau befolgen sollte.*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachdiagnostik_1	69	3.03	0.94

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Die Anweisungen im Handbuch dienen lediglich als Hilfestellung, wenn einem selbst nicht einfaellt, wie man dem Kind eine	1.4	1.4
2	Man sollte sich anfangs an diese Vorgaben halten. Wenn man das Verfahren einige Male durchgefuehrt hat, kann man selbst	37.7	37.7
3	Das sind Beispiele an denen man sich orientieren kann, aber nicht muss.	17.4	17.4

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
4	Das sind strenge Vorgaben, die man moeglichst genau befolgen sollte.	43.5	43.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.92 Sprachdiagnostik_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachdiagnostik_2

Label: Wenn Sie bei einem Kind mit Deutsch als Zweitsprache den Sprachstand im Deutschen feststellen wollen, welches Kriterium müssen Sie bei der Auswahl des Verfahrens besonders beachten?

Kategorien: 1 = *Der Test sollte auch Übersetzungen in der Erstsprache des Kindes enthalten.*; 2 = *Die Vergleichswerte sollten mit Daten von Kindern mit Deutsch als Erstsprache errechnet worden sein (normiert worden sein);* 3 = *Besonders der Bereich Wortschatz sollte abgedeckt sein.*; 4 = *Die Vergleichswerte sollten mit Daten von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache errechnet worden sein (normiert worden sein)*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachdiagnostik_2	69	3.22	1.01

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Der Test sollte auch Übersetzungen in der Erstsprache des Kindes enthalten.	11.6	11.6
2	Die Vergleichswerte sollten mit Daten von Kindern mit Deutsch als Erstsprache errechnet worden sein (normiert worden sein)	7.2	7.2
3	Besonders der Bereich Wortschatz sollte abgedeckt sein.	29.0	29.0

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
4	Die Vergleichswerte sollten mit Daten von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache errechnet worden sein (normiert worden se	52.2	52.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.93 Sprachdiagnostik_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachdiagnostik_4

Label: Sie und eine Kollegin ueberpruefen unabhaengig voneinander zum selben Zeitpunkt ein Kind mit demselben standardisierten Verfahren. Sie erhalten sehr unterschiedliche Ergebnisse. Welche der Aussagen trifft zu?

Kategorien: 1 = *Das kann schon mal vorkommen. Jeder hat ja eine andere Art das Verfahren durchzufuehren.*; 2 = *Das ist weniger gut, ein standardisiertes Verfahren sollte, auch wenn es von verschiedenen Personen durchgefuehrt wurde.*; 3 = *Das ist positiv, denn so koennen verschiedene Staerken des Kindes und unterschiedliche Sichtweisen auf das Kind im Team*; 4 = *Das ist grundsaeztlich so, denn Kinder haben nicht immer zu allen Personen die gleiche Beziehung.*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachdiagnostik_4	69	2.58	0.76

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Das kann schon mal vorkommen. Jeder hat ja eine andere Art das Verfahren durchzufuehren.	1.4	1.4
2	Das ist weniger gut, ein standardisiertes Verfahren sollte, auch wenn es von verschiedenen Personen durchgefuehrt wurde,	53.6	53.6
3	Das ist positiv, denn so koennen verschiedene Staerken des Kindes und unterschiedliche Sichtweisen auf das Kind im Team	30.4	30.4

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
4	Das ist grundsatzlich so, denn Kinder haben nicht immer zu allen Personen die gleiche Beziehung.	14.5	14.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.94 Sprachdiagnostik_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachdiagnostik_5

Label: Wenn Sie mithilfe eines Sprachstandserhebungsverfahrens die Kompetenzen eines Kindes im Bereich Satzverständnis erheben möchten, was muss das Kind dann leisten?

Kategorien: 1 = Das Kind muss Sätze produzieren können.; 2 = Das Kind muss Sätze umformulieren können.; 3 = Das Kind muss angemessen auf Sätze reagieren können.; 4 = Das Kind muss Sätze erklären können.

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachdiagnostik_5	69	2.46	1.11

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Das Kind muss Sätze produzieren können.	33.3	33.3
2	Das Kind muss Sätze umformulieren können.	1.4	1.4
3	Das Kind muss angemessen auf Sätze reagieren können.	50.7	50.7
4	Das Kind muss Sätze erklären können.	14.5	14.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.95 Sprachdiagnostik_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachdiagnostik_6

Label: Angenommen Sie versuchen mithilfe eines Sprachstandsverfahrens ein Kind dazu zu animieren, Hauptsätze zu produzieren. Wann kann man sagen, hat ein Kind die Satzstellung in Hauptsätzen erworben?

Kategorien: 1 = Wenn mindestens ein Hauptsatz die korrekte Satzstellung aufweist.; 2 = Wenn 100 % der Hauptsätze die korrekte Satzstellung aufweisen.; 3 = Wenn 90 % der Hauptsätze die korrekte Satzstellung aufweisen.; 4 = Wenn 50 % der Hauptsätze die korrekte Satzstellung aufweisen.

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachdiagnostik_6	69	3.09	0.76

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Wenn mindestens ein Hauptsatz die korrekte Satzstellung aufweist.	5.8	5.8
2	Wenn 100 % der Hauptsätze die korrekte Satzstellung aufweisen.	7.2	7.2
3	Wenn 90 % der Hauptsätze die korrekte Satzstellung aufweisen.	59.4	59.4
4	Wenn 50 % der Hauptsätze die korrekte Satzstellung aufweisen.	27.5	27.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.96 Sprachdiagnostik_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachdiagnostik_7

Label: In einem Beobachtungsinstrument sollen Sie angeben, ob das Verb im Hauptsatz an der richtigen Stelle steht, z.B. Der macht immer so, Ich habe Durst, Ich muss (auf die) Toilette. Stellen Sie sich vor, Sie haben sich nach einer Bilderbuchbetrachtung folgend

Kategorien: 1 = *Im Hauptsatz steht das Verb nie an der richtigen Stelle.*; 2 = *Im Hauptsatz steht das Verb selten an der richtigen Stelle.*; 3 = *Im Hauptsatz steht das Verb manchmal an der richtigen Stelle.*; 4 = *Im Hauptsatz steht das Verb haeufig an der richtigen Stelle.*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachdiagnostik_7	69	2.94	0.91

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Im Hauptsatz steht das Verb nie an der richtigen Stelle.	5.8	5.8
2	Im Hauptsatz steht das Verb selten an der richtigen Stelle.	26.1	26.1
3	Im Hauptsatz steht das Verb manchmal an der richtigen Stelle.	36.2	36.2
4	Im Hauptsatz steht das Verb haeufig an der richtigen Stelle.	31.9	31.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.97 Sprachdiagnostik_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachdiagnostik_8

Label: In einem Beobachtungsinstrument sollen Sie angeben, ob das Verb im Hauptsatz an der richtigen Stelle steht, z.B. Der macht immer so, Ich habe Durst, Ich muss (auf die) Toilette. Stellen Sie sich vor, Sie haben sich nach einer Bilderbuchbetrachtung folgend

Kategorien: 1 = *Es duerfen nur die Aeusserungen in die Auswertung einbezogen werden, die den Inhalt korrekt wiedergeben.*; 2 = *Es muessen alle Aeusserungen in die Auswertung einbezogen werden, die Hauptsatze sind.*; 3 = *Es muessen alle Aeusserungen in die Auswertung einbezogen werden.*; 4 = *Es duerfen nur die fehlerfreien Aeusserungen in die Auswertung einbezogen werden.*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachdiagnostik_8	69	2.52	0.68

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Es duerfen nur die Aeusserungen in die Auswertung einbezogen werden, die den Inhalt korrekt wiedergeben.	5.8	5.8
2	Es muessen alle Aeusserungen in die Auswertung einbezogen werden, die Hauptsatze sind.	40.6	40.6
3	Es muessen alle Aeusserungen in die Auswertung einbezogen werden.	49.3	49.3

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
4	Es dürfen nur die fehlerfreien Äusserungen in die Auswertung einbezogen werden.	4.3	4.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.98 Sprachdiagnostik_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachdiagnostik_10

Label: Welche Wortart ist am aufschlussreichsten, wenn Sie die Wortstellung in Kinderaussagen genauer anschauen und analysieren wollen?

Kategorien: 1 = *Verben*; 2 = *Artikel*; 3 = *Adjektive*; 4 = *Nomen*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachdiagnostik_10	69	1.52	1.07

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Verben	78.3	78.3
2	Artikel	4.3	4.3
3	Adjektive	4.3	4.3
4	Nomen	13.0	13.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.99 Sprachdiagnostik_12

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachdiagnostik_12

Label: In einem Foerderprogramm muss ein Kind herausfinden, welches Wort in einer Dreierreihe in dem Sinne 'anders' ist, dass es sich mit den anderen Woertern nicht reimt. Es bekommt jeweils drei Bilder gezeigt, die es benennen soll und dann das Bild aussortieren

Kategorien: 1 = *Bewusstheit ueber die Lautstruktur von Woertern*; 2 = *Unterscheidung von ein- und zweisilbigen Woertern*; 3 = *Ueben von komplexen Konsonantenkombinationen*; 4 = *Erschliessen von Wortfeldern*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachdiagnostik_12	69	1.46	0.96

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Bewusstheit ueber die Lautstruktur von Woertern	78.3	78.3
2	Unterscheidung von ein- und zweisilbigen Woertern	5.8	5.8
3	Ueben von komplexen Konsonantenkombinationen	7.2	7.2
4	Erschliessen von Wortfeldern	8.7	8.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.100 Sprachdiagnostik_13

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachdiagnostik_13

Label: In einem Foerderprogramm sitzen die Foederkraft und die Kinder vor einem Bild von einem Haus, in dem viele verschiedene Tiere (in Form von Bildkaertchen) sind. Die Foederkraft erklart, dass die Tiere muede sind und manche jetzt nach Hause gehen muessen,

Kategorien: 1 = *Hauptsatze mit Adjektiven*; 2 = *Subjekt-Verb-Kongruenz*; 3 = *prosodische Struktur deutscher Saetze*; 4 = *Hauptsatze und Nebensaetze*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachdiagnostik_13	69	1.99	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Hauptsatze mit Adjektiven	11.6	11.6
2	Subjekt-Verb-Kongruenz	79.7	79.7
3	prosodische Struktur deutscher Saetze	7.2	7.2
4	Hauptsatze und Nebensaetze	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.101 Sprachdiagnostik_14_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachdiagnostik_14_1

Label: [Willst du Milch oder Kakao?] Welche zwei Fragen regen Kinder aufgrund ihrer Struktur besonders dazu an, viel zu sprechen?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachdiagnostik_14_1	69	0.01	0.12

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	98.6	98.6
1	Ja	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.102 Sprachdiagnostik_14_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachdiagnostik_14_2

Label: [Wie ist das denn passiert?] Welche zwei Fragen regen Kinder aufgrund ihrer Struktur besonders dazu an, viel zu sprechen?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachdiagnostik_14_2	69	0.81	0.39

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	18.8	18.8
1	Ja	81.2	81.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.103 Sprachdiagnostik_14_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachdiagnostik_14_3

Label: [Was macht denn das Kind da?] Welche zwei Fragen regen Kinder aufgrund ihrer Struktur besonders dazu an, viel zu sprechen?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewählt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachdiagnostik_14_3	69	0.51	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewählt	49.3	49.3
1	Ja	50.7	50.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.104 Sprachdiagnostik_14_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachdiagnostik_14_4

Label: [Hast du dir schon die Zähne geputzt?] Welche zwei Fragen regen Kinder aufgrund ihrer Struktur besonders dazu an, viel zu sprechen?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewählt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachdiagnostik_14_4	69	0.01	0.12

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewählt	98.6	98.6
1	Ja	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.105 Sprachdiagnostik_14_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachdiagnostik_14_5

Label: [Wen hast du denn da mitgebracht?] Welche zwei Fragen regen Kinder aufgrund ihrer Struktur besonders dazu an, viel zu sprechen?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachdiagnostik_14_5	69	0.35	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	65.2	65.2
1	Ja	34.8	34.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.106 Sprachdiagnostik_14_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachdiagnostik_14_6

Label: [Warum willst du nicht in den Hof?] Welche zwei Fragen regen Kinder aufgrund ihrer Struktur besonders dazu an, viel zu sprechen?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewählt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachdiagnostik_14_6	69	0.22	0.42

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewählt	78.3	78.3
1	Ja	21.7	21.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.107 Sprachdiagnostik_14_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachdiagnostik_14_7

Label: [Wo ist denn die rote Schere?] Welche zwei Fragen regen Kinder aufgrund ihrer Struktur besonders dazu an, viel zu sprechen?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachdiagnostik_14_7	69	0.01	0.12

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	98.6	98.6
1	Ja	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.108 Sprachdiagnostik_14_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachdiagnostik_14_8

Label: [Was hast du denn gestern gegessen?] Welche zwei Fragen regen Kinder aufgrund ihrer Struktur besonders dazu an, viel zu sprechen?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewählt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachdiagnostik_14_8	69	0.07	0.26

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewählt	92.8	92.8
1	Ja	7.2	7.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.109 Sprachdiagnostik_15_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachdiagnostik_15_1

Label: [Es sollte von der Satzstruktur her moeglichst einfach sein.] Wie sollte das sprachliche Angebot beschaffen sein, damit es dem Kind moeglichst hilfreichen Input bezueglich der Struktur der Zielsprache liefert?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachdiagnostik_15_1	69	0.62	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	37.7	37.7
1	Ja	62.3	62.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.110 Sprachdiagnostik_15_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachdiagnostik_15_2

Label: [Es sollte viele unterschiedliche Satzstrukturen enthalten.] Wie sollte das sprachliche Angebot beschaffen sein, damit es dem Kind moeglichst hilfreichen Input bezueglich der Struktur der Zielsprache liefert?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachdiagnostik_15_2	69	0.17	0.38

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	82.6	82.6
1	Ja	17.4	17.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.111 Sprachdiagnostik_15_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachdiagnostik_15_3

Label: [Es sollte hauptsachlich Woerter beinhalten, die das Kind schon kennt.] Wie sollte das sprachliche Angebot beschaffen sein, damit es dem Kind moeglichst hilfreichen Input bezueglich der Struktur der Zielsprache liefert?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachdiagnostik_15_3	69	0.46	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	53.6	53.6
1	Ja	46.4	46.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.112 Sprachdiagnostik_15_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachdiagnostik_15_4

Label: [Es sollte keine komplexen Lautverbindungen (z.B. Strumpf) enthalten.] Wie sollte das sprachliche Angebot beschaffen sein, damit es dem Kind moeglichst hilfreichen Input bezueglich der Struktur der Zielsprache liefert?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachdiagnostik_15_4	69	0.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	100.0	100.0
1	Ja	0.0	0.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.113 Sprachdiagnostik_15_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachdiagnostik_15_5

Label: [Es sollte neue Woerter in verschiedenen Formen wiederholt enthalten.] Wie sollte das sprachliche Angebot beschaffen sein, damit es dem Kind moeglichst hilfreichen Input bezueglich der Struktur der Zielsprache liefert?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachdiagnostik_15_5	69	0.42	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	58.0	58.0
1	Ja	42.0	42.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.114 Sprachdiagnostik_15_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Sprachdiagnostik_15_6

Label: [Es sollte keine ungewöhnlichen Satzstrukturen enthalten (z.B. Passiv).] Wie sollte das sprachliche Angebot beschaffen sein, damit es dem Kind möglichst hilfreichen Input bezüglich der Struktur der Zielsprache liefert?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewählt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Sprachdiagnostik_15_6	69	0.32	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewählt	68.1	68.1
1	Ja	31.9	31.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.115 KoennenMethSprBerPhon_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenMethSprBerPhon_1

Label: [Ich sehe was, was du nicht siehst] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Übungen aus Ihrer Sicht zur Förderung der phonologischen Fähigkeiten? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwandeln lassen.

Kategorien: 1 = 1 - gar nicht geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr gut geeignet

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenMethSprBerPhon_1	69	3.00	1.12

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	10.1	10.1
2	2	26.1	26.1
3	3	23.2	23.2
4	4	34.8	34.8
5	5 - sehr gut geeignet	5.8	5.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.116 KoennenMethSprBerPhon_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenMethSprBerPhon_2

Label: [Reimwoerter finden] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Uebungen aus Ihrer Sicht zur Foerderung der phonologischen Faehigkeiten? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwandeln lassen.

Kategorien: 1 = 1 - gar nicht geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr gut geeignet

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenMethSprBerPhon_2	69	4.46	0.81

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	1.4	1.4
2	2	2.9	2.9
3	3	2.9	2.9
4	4	33.3	33.3
5	5 - sehr gut geeignet	59.4	59.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.117 KoennenMethSprBerPhon_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenMethSprBerPhon_3

Label: [Dinge oder Personen auf Wimmelbildern suchen lassen] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Uebungen aus Ihrer Sicht zur Foerderung der phonologischen Faehigkeiten? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwandeln las

Kategorien: 1 = 1 - gar nicht geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr gut geeignet

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenMethSprBerPhon_3	69	2.80	1.15

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	13.0	13.0
2	2	30.4	30.4
3	3	27.5	27.5
4	4	21.7	21.7
5	5 - sehr gut geeignet	7.2	7.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.118 KoennenMethSprBerPhon_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenMethSprBerPhon_4

Label: [Ich packe meinen Koffer] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Uebungen aus Ihrer Sicht zur Foerderung der phonologischen Faehigkeiten? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwandeln lassen.

Kategorien: 1 = 1 - gar nicht geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr gut geeignet

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenMethSprBerPhon_4	69	3.26	1.08

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	5.8	5.8
2	2	20.3	20.3
3	3	26.1	26.1
4	4	37.7	37.7
5	5 - sehr gut geeignet	10.1	10.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.119 KoennenMethSprBerPhon_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenMethSprBerPhon_5

Label: [Zungenbrecher nachsprechen] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Übungen aus Ihrer Sicht zur Förderung der phonologischen Fähigkeiten? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwandeln lassen.

Kategorien: 1 = 1 - gar nicht geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr gut geeignet

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenMethSprBerPhon_5	69	3.68	1.17

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	8.7	8.7
2	2	7.2	7.2
3	3	14.5	14.5
4	4	46.4	46.4
5	5 - sehr gut geeignet	23.2	23.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.120 KoennenMethSprBerPhon_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenMethSprBerPhon_6

Label: [Stille Post] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Uebungen aus Ihrer Sicht zur Foerderung der phonologischen Faehigkeiten? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwandeln lassen.

Kategorien: 1 = 1 - gar nicht geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr gut geeignet

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenMethSprBerPhon_6	69	3.23	1.24

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	10.1	10.1
2	2	20.3	20.3
3	3	21.7	21.7
4	4	31.9	31.9
5	5 - sehr gut geeignet	15.9	15.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.121 KoennenMethSprBerPhon_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenMethSprBerPhon_7

Label: [Phantasieworte nachsprechen] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Übungen aus Ihrer Sicht zur Förderung der phonologischen Fähigkeiten? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwandeln lassen.

Kategorien: 1 = 1 - gar nicht geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr gut geeignet

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenMethSprBerPhon_7	69	3.87	1.29

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	7.2	7.2
2	2	11.6	11.6
3	3	11.6	11.6
4	4	26.1	26.1
5	5 - sehr gut geeignet	43.5	43.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.122 KoennenMethSprBerPhon_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenMethSprBerPhon_8

Label: [Gegenstaende auf Zuruf verstecken] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Uebungen aus Ihrer Sicht zur Foerderung der phonologischen Faehigkeiten? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwandeln lassen.

Kategorien: 1 = 1 - gar nicht geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr gut geeignet

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenMethSprBerPhon_8	69	2.68	1.10

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	14.5	14.5
2	2	33.3	33.3
3	3	26.1	26.1
4	4	21.7	21.7
5	5 - sehr gut geeignet	4.3	4.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.123 StratKomm_Team2_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: StratKomm_Team2_1

Label: [Ich tue nichts, da es in diesen Routinesituationen nicht so wichtig ist zu sprechen.
] In einer fruehpaedagogischen Einrichtung wird beim gemeinsamen Fruehstueck
 wenig mit den Kindern gesprochen. Was wuerden Sie in diesem Fall tun?
 Bewerten Sie die Hand

Kategorien: 1 = 1 - am wenigsten geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - am besten geeignet

Variablenname	N_{valid}	M	SD
StratKomm_Team2_1	69	1.22	0.57

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - am wenigsten geeignet	84.1	84.1
2	2	11.6	11.6
3	3	2.9	2.9
4	4	1.4	1.4
5	5 - am besten geeignet	0.0	0.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.124 StratKomm_Team2_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: StratKomm_Team2_2

Label: [Ich spreche es in der Teamsitzung an und bitte die Kolleginnen, darauf zu achten, dass sie ihre Handlungen sprachlich begleiten.] In einer fruehpaedagogischen Einrichtung wird beim gemeinsamen Fruehstueck wenig mit den Kindern gesprochen. Was wuerden S

Kategorien: 1 = 1 - am wenigsten geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - am besten geeignet

Variablenname	N_{valid}	M	SD
StratKomm_Team2_2	69	4.33	0.93

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - am wenigsten geeignet	0.0	0.0
2	2	5.8	5.8
3	3	14.5	14.5
4	4	20.3	20.3
5	5 - am besten geeignet	59.4	59.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.125 StratKomm_Team2_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: StratKomm_Team2_3

Label: [Ich verlasse mich darauf, dass die Leitung der Einrichtung in der Situation das Richtige tut.] In einer fruehpaedagogischen Einrichtung wird beim gemeinsamen Fruehstueck wenig mit den Kindern gesprochen. Was wuerden Sie in diesem Fall tun? Bewerten Sie

Kategorien: 1 = 1 - am wenigsten geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - am besten geeignet

Variablenname	N_{valid}	M	SD
StratKomm_Team2_3	69	1.45	0.80

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - am wenigsten geeignet	68.1	68.1
2	2	23.2	23.2
3	3	5.8	5.8
4	4	1.4	1.4
5	5 - am besten geeignet	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.126 StratKomm_Team2_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: StratKomm_Team2_4

Label: [Ich werde selbst aktiv und versprache meine Handlungen und die der Kinder während des Frühstückes.] In einer frühpädagogischen Einrichtung wird beim gemeinsamen Frühstück wenig mit den Kindern gesprochen. Was würden Sie in diesem Fall tun? B

Kategorien: 1 = 1 - am wenigsten geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - am besten geeignet

Variablenname	N_{valid}	M	SD
StratKomm_Team2_4	69	4.54	0.81

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - am wenigsten geeignet	1.4	1.4
2	2	1.4	1.4
3	3	7.2	7.2
4	4	21.7	21.7
5	5 - am besten geeignet	68.1	68.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.127 StratKomm_Team2_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: StratKomm_Team2_5

Label: [Ich spreche einzelne Kolleginnen an und bitte sie, mehr zu sprechen.] In einer fruehpaedagogischen Einrichtung wird beim gemeinsamen Fruehstueck wenig mit den Kindern gesprochen. Was wuerden Sie in diesem Fall tun? Bewerten Sie die Handlungsoptionen vo

Kategorien: 1 = 1 - am wenigsten geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - am besten geeignet

Variablenname	N_{valid}	M	SD
StratKomm_Team2_5	69	3.28	1.21

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - am wenigsten geeignet	10.1	10.1
2	2	15.9	15.9
3	3	26.1	26.1
4	4	31.9	31.9
5	5 - am besten geeignet	15.9	15.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.128 KoennenStrategieFiltr_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenStrategieFiltr_1

Label: [Die Satzstellung ist korrekt.] Welche drei Notizen waehlen Sie fuer die Dokumentation ueber die sprachliche Entwicklung dieses Kindes aus?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenStrategieFiltr_1	69	0.26	0.44

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	73.9	73.9
1	Ja	26.1	26.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.129 KoennenStrategieFiltr_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenStrategieFiltr_2

Label: [Das Kind hat Probleme mit dem grammatischen Geschlecht.] Welche drei Notizen waehlen Sie fuer die Dokumentation ueber die sprachliche Entwicklung dieses Kindes aus?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenStrategieFiltr_2	69	0.52	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	47.8	47.8
1	Ja	52.2	52.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.130 KoennenStrategieFiltr_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenStrategieFiltr_3

Label: [Das Kind verwendet nicht die richtigen Satzeinleiter/Bindewoerter.] Welche drei Notizen waehlen Sie fuer die Dokumentation ueber die sprachliche Entwicklung dieses Kindes aus?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenStrategieFiltr_3	69	0.57	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	43.5	43.5
1	Ja	56.5	56.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.131 KoennenStrategieFiltr_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenStrategieFiltr_4

Label: [Das Kind spricht undeutlich.] Welche drei Notizen waehlen Sie fuer die Dokumentation ueber die sprachliche Entwicklung dieses Kindes aus?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenStrategieFiltr_4	69	0.36	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	63.8	63.8
1	Ja	36.2	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.132 KoennenStrategieFiltr_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenStrategieFiltr_5

Label: [Das Kind reagiert nicht angemessen auf Fragen.] Welche drei Notizen waehlen
Sie fuer die Dokumentation ueber die sprachliche Entwicklung dieses Kindes aus?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenStrategieFiltr_5	69	0.09	0.28

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	91.3	91.3
1	Ja	8.7	8.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.133 KoennenStrategieFiltr_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenStrategieFiltr_6

Label: [Die Verben sind nicht korrekt gebeugt.] Welche drei Notizen waehlen Sie fuer die Dokumentation ueber die sprachliche Entwicklung dieses Kindes aus?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenStrategieFiltr_6	69	0.28	0.45

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	72.5	72.5
1	Ja	27.5	27.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.134 KoennenStrategieFiltr_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenStrategieFiltr_7

Label: [Die Verben stehen an der falschen Stelle im Satz.] Welche drei Notizen wahlen
Sie fuer die Dokumentation ueber die sprachliche Entwicklung dieses Kindes aus?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenStrategieFiltr_7	69	0.17	0.38

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	82.6	82.6
1	Ja	17.4	17.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.135 KoennenStrategieFiltr_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenStrategieFiltr_8

Label: [Das Kind spricht stockend.] Welche drei Notizen waehlen Sie fuer die Dokumentation ueber die sprachliche Entwicklung dieses Kindes aus?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenStrategieFiltr_8	69	0.14	0.35

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	85.5	85.5
1	Ja	14.5	14.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.136 KoennenStrategieFiltr_9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenStrategieFiltr_9

Label: [Das Kind beherrscht die Praepositionen noch nicht.] Welche drei Notizen waehlen Sie fuer die Dokumentation ueber die sprachliche Entwicklung dieses Kindes aus?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenStrategieFiltr_9	69	0.33	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	66.7	66.7
1	Ja	33.3	33.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.137 KoennenStrategieFiltr_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenStrategieFiltr_10

Label: [Das Kind bildet den Akkusativ (Wen-Fall) richtig.] Welche drei Notizen waehlen
Sie fuer die Dokumentation ueber die sprachliche Entwicklung dieses Kindes aus?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenStrategieFiltr_10	69	0.13	0.34

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	87.0	87.0
1	Ja	13.0	13.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.138 KoennenStrategieFiltr_11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenStrategieFiltr_11

Label: [Das Kind spricht schlecht Deutsch.] Welche drei Notizen waehlen Sie fuer die Dokumentation ueber die sprachliche Entwicklung dieses Kindes aus?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenStrategieFiltr_11	69	0.14	0.35

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	85.5	85.5
1	Ja	14.5	14.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.139 KoennenStraPlanVWort

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenStraPlanVWort

Label: Sie wollen das Verstaendnis des Wortschatzes im Bereich „Kindergarten“ in Ihrer Sprachfoerdergruppe mit einem grossen Wimmelbild „Unser Kindergarten“ abfragen. Fuer welche der folgenden Aufgaben entscheiden Sie sich?

Kategorien: 1 = *(kein Label vergeben)*; 2 = *Sie fragen die Kinder einzeln nach bestimmten Gegenstaenden/Aktivitaeten, die auf dem Bild abgebildet sind und fordern s*; 3 = *Sie fordern die Kinder auf, eine Szene auf dem Bild auszusuchen und etwas dazu zu erzaehlen.*; 4 = *Sie zeigen ein Bildkaertchen und fragen, welches Kind Ihnen den abgebildeten Gegenstand auf dem Wimmelbild zeigen kann.*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenStraPlanVWort	69	2.26	0.89

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	<i>(kein Label vergeben)</i>	27.5	27.5
2	<i>Sie fragen die Kinder einzeln nach bestimmten Gegenstaenden/Aktivitaeten, die auf dem Bild abgebildet sind und fordern s</i>	20.3	20.3
3	<i>Sie fordern die Kinder auf, eine Szene auf dem Bild auszusuchen und etwas dazu zu erzaehlen.</i>	50.7	50.7
4	<i>Sie zeigen ein Bildkaertchen und fragen, welches Kind Ihnen den abgebildeten Gegenstand auf dem Wimmelbild zeigen kann.</i>	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.140 KoennenMethSprBerPraep_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenMethSprBerPraep_1

Label: [Ich sehe was, was du nicht siehst] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Übungen aus Ihrer Sicht zur Foerderung des Bereichs Praepositionsverstaendnis? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwandeln lassen.

Kategorien: 1 = 1 - gar nicht geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr gut geeignet

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenMethSprBerPraep_1	69	3.30	1.36

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	17.4	17.4
2	2	8.7	8.7
3	3	20.3	20.3
4	4	33.3	33.3
5	5 - sehr gut geeignet	20.3	20.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.141 KoennenMethSprBerPraep_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenMethSprBerPraep_2

Label: [Reimwoerter finden] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Uebungen aus Ihrer Sicht zur Foerderung des Bereichs Praepositionsverstaendnis? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwandeln lassen.

Kategorien: 1 = 1 - gar nicht geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr gut geeignet

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenMethSprBerPraep_2	69	1.86	1.10

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	53.6	53.6
2	2	20.3	20.3
3	3	14.5	14.5
4	4	10.1	10.1
5	5 - sehr gut geeignet	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.142 KoennenMethSprBerPraep_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenMethSprBerPraep_3

Label: [Dinge oder Personen auf Wimmelbildern suchen lassen] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Uebungen aus Ihrer Sicht zur Foerderung des Bereichs Praepositionsverstaendnis? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwand

Kategorien: 1 = 1 - gar nicht geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr gut geeignet

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenMethSprBerPraep_3	69	4.17	1.07

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	2.9	2.9
2	2	5.8	5.8
3	3	14.5	14.5
4	4	24.6	24.6
5	5 - sehr gut geeignet	52.2	52.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.143 KoennenMethSprBerPraep_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenMethSprBerPraep_4

Label: [Ich packe meinen Koffer] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Uebungen aus Ihrer Sicht zur Foerderung des Bereichs Praepositionsverstaendnis? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwandeln lassen.

Kategorien: 1 = 1 - gar nicht geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr gut geeignet

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenMethSprBerPraep_4	69	3.00	1.37

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	20.3	20.3
2	2	15.9	15.9
3	3	23.2	23.2
4	4	24.6	24.6
5	5 - sehr gut geeignet	15.9	15.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.144 KoennenMethSprBerPraep_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenMethSprBerPraep_5

Label: [Zungenbrecher nachsprechen] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Übungen aus Ihrer Sicht zur Foerderung des Bereichs Praepositionsverstaendnis? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwandeln lassen.

Kategorien: 1 = 1 - gar nicht geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr gut geeignet

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenMethSprBerPraep_5	69	1.77	0.97

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	52.2	52.2
2	2	26.1	26.1
3	3	15.9	15.9
4	4	4.3	4.3
5	5 - sehr gut geeignet	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.145 KoennenMethSprBerPraep_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenMethSprBerPraep_6

Label: [Stille Post] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Uebungen aus Ihrer Sicht zur Foerderung des Bereichs Praepositionsverstaendnis? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwandeln lassen.

Kategorien: 1 = 1 - gar nicht geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr gut geeignet

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenMethSprBerPraep_6	69	1.87	1.14

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	52.2	52.2
2	2	23.2	23.2
3	3	14.5	14.5
4	4	5.8	5.8
5	5 - sehr gut geeignet	4.3	4.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.146 KoennenMethSprBerPraep_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenMethSprBerPraep_7

Label: [Phantasieworte nachsprechen] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Übungen aus Ihrer Sicht zur Foerderung des Bereichs Praepositionsverstaendnis? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwandeln lassen.

Kategorien: 1 = 1 - gar nicht geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr gut geeignet

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenMethSprBerPraep_7	69	1.71	1.04

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	59.4	59.4
2	2	20.3	20.3
3	3	13.0	13.0
4	4	4.3	4.3
5	5 - sehr gut geeignet	2.9	2.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.147 KoennenMethSprBerPraep_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenMethSprBerPraep_8

Label: [Gegenstaende auf Zuruf verstecken] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Uebungen aus Ihrer Sicht zur Foerderung des Bereichs Praepositionsverstaendnis? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwandeln lassen.

Kategorien: 1 = 1 - gar nicht geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr gut geeignet

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenMethSprBerPraep_8	69	3.54	1.42

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	13.0	13.0
2	2	13.0	13.0
3	3	15.9	15.9
4	4	23.2	23.2
5	5 - sehr gut geeignet	34.8	34.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.148 KoennenDiagnSynDaM_01

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenDiagnSynDaM_01

Label: [Hendrik ist im Satzbau...] Sehen Sie sich die folgenden Aeusserungen von Hendrik (2;4 Jahre) mit Deutsch als Muttersprache an. Schaetzen Sie anschliessend bitte ein, ob Hendrik im Bereich Satzbau erwartungsgemaess entwickelt ist: aufmachen guckema tak

Kategorien: 1 = 1 - nicht erwartungsgemaess entwickelt; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - erwartungsgemaess entwickelt

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
KoennenDiagnSynDaM_01	69	2.62	0.79

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - nicht erwartungsgemaess entwickelt	8.7	8.7
2	2	30.4	30.4
3	3	50.7	50.7
4	4	10.1	10.1
5	5 - erwartungsgemaess entwickelt	0.0	0.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte (*N_{valid}* = 69) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte (*N_{total}* = 69) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.149 KoennenBerichtInfo_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenBerichtInfo_1

Label: [Sandra spricht sehr gerne und viel.] Bitte stellen Sie sich vor, Sie erhalten die Dokumentation einer Sprachfoerderkraft Ihrer Einrichtung. Wie informativ schaetzen Sie die folgenden Aussagen fuer Ihre weitere gezielte Sprachfoerderung ein?

Kategorien: 1 = 1 - ueberhaupt nicht informativ; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr informativ

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenBerichtInfo_1	69	3.01	1.22

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - ueberhaupt nicht informativ	8.7	8.7
2	2	31.9	31.9
3	3	23.2	23.2
4	4	21.7	21.7
5	5 - sehr informativ	14.5	14.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.150 KoennenBerichtInfo_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenBerichtInfo_2

Label: [Moritz verwendet oft falsche Woerter und verbessert sich danach.] Bitte stellen Sie sich vor, Sie erhalten die Dokumentation einer Sprachfoerderkraft Ihrer Einrichtung. Wie informativ schaetzen Sie die folgenden Aussagen fuer Ihre weitere gezielte Spra

Kategorien: 1 = 1 - ueberhaupt nicht informativ; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr informativ

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenBerichtInfo_2	69	3.51	1.08

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - ueberhaupt nicht informativ	1.4	1.4
2	2	20.3	20.3
3	3	24.6	24.6
4	4	33.3	33.3
5	5 - sehr informativ	20.3	20.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.151 KoennenBerichtInfo_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenBerichtInfo_3

Label: [Katrin muss noch lernen, dass auch andere Kinder reden duerfen.] Bitte stellen Sie sich vor, Sie erhalten die Dokumentation einer Sprachfoerderkraft Ihrer Einrichtung. Wie informativ schaetzen Sie die folgenden Aussagen fuer Ihre weitere gezielte Sprac

Kategorien: 1 = 1 - ueberhaupt nicht informativ; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr informativ

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenBerichtInfo_3	69	2.23	1.09

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - ueberhaupt nicht informativ	30.4	30.4
2	2	31.9	31.9
3	3	24.6	24.6
4	4	10.1	10.1
5	5 - sehr informativ	2.9	2.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.152 KoennenBerichtInfo_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenBerichtInfo_4

Label: [Bei der Verwendung von starken Verben macht Uemit grosse Fortschritte.] Bitte stellen Sie sich vor, Sie erhalten die Dokumentation einer Sprachfoerderkraft Ihrer Einrichtung. Wie informativ schaetzen Sie die folgenden Aussagen fuer Ihre weitere gezielte

Kategorien: 1 = 1 - ueberhaupt nicht informativ; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr informativ

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenBerichtInfo_4	69	3.64	1.21

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - ueberhaupt nicht informativ	7.2	7.2
2	2	11.6	11.6
3	3	18.8	18.8
4	4	34.8	34.8
5	5 - sehr informativ	27.5	27.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.153 KoennenBerichtInfo_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenBerichtInfo_5

Label: [Annica konnte heute schon mehr bei unserem Begruessungslied mitsingen als beim letzten Mal.] Bitte stellen Sie sich vor, Sie erhalten die Dokumentation einer Sprachfoerderkraft Ihrer Einrichtung. Wie informativ schaezen Sie die folgenden Aussagen fuer

Kategorien: 1 = 1 - ueberhaupt nicht informativ; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr informativ

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenBerichtInfo_5	69	3.20	1.08

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - ueberhaupt nicht informativ	8.7	8.7
2	2	14.5	14.5
3	3	33.3	33.3
4	4	34.8	34.8
5	5 - sehr informativ	8.7	8.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.154 KoennenBerichtInfo_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenBerichtInfo_6

Label: [Kevin hat sich beim Reimen schnell entmutigen lassen und hat dann trotzig bis zum Ende der Stunde geschwiegen.] Bitte stellen Sie sich vor, Sie erhalten die Dokumentation einer Sprachfoerderkraft Ihrer Einrichtung. Wie informativ schaetzen Sie die folge

Kategorien: 1 = 1 - ueberhaupt nicht informativ; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr informativ

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenBerichtInfo_6	69	2.83	1.18

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - ueberhaupt nicht informativ	13.0	13.0
2	2	30.4	30.4
3	3	26.1	26.1
4	4	21.7	21.7
5	5 - sehr informativ	8.7	8.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.155 KoennenBerichtInfo_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenBerichtInfo_7

Label: [Emre stellt jetzt das Verb in ungefaehr der Haelfte der Faelle an die 2. Stelle des Satzes.] Bitte stellen Sie sich vor, Sie erhalten die Dokumentation einer Sprachfoerderkraft Ihrer Einrichtung. Wie informativ schaetzen Sie die folgenden Aussagen fuer

Kategorien: 1 = 1 - ueberhaupt nicht informativ; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr informativ

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenBerichtInfo_7	69	3.94	0.94

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - ueberhaupt nicht informativ	1.4	1.4
2	2	7.2	7.2
3	3	15.9	15.9
4	4	46.4	46.4
5	5 - sehr informativ	29.0	29.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.156 KoennenBerichtInfo_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenBerichtInfo_8

Label: [Vincenz hatte Schwierigkeiten beim Silben klatschen.] Bitte stellen Sie sich vor, Sie erhalten die Dokumentation einer Sprachfoerderkraft Ihrer Einrichtung. Wie informativ schaetzen Sie die folgenden Aussagen fuer Ihre weitere gezielte Sprachfoerderung

Kategorien: 1 = 1 - ueberhaupt nicht informativ; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr informativ

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenBerichtInfo_8	69	4.03	0.84

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - ueberhaupt nicht informativ	0.0	0.0
2	2	4.3	4.3
3	3	20.3	20.3
4	4	43.5	43.5
5	5 - sehr informativ	31.9	31.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.157 KoennenMethodikSelek1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenMethodikSelek1

Label: Sie haben bei den Kindern in ihrer Sprachfoerdergruppe festgestellt, dass sie mit der Unterscheidung zwischen Akkusativ (Wen) und Dativ (Wem) Probleme haben. Sie sagen z.B. oft Sätze wie: Ich sitze auf den Stuhl. Welches der folgenden Spiele koennen Sie u

Kategorien: 1 = *Gegenstaende in einer Kiste ertasten und erraten*; 2 = *Bilder benennen lassen*; 3 = *Bildausschnitte von Personen und Gegenstaenden auf einem grossen Bild suchen lassen*; 4 = *Anziehspiel mit verschiedenen Puppen und Kleidungsstuecken*; 5 = *Ich sehe was, was du nicht siehst...*; 6 = *Ich packe meinen Koffer...*; 7 = *Klassisches Memory spielen*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenMethodikSelek1	69	4.04	1.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Gegenstaende in einer Kiste ertasten und erraten	2.9	2.9
2	Bilder benennen lassen	8.7	8.7
3	Bildausschnitte von Personen und Gegenstaenden auf einem grossen Bild suchen lassen	33.3	33.3
4	Anziehspiel mit verschiedenen Puppen und Kleidungsstuecken	18.8	18.8
5	Ich sehe was, was du nicht siehst...	8.7	8.7
6	Ich packe meinen Koffer...	27.5	27.5

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
7	Klassisches Memory spielen	0.0	0.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.158 KoennenDiagnSynDaZ_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenDiagnSynDaZ_1

Label: [Zeyneps Satzbau ist...] Sehen Sie sich die folgenden Aeusserungen von Zeynep (4;4 Jahre) mit Deutsch als Zweitsprache an. Das Kind hat seit 8 Monaten Kontakt zur deutschen Sprache. Schaetzen Sie anschliessend ein, ob es im Bereich Satzbau erwartungsgemae

Kategorien: 1 = 1 - nicht erwartungsgemaess entwickelt; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - erwartungsgemaess entwickelt

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenDiagnSynDaZ_1	69	3.70	0.99

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - nicht erwartungsgemaess entwickelt	0.0	0.0
2	2	13.0	13.0
3	3	29.0	29.0
4	4	33.3	33.3
5	5 - erwartungsgemaess entwickelt	24.6	24.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.159 Strategie_L1_L2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Strategie_L1_L2

Label: Im Elterngespräch erzählen Ihnen die türkischstämmigen Eltern eines Kindes, die seit ca. einem Jahr in Deutschland leben, dass sie mit dem Kind zu Hause nur noch Deutsch sprechen. Ihnen fällt auf, dass beide Eltern eher geringe Deutschkenntnisse haben

Kategorien: 1 = *Ich lobe die Eltern für ihr Engagement und sage, sie sollen genauso weitermachen, da es für das Kind wichtig ist, sehr*; 2 = *Ich erkläre den Eltern, dass es sinnvoller ist, wenn sie mit ihrem Kind die Sprache sprechen, die sie am besten beherrs*; 3 = *Ich ermutige die Eltern, so weiterzumachen und zusätzlich noch einen Deutschkurs an der Volkshochschule zu besuchen.*; 4 = *Ich ermutige die Eltern, sich deutschsprachige Bücher und Liedtexte zu besorgen. So können die Eltern gezielt auch etw*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
Strategie_L1_L2	69	2.38	0.81

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Ich lobe die Eltern für ihr Engagement und sage, sie sollen genauso weitermachen, da es für das Kind wichtig ist, sehr	5.8	5.8
2	Ich erkläre den Eltern, dass es sinnvoller ist, wenn sie mit ihrem Kind die Sprache sprechen, die sie am besten beherrs	65.2	65.2
3	Ich ermutige die Eltern, so weiterzumachen und zusätzlich noch einen Deutschkurs an der Volkshochschule zu besuchen.	14.5	14.5

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
4	Ich ermutige die Eltern, sich deutschsprachige Buecher und Liedtexte zu besorgen. So koennen die Eltern gezielt auch etw	14.5	14.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.160 KoennenStrategieReflk_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenStrategieReflk_1

Label: [Rank 1] Sie machen seit einem halben Jahr Sprachfoerderung in der Kita. Sie sind sich nicht sicher, ob Ihr Sprachverhalten in der Interaktion mit den Kindern gut ist und wollen Ihr Verhalten moeglichst genau ueberpruefen. Ordnen Sie die verschiedenen Moe

Kategorien: 1 = *Ich notiere mir waehrend einer Sprachfoerderstunde, immer wenn ich Zeit habe, was ich zu den Kindern gesagt habe und ana*; 2 = *Ich bitte eine Kollegin, mich in der Interaktion mit den Kindern zu beobachten und mir zu sagen, ob ich mich richtig ver*; 3 = *Ich bitte eine Kollegin, sich kurze Dialoge zwischen mir und den Kindern woertlich zu notieren und analysiere anhand des*; 4 = *Ich nehme Gespraechе zwischen mir und den Kindern in unterschiedlichen Situationen auf (Audio/Video, in der Einrichtung*; 5 = *Ich frage meine Kitaleitung, ob ich an einer Fortbildung zum Thema Sprachfoerderung teilnehmen kann.*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenStrategieReflk_1	69	3.67	1.41

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Ich notiere mir waehrend einer Sprachfoerderstunde, immer wenn ich Zeit habe, was ich zu den Kindern gesagt habe und ana	10.1	10.1
2	Ich bitte eine Kollegin, mich in der Interaktion mit den Kindern zu beobachten und mir zu sagen, ob ich mich richtig ver	17.4	17.4

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
3	Ich bitte eine Kollegin, sich kurze Dialoge zwischen mir und den Kindern woertlich zu notieren und analysiere anhand des	7.2	7.2
4	Ich nehme Gespraechе zwischen mir und den Kindern in unterschiedlichen Situationen auf (Audio/Video, in der Einrichtung	26.1	26.1
5	Ich frage meine Kitaleitung, ob ich an einer Fortbildung zum Thema Sprachfoerderung teilnehmen kann.	39.1	39.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.161 KoennenStrategieReflk_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenStrategieReflk_2

Label: [Rank 2] Sie machen seit einem halben Jahr Sprachfoerderung in der Kita. Sie sind sich nicht sicher, ob Ihr Sprachverhalten in der Interaktion mit den Kindern gut ist und wollen Ihr Verhalten moeglichst genau ueberpruefen. Ordnen Sie die verschiedenen Moe

Kategorien: 1 = *Ich notiere mir waehrend einer Sprachfoerderstunde, immer wenn ich Zeit habe, was ich zu den Kindern gesagt habe und ana*; 2 = *Ich bitte eine Kollegin, mich in der Interaktion mit den Kindern zu beobachten und mir zu sagen, ob ich mich richtig ver*; 3 = *Ich bitte eine Kollegin, sich kurze Dialoge zwischen mir und den Kindern woertlich zu notieren und analysiere anhand des*; 4 = *Ich nehme Gespraechе zwischen mir und den Kindern in unterschiedlichen Situationen auf (Audio/Video, in der Einrichtung*; 5 = *Ich frage meine Kitaleitung, ob ich an einer Fortbildung zum Thema Sprachfoerderung teilnehmen kann.*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenStrategieReflk_2	69	3.29	1.07

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Ich notiere mir waehrend einer Sprachfoerderstunde, immer wenn ich Zeit habe, was ich zu den Kindern gesagt habe und ana	7.2	7.2
2	Ich bitte eine Kollegin, mich in der Interaktion mit den Kindern zu beobachten und mir zu sagen, ob ich mich richtig ver	14.5	14.5

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
3	Ich bitte eine Kollegin, sich kurze Dialoge zwischen mir und den Kindern wortlich zu notieren und analysiere anhand des	30.4	30.4
4	Ich nehme Gespraechе zwischen mir und den Kindern in unterschiedlichen Situationen auf (Audio/Video, in der Einrichtung	37.7	37.7
5	Ich frage meine Kitaleitung, ob ich an einer Fortbildung zum Thema Sprachfoerderung teilnehmen kann.	10.1	10.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.162 KoennenStrategieReflk_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenStrategieReflk_3

Label: [Rank 3] Sie machen seit einem halben Jahr Sprachfoerderung in der Kita. Sie sind sich nicht sicher, ob Ihr Sprachverhalten in der Interaktion mit den Kindern gut ist und wollen Ihr Verhalten moeglichst genau ueberpruefen. Ordnen Sie die verschiedenen Moe

Kategorien: 1 = *Ich notiere mir waehrend einer Sprachfoerderstunde, immer wenn ich Zeit habe, was ich zu den Kindern gesagt habe und ana*; 2 = *Ich bitte eine Kollegin, mich in der Interaktion mit den Kindern zu beobachten und mir zu sagen, ob ich mich richtig ver*; 3 = *Ich bitte eine Kollegin, sich kurze Dialoge zwischen mir und den Kindern woertlich zu notieren und analysiere anhand des*; 4 = *Ich nehme Gespraechе zwischen mir und den Kindern in unterschiedlichen Situationen auf (Audio/Video, in der Einrichtung*; 5 = *Ich frage meine Kitaleitung, ob ich an einer Fortbildung zum Thema Sprachfoerderung teilnehmen kann.*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenStrategieReflk_3	69	2.84	1.11

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Ich notiere mir waehrend einer Sprachfoerderstunde, immer wenn ich Zeit habe, was ich zu den Kindern gesagt habe und ana	10.1	10.1
2	Ich bitte eine Kollegin, mich in der Interaktion mit den Kindern zu beobachten und mir zu sagen, ob ich mich richtig ver	31.9	31.9

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
3	Ich bitte eine Kollegin, sich kurze Dialoge zwischen mir und den Kindern woertlich zu notieren und analysiere anhand des	29.0	29.0
4	Ich nehme Gespraechе zwischen mir und den Kindern in unterschiedlichen Situationen auf (Audio/Video, in der Einrichtung	21.7	21.7
5	Ich frage meine Kitaleitung, ob ich an einer Fortbildung zum Thema Sprachfoerderung teilnehmen kann.	7.2	7.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.163 KoennenStrategieReflk_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenStrategieReflk_4

Label: [Rank 4] Sie machen seit einem halben Jahr Sprachfoerderung in der Kita. Sie sind sich nicht sicher, ob Ihr Sprachverhalten in der Interaktion mit den Kindern gut ist und wollen Ihr Verhalten moeglichst genau ueberpruefen. Ordnen Sie die verschiedenen Moe

Kategorien: 1 = *Ich notiere mir waehrend einer Sprachfoerderstunde, immer wenn ich Zeit habe, was ich zu den Kindern gesagt habe und ana*; 2 = *Ich bitte eine Kollegin, mich in der Interaktion mit den Kindern zu beobachten und mir zu sagen, ob ich mich richtig ver*; 3 = *Ich bitte eine Kollegin, sich kurze Dialoge zwischen mir und den Kindern woertlich zu notieren und analysiere anhand des*; 4 = *Ich nehme Gespraechе zwischen mir und den Kindern in unterschiedlichen Situationen auf (Audio/Video, in der Einrichtung*; 5 = *Ich frage meine Kitaleitung, ob ich an einer Fortbildung zum Thema Sprachfoerderung teilnehmen kann.*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenStrategieReflk_4	69	2.61	1.40

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Ich notiere mir waehrend einer Sprachfoerderstunde, immer wenn ich Zeit habe, was ich zu den Kindern gesagt habe und ana	29.0	29.0
2	Ich bitte eine Kollegin, mich in der Interaktion mit den Kindern zu beobachten und mir zu sagen, ob ich mich richtig ver	21.7	21.7

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
3	Ich bitte eine Kollegin, sich kurze Dialoge zwischen mir und den Kindern woertlich zu notieren und analysiere anhand des	23.2	23.2
4	Ich nehme Gespraechе zwischen mir und den Kindern in unterschiedlichen Situationen auf (Audio/Video, in der Einrichtung	11.6	11.6
5	Ich frage meine Kitaleitung, ob ich an einer Fortbildung zum Thema Sprachfoerderung teilnehmen kann.	14.5	14.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.164 KoennenStrategieReflk_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenStrategieReflk_5

Label: [Rank 5] Sie machen seit einem halben Jahr Sprachfoerderung in der Kita. Sie sind sich nicht sicher, ob Ihr Sprachverhalten in der Interaktion mit den Kindern gut ist und wollen Ihr Verhalten moeglichst genau ueberpruefen. Ordnen Sie die verschiedenen Moe

Kategorien: 1 = *Ich notiere mir waehrend einer Sprachfoerderstunde, immer wenn ich Zeit habe, was ich zu den Kindern gesagt habe und ana*; 2 = *Ich bitte eine Kollegin, mich in der Interaktion mit den Kindern zu beobachten und mir zu sagen, ob ich mich richtig ver*; 3 = *Ich bitte eine Kollegin, sich kurze Dialoge zwischen mir und den Kindern woertlich zu notieren und analysiere anhand des*; 4 = *Ich nehme Gespraechе zwischen mir und den Kindern in unterschiedlichen Situationen auf (Audio/Video, in der Einrichtung*; 5 = *Ich frage meine Kitaleitung, ob ich an einer Fortbildung zum Thema Sprachfoerderung teilnehmen kann.*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenStrategieReflk_5	69	2.59	1.72

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Ich notiere mir waehrend einer Sprachfoerderstunde, immer wenn ich Zeit habe, was ich zu den Kindern gesagt habe und ana	43.5	43.5
2	Ich bitte eine Kollegin, mich in der Interaktion mit den Kindern zu beobachten und mir zu sagen, ob ich mich richtig ver	14.5	14.5

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
3	Ich bitte eine Kollegin, sich kurze Dialoge zwischen mir und den Kindern woertlich zu notieren und analysiere anhand des	10.1	10.1
4	Ich nehme Gespraechе zwischen mir und den Kindern in unterschiedlichen Situationen auf (Audio/Video, in der Einrichtung	2.9	2.9
5	Ich frage meine Kitaleitung, ob ich an einer Fortbildung zum Thema Sprachfoerderung teilnehmen kann.	29.0	29.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.165 KoennenStraPlanWort_01

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenStraPlanWort_01

Label: [Oma, Opa, Onkel, Tante] Sie planen fuer Ihre Sprachfoerdergruppe von 3-4-jaehrigen Kindern mit Deutsch als Zweitsprache eine Sprachfoerderstunde mit dem Thema „Meine Familie“. Sie beginnen gerade mit diesem Thema und moechten neuen Wortschatz einfueh

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenStraPlanWort_01	69	0.70	0.46

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	30.4	30.4
1	Ja	69.6	69.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.166 KoennenStraPlanWort_02

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenStraPlanWort_02

Label: [Junge, Maedchen, Mann, Frau] Sie planen fuer Ihre Sprachfoerdergruppe von 3-4-jaehrigen Kindern mit Deutsch als Zweitsprache eine Sprachfoerderstunde mit dem Thema „Meine Familie“. Sie beginnen gerade mit diesem Thema und moechten neuen Wortschatz ei

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenStraPlanWort_02	69	0.71	0.46

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	29.0	29.0
1	Ja	71.0	71.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.167 KoennenStraPlanWort_03

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenStraPlanWort_03

Label: [spielen, besuchen, weinen, troesten] Sie planen fuer Ihre Sprachfoerdergruppe von 3-4-jaehrigen Kindern mit Deutsch als Zweitsprache eine Sprachfoederstunde mit dem Thema „Meine Familie“. Sie beginnen gerade mit diesem Thema und moechten neuen Worts

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenStraPlanWort_03	69	0.29	0.46

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	71.0	71.0
1	Ja	29.0	29.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.168 KoennenStraPlanWort_04

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenStraPlanWort_04

Label: [Mama, Papa, Bruederchen, Schwesterchen] Sie planen fuer Ihre Sprachfoerdergruppe von 3-4-jaehrigen Kindern mit Deutsch als Zweitsprache eine Sprachfoerderstunde mit dem Thema „Meine Familie“. Sie beginnen gerade mit diesem Thema und moechten neuen Wo

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenStraPlanWort_04	69	0.29	0.46

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	71.0	71.0
1	Ja	29.0	29.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.169 KoennenStraPlanWort_05

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenStraPlanWort_05

Label: [arbeiten, abholen, wohnen, zusammen sein] Sie planen fuer Ihre Sprachfoerdergruppe von 3-4-jaehrigen Kindern mit Deutsch als Zweitsprache eine Sprachfoerdestunde mit dem Thema „Meine Familie“. Sie beginnen gerade mit diesem Thema und moechten neuen

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenStraPlanWort_05	69	0.28	0.45

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	72.5	72.5
1	Ja	27.5	27.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.170 KoennenStraPlanWort_06

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenStraPlanWort_06

Label: [Ich, Mutter, Vater, Schwester, Bruder] Sie planen fuer Ihre Sprachfoerdergruppe von 3-4-jaehrigen Kindern mit Deutsch als Zweitsprache eine Sprachfoederstunde mit dem Thema „Meine Familie“. Sie beginnen gerade mit diesem Thema und moechten neuen Wor

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenStraPlanWort_06	69	0.90	0.30

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	10.1	10.1
1	Ja	89.9	89.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.171 KoennenStraPlanWort_07

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenStraPlanWort_07

Label: [klein, gross, jung, alt] Sie planen fuer Ihre Sprachfoerdergruppe von 3-4-jaehrigen Kindern mit Deutsch als Zweitsprache eine Sprachfoerderstunde mit dem Thema „Meine Familie“. Sie beginnen gerade mit diesem Thema und moechten neuen Wortschatz einfue

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenStraPlanWort_07	69	0.54	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	46.4	46.4
1	Ja	53.6	53.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.172 KoennenStraPlanWort_08

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenStraPlanWort_08

Label: [Erwachsener, Kind, Baby, Haustier] Sie planen fuer Ihre Sprachfoerdergruppe von 3-4-jaehrigen Kindern mit Deutsch als Zweitsprache eine Sprachfoederstunde mit dem Thema „Meine Familie“. Sie beginnen gerade mit diesem Thema und moechten neuen Wortsch

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenStraPlanWort_08	69	0.30	0.46

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	69.6	69.6
1	Ja	30.4	30.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.173 KoennenDiagnPhon_01

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenDiagnPhon_01

Label: [Majas Aussprache ist...] Sehen Sie sich die folgenden Aeusserungen von Maja (4;7 Jahre) mit Erstsprache Deutsch an. Schaetzen Sie anschliessend ein, ob das Kind im Bereich der Aussprache erwartungsgemaess entwickelt ist. Der metterling ist ganz blau. Ich

Kategorien: 1 = 1 - nicht erwartungsgemaess entwickelt; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - erwartungsgemaess entwickelt

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenDiagnPhon_01	69	2.22	1.06

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - nicht erwartungsgemaess entwickelt	27.5	27.5
2	2	37.7	37.7
3	3	24.6	24.6
4	4	5.8	5.8
5	5 - erwartungsgemaess entwickelt	4.3	4.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.174 KoennenStraPlankeinD

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenStraPlankeinD

Label: Ein Kind (3;10 Jahre) mit Erstsprache Tuerkisch besucht seit 9 Monaten die Kita und hatte dort zum ersten Mal Kontakt zur deutschen Sprache. Im Alltag ist Ihnen aufgefallen, dass das Kind nicht Deutsch spricht. Es kommuniziert mit Ihnen, Ihren Kolleginnen

Kategorien: 1 = *bei den Eltern erfragen, ob das Kind in der Erstsprache normal entwickelt ist oder ob sie Auffaelligkeiten bemerkt haben*; 2 = *die Eltern informieren, dass das Kind Sprachprobleme hat und zum Logopaeden schicken*; 3 = *einen Sprachtest durchfuehren, um den Sprachstand objektiv festzustellen*; 4 = *besonders viel mit dem Kind sprechen und ihm ein gutes Sprachvorbild sein*; 5 = *das Kind immer wieder zum Sprechen auffordern*; 6 = *abwarten; manche Kinder brauchen etwas Zeit, bis sie sich in der Zweitsprache sprachlich aeussern*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenStraPlankeinD	69	2.72	1.73

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	bei den Eltern erfragen, ob das Kind in der Erstsprache normal entwickelt ist oder ob sie Auffaelligkeiten bemerkt haben	44.9	44.9
2	die Eltern informieren, dass das Kind Sprachprobleme hat und zum Logopaeden schicken	1.4	1.4
3	einen Sprachtest durchfuehren, um den Sprachstand objektiv festzustellen	11.6	11.6
4	besonders viel mit dem Kind sprechen und ihm ein gutes Sprachvorbild sein	27.5	27.5

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
5	das Kind immer wieder zum Sprechen auffordern	7.2	7.2
6	abwarten; manche Kinder brauchen etwas Zeit, bis sie sich in der Zweitsprache sprachlich äussern	7.2	7.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.175 KoennenMethMonitReflx_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenMethMonitReflx_1

Label: [Fragetechnik] Sehen Sie sich den Dialog zwischen einer Erzieherin und vier Kindern nochmals an. Bewerten Sie das sprachliche Verhalten der Erzieherin anschliessend auf den angegebenen Ebenen.

Kategorien: 1 = 1 - wenig sprachfoerderlich; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr sprachfoerderlich

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenMethMonitReflx_1	69	3.70	1.14

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - wenig sprachfoerderlich	2.9	2.9
2	2	13.0	13.0
3	3	27.5	27.5
4	4	24.6	24.6
5	5 - sehr sprachfoerderlich	31.9	31.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.176 KoennenMethMonitReflx_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenMethMonitReflx_2

Label: [Feedbackverhalten] Sehen Sie sich den Dialog zwischen einer Erzieherin und vier Kindern nochmals an. Bewerten Sie das sprachliche Verhalten der Erzieherin anschliessend auf den angegebenen Ebenen.

Kategorien: 1 = 1 - wenig sprachfoerderlich; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr sprachfoerderlich

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenMethMonitReflx_2	69	3.77	1.07

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - wenig sprachfoerderlich	1.4	1.4
2	2	10.1	10.1
3	3	31.9	31.9
4	4	23.2	23.2
5	5 - sehr sprachfoerderlich	33.3	33.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.177 KoennenMethMonitReflx_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenMethMonitReflx_3

Label: [Gegenueberstellen von Wortformen] Sehen Sie sich den Dialog zwischen einer Erzieherin und vier Kindern nochmals an. Bewerten Sie das sprachliche Verhalten der Erzieherin anschliessend auf den angegebenen Ebenen.

Kategorien: 1 = 1 - *wenig sprachfoerderlich*; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - *sehr sprachfoerderlich*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenMethMonitReflx_3	69	3.54	1.07

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - wenig sprachfoerderlich	4.3	4.3
2	2	13.0	13.0
3	3	24.6	24.6
4	4	40.6	40.6
5	5 - sehr sprachfoerderlich	17.4	17.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.178 KoennenMethodikAnpass_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenMethodikAnpass_1

Label: [genauso wie mit anderen Kindern] Ein 2 1/2 Jaehriges Kind bildet bisher nur Wortkombinationen wie „Apfel essen“, „Ball draussen“ und formt noch keine richtigen Saetze. Wie sprechen Sie mit dem Kind?

Kategorien: 1 = 1 - keinesfalls; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - auf jeden Fall

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenMethodikAnpass_1	69	3.58	1.32

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - keinesfalls	8.7	8.7
2	2	14.5	14.5
3	3	20.3	20.3
4	4	23.2	23.2
5	5 - auf jeden Fall	33.3	33.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.179 KoennenMethodikAnpass_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenMethodikAnpass_2

Label: [langsam und deutlich] Ein 2 1/2 Jaehriges Kind bildet bisher nur Wortkombinationen wie „Apfel essen“, „Ball draussen“ und formt noch keine richtigen Saetze. Wie sprechen Sie mit dem Kind?

Kategorien: 1 = 1 - keinesfalls; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - auf jeden Fall

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenMethodikAnpass_2	69	4.43	0.78

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - keinesfalls	0.0	0.0
2	2	1.4	1.4
3	3	13.0	13.0
4	4	26.1	26.1
5	5 - auf jeden Fall	59.4	59.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.180 KoennenMethodikAnpass_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenMethodikAnpass_3

Label: [in kurzen, deutlichen Hauptsätzen] Ein 2 1/2 Jähriges Kind bildet bisher nur Wortkombinationen wie „Apfel essen“, „Ball draussen“ und formt noch keine richtigen Sätze. Wie sprechen Sie mit dem Kind?

Kategorien: 1 = 1 - keinesfalls; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - auf jeden Fall

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenMethodikAnpass_3	69	4.42	0.77

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - keinesfalls	0.0	0.0
2	2	2.9	2.9
3	3	8.7	8.7
4	4	31.9	31.9
5	5 - auf jeden Fall	56.5	56.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.181 KoennenMethodikAnpass_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenMethodikAnpass_4

Label: [in komplexeren Sätzen] Ein 2 1/2 Jähriges Kind bildet bisher nur Wortkombinationen wie „Apfel essen“, „Ball draussen“ und formt noch keine richtigen Sätze. Wie sprechen Sie mit dem Kind?

Kategorien: 1 = 1 - keinesfalls; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - auf jeden Fall

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenMethodikAnpass_4	69	2.12	1.28

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - keinesfalls	44.9	44.9
2	2	21.7	21.7
3	3	17.4	17.4
4	4	8.7	8.7
5	5 - auf jeden Fall	7.2	7.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.182 KoennenMethodikAnpass_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenMethodikAnpass_5

Label: [in ungewöhnlichen Satzstrukturen] Ein 2 1/2 Jähriges Kind bildet bisher nur Wortkombinationen wie „Apfel essen“, „Ball draussen“ und formt noch keine richtigen Sätze. Wie sprechen Sie mit dem Kind?

Kategorien: 1 = 1 - keinesfalls; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - auf jeden Fall

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenMethodikAnpass_5	69	1.22	0.54

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - keinesfalls	82.6	82.6
2	2	14.5	14.5
3	3	1.4	1.4
4	4	1.4	1.4
5	5 - auf jeden Fall	0.0	0.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.183 KoennenMethodikAnpass_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenMethodikAnpass_6

Label: [das vom Kind Gesagte in Form eines Satzes wiederholen] Ein 2 1/2 Jaehriges Kind bildet bisher nur Wortkombinationen wie „Apfel essen“, „Ball draussen“ und formt noch keine richtigen Saetze. Wie sprechen Sie mit dem Kind?

Kategorien: 1 = 1 - keinesfalls; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - auf jeden Fall

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenMethodikAnpass_6	69	4.33	0.92

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - keinesfalls	2.9	2.9
2	2	1.4	1.4
3	3	8.7	8.7
4	4	33.3	33.3
5	5 - auf jeden Fall	53.6	53.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.184 KoennenMethodikAnpass_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenMethodikAnpass_7

Label: [das Kind richtige Sätze nachsprechen lassen] Ein 2 1/2 Jähriges Kind bildet bisher nur Wortkombinationen wie „Apfel essen“, „Ball draussen“ und formt noch keine richtigen Sätze. Wie sprechen Sie mit dem Kind?

Kategorien: 1 = 1 - keinesfalls; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - auf jeden Fall

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenMethodikAnpass_7	69	2.59	1.36

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - keinesfalls	30.4	30.4
2	2	18.8	18.8
3	3	21.7	21.7
4	4	18.8	18.8
5	5 - auf jeden Fall	10.1	10.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.185 KoennenDiagSelektion_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenDiagSelektion_1

Label: [Hauptsatze und Nebensaetze gegenueberstellen] Sie haben beobachtet, dass ein Kind typischerweise folgende Aeusserungen produziert: de Junge haltet die Ball dass die Maedchen aufhoeren soll der willt die Hund gucken de Muell is da rausgefallt weil die Hu

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	(kein Label vergeben)	46.4	46.4
5	(kein Label vergeben)	26.1	26.1
10	(kein Label vergeben)	23.2	23.2
15	(kein Label vergeben)	1.4	1.4
25	(kein Label vergeben)	1.4	1.4
30	(kein Label vergeben)	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.186 KoennenDiagSelektion_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenDiagSelektion_2

Label: [Aussprache bestimmter Laute besonders hervorheben] Sie haben beobachtet, dass ein Kind typischerweise folgende Aeusserungen produziert: de Junge haltet die Ball dass die Maedchen aufhoeren soll der willt die Hund gucken de Muell is da rausgefallt weil di

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	(kein Label vergeben)	30.4	30.4
5	(kein Label vergeben)	27.5	27.5
10	(kein Label vergeben)	17.4	17.4
15	(kein Label vergeben)	13.0	13.0
20	(kein Label vergeben)	7.2	7.2
25	(kein Label vergeben)	2.9	2.9
30	(kein Label vergeben)	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.187 KoennenDiagSelektion_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenDiagSelektion_3

Label: [Artikel mit unterschiedlichem Geschlecht (der, die, das) kontrastieren] Sie haben beobachtet, dass ein Kind typischerweise folgende Äußerungen produziert: de Junge haltet die Ball dass die Mädchen aufhören soll der willt die Hund gucken de Muell is d

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	(kein Label vergeben)	5.8	5.8
5	(kein Label vergeben)	4.3	4.3
10	(kein Label vergeben)	33.3	33.3
15	(kein Label vergeben)	30.4	30.4
20	(kein Label vergeben)	17.4	17.4
25	(kein Label vergeben)	2.9	2.9
30	(kein Label vergeben)	2.9	2.9
35	(kein Label vergeben)	1.4	1.4
45	(kein Label vergeben)	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.188 KoennenDiagSelektion_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenDiagSelektion_4

Label: [Artikel im Singular und Plural kontrastieren] Sie haben beobachtet, dass ein Kind typischerweise folgende Äußerungen produziert: de Junge haltet die Ball dass die Maedchen aufhoeren soll der willt die Hund gucken de Muell is da rausgefallt weil die Hun

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	(kein Label vergeben)	31.9	31.9
5	(kein Label vergeben)	17.4	17.4
10	(kein Label vergeben)	30.4	30.4
15	(kein Label vergeben)	15.9	15.9
20	(kein Label vergeben)	4.3	4.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.189 KoennenDiagSelektion_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenDiagSelektion_5

Label: [Artikel im Dativ (Wem-Fall) und Nominativ (Wer-Fall) kontrastieren] Sie haben beobachtet, dass ein Kind typischerweise folgende Äußerungen produziert: de Junge haltet die Ball dass die Maedchen aufhoeren soll der willt die Hund gucken de Muell is da ra

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	(kein Label vergeben)	34.8	34.8
5	(kein Label vergeben)	21.7	21.7
10	(kein Label vergeben)	26.1	26.1
15	(kein Label vergeben)	10.1	10.1
20	(kein Label vergeben)	5.8	5.8
30	(kein Label vergeben)	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.190 KoennenDiagSelektion_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenDiagSelektion_6

Label: [reichhaltigen Wortschatz im Themenfeld „Freizeit“ anbieten] Sie haben beobachtet, dass ein Kind typischerweise folgende Aeusserungen produziert: de Junge haltet die Ball dass die Maedchen aufhoeren soll der willt die Hund gucken de Muell is da rausge

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	(kein Label vergeben)	43.5	43.5
5	(kein Label vergeben)	24.6	24.6
10	(kein Label vergeben)	21.7	21.7
15	(kein Label vergeben)	7.2	7.2
20	(kein Label vergeben)	2.9	2.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.191 KoennenDiagSelektion_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenDiagSelektion_7

Label: [Verben in unterschiedlichen Formen anbieten] Sie haben beobachtet, dass ein Kind typischerweise folgende Aeusserungen produziert: de Junge haltet die Ball dass die Maedchen aufhoeren soll der willt die Hund gucken de Muell is da rausgefallt weil die Hund

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	(kein Label vergeben)	4.3	4.3
5	(kein Label vergeben)	5.8	5.8
10	(kein Label vergeben)	34.8	34.8
15	(kein Label vergeben)	24.6	24.6
20	(kein Label vergeben)	21.7	21.7
25	(kein Label vergeben)	4.3	4.3
30	(kein Label vergeben)	2.9	2.9
35	(kein Label vergeben)	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.192 KoennenMethMoniVari_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenMethMoniVari_1

Label: [„Und bevor du das Bild gemalt hast, was hast du da gemacht?“] Bitte schätzen Sie bei den folgenden Aussagen ein, wie variantenreich sie grammatisch gesehen sind:

Kategorien: 1 = 1 - ueberhaupt nicht variantenreich; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4 - sehr variantenreich

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenMethMoniVari_1	69	2.84	0.83

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - ueberhaupt nicht variantenreich	5.8	5.8
2	2	26.1	26.1
3	3	46.4	46.4
4	4 - sehr variantenreich	21.7	21.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.193 KoennenMethMoniVari_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenMethMoniVari_2

Label: [„Erst schneiden wir die Paprika in kleine Wuerfel, damit wir die winzigen Stuecke auf den Teller legen koennen.“] Bitte schaetzen Sie bei den folgenden Aussagen ein, wie variantenreich sie grammatisch gesehen sind:

Kategorien: 1 = 1 - ueberhaupt nicht variantenreich; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4 - sehr variantenreich

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenMethMoniVari_2	69	3.38	0.84

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - ueberhaupt nicht variantenreich	4.3	4.3
2	2	10.1	10.1
3	3	29.0	29.0
4	4 - sehr variantenreich	56.5	56.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.194 KoennenMethMoniVari_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenMethMoniVari_3

Label: [„Essen kommen, aber vorher Haende waschen!“] Bitte schaeetzen Sie bei den folgenden Aussagen ein, wie variantenreich sie grammatisch gesehen sind:

Kategorien: 1 = 1 - ueberhaupt nicht variantenreich; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4 - sehr variantenreich

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenMethMoniVari_3	69	1.87	0.80

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - ueberhaupt nicht variantenreich	37.7	37.7
2	2	39.1	39.1
3	3	21.7	21.7
4	4 - sehr variantenreich	1.4	1.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.195 KoennenMethMoniVari_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenMethMoniVari_4

Label: [„Auf einem Bauernhof gibt es viele Tiere: Kuehe zum Beispiel, und Huehner, oder auch Schweine.“] Bitte schaezten Sie bei den folgenden Aussagen ein, wie variantenreich sie grammatisch gesehen sind:

Kategorien: 1 = 1 - ueberhaupt nicht variantenreich; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4 - sehr variantenreich

Variablenname	N_{valid}	M	SD
KoennenMethMoniVari_4	69	2.78	0.91

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - ueberhaupt nicht variantenreich	7.2	7.2
2	2	31.9	31.9
3	3	36.2	36.2
4	4 - sehr variantenreich	24.6	24.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

8.196 xPhonologie_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xPhonologie_1

Label: Phonologie_1 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xPhonologie_1	69	0.38	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.

N_{total} = 69.

8.197 xPhonologie_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xPhonologie_4

Label: Phonologie_4 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xPhonologie_4	69	0.23	0.66	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.

N_{total} = 69.

8.198 xPhonologie_5_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xPhonologie_5_1

Label: SprachKopf_xPhonologie_5_1

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xPhonologie_5_1	69	0.97	0.24	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.199 xPhonologie_5_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xPhonologie_5_2

Label: SprachKopf_xPhonologie_5_2

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xPhonologie_5_2	69	-0.48	0.88	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.200 xPhonologie_5_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xPhonologie_5_3

Label: SprachKopf_xPhonologie_5_3

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xPhonologie_5_3	69	0.97	0.24	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.201 xPhonologie_5_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xPhonologie_5_4

Label: SprachKopf_xPhonologie_5_4

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xPhonologie_5_4	69	1.00	0.00	1.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

8.202 xPhonologie_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xPhonologie_5

Label: Phonologie_5 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xPhonologie_5	69	0.62	0.23	0.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

8.203 xPhonologie_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xPhonologie_7

Label: Phonologie_7 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xPhonologie_7	69	0.50	0.65	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.

N_{total} = 69.

8.204 xLexikon_2_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xLexikon_2_1

Label: SprachKopf_xLexikon_2_1

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xLexikon_2_1	69	-0.01	1.01	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.205 xLexikon_2_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xLexikon_2_2

Label: SprachKopf_xLexikon_2_2

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xLexikon_2_2	69	1.00	0.00	1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.206 xLexikon_2_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xLexikon_2_3

Label: SprachKopf_xLexikon_2_3

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xLexikon_2_3	69	0.22	0.98	-1.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.

N_{total} = 69.

8.207 xLexikon_2_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xLexikon_2_4

Label: SprachKopf_xLexikon_2_4

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xLexikon_2_4	69	0.86	0.52	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.208 xLexikon_2_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xLexikon_2_5

Label: SprachKopf_xLexikon_2_5

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xLexikon_2_5	69	0.77	0.65	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.209 xLexikon_2_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xLexikon_2_6

Label: SprachKopf_xLexikon_2_6

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xLexikon_2_6	69	0.86	0.52	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.210 xLexikon_2_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xLexikon_2_7

Label: SprachKopf_xLexikon_2_7

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xLexikon_2_7	69	0.94	0.34	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.211 xLexikon_2_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xLexikon_2_8

Label: SprachKopf_xLexikon_2_8

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xLexikon_2_8	69	0.97	0.24	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.212 xLexikon_2_9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xLexikon_2_9

Label: SprachKopf_xLexikon_2_9

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xLexikon_2_9	69	0.25	0.98	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.213 xLexikon_2_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xLexikon_2_10

Label: SprachKopf_xLexikon_2_10

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xLexikon_2_10	69	0.94	0.34	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.214 xLexikon_2_11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xLexikon_2_11

Label: SprachKopf_xLexikon_2_11

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xLexikon_2_11	69	0.91	0.41	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.215 xLexikon_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xLexikon_2

Label: Lexikon_2 ratekorrigiert

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xLexikon_2	69	0.70	0.24	-0.1	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.216 xLexikon_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xLexikon_4

Label: Lexikon_4 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xLexikon_4	69	0.25	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

8.217 xLexikon_6_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xLexikon_6_1

Label: SprachKopf_xLexikon_6_1

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xLexikon_6_1	69	0.19	0.99	-1.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.

N_{total} = 69.

8.218 xLexikon_6_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xLexikon_6_2

Label: SprachKopf_xLexikon_6_2

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xLexikon_6_2	69	0.54	0.85	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.219 xLexikon_6_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xLexikon_6_3

Label: SprachKopf_xLexikon_6_3

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xLexikon_6_3	69	-0.36	0.94	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.220 xLexikon_6_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xLexikon_6_4

Label: SprachKopf_xLexikon_6_4

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xLexikon_6_4	69	0.13	1.00	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.221 xLexikon_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xLexikon_6

Label: Lexikon_6 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xLexikon_6	69	0.12	0.59	-1.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

8.222 xMorphologie_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xMorphologie_1

Label: Morphologie_1 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xMorphologie_1	69	0.38	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.

N_{total} = 69.

8.223 xMorphologie_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xMorphologie_4

Label: Morphologie_4 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xMorphologie_4	69	0.65	0.59	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.

N_{total} = 69.

8.224 xMorphologie_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xMorphologie_5

Label: Morphologie_5 ratekorrigiert

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xMorphologie_5	69	0.50	0.65	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.225 xMorphologie_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xMorphologie_6

Label: Morphologie_6 ratekorrigiert

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xMorphologie_6	69	0.44	0.66	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.226 xSyntax_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSyntax_1

Label: Syntax_1 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xSyntax_1	69	0.42	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

8.227 xSyntax_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSyntax_2

Label: Syntax_2 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xSyntax_2	69	0.57	0.63	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

8.228 xSyntax_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSyntax_3

Label: Syntax_3 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xSyntax_3	69	0.52	0.65	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.

N_{total} = 69.

8.229 xSyntax_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSyntax_4

Label: Syntax_4 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xSyntax_4	69	0.15	0.65	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.

N_{total} = 69.

8.230 xSyntax_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSyntax_5

Label: Syntax_5 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xSyntax_5	69	0.32	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

8.231 xSemantik_Pragmatik_1_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSemantik_Pragmatik_1_1

Label: SprachKopf_xSemantik_Pragmatik_1_1

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xSemantik_Pragmatik_1_1	69	0.25	0.98	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.232 xSemantik_Pragmatik_1_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSemantik_Pragmatik_1_2

Label: SprachKopf_xSemantik_Pragmatik_1_2

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xSemantik_Pragmatik_1_2	69	0.13	1.00	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.233 xSemantik_Pragmatik_1_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSemantik_Pragmatik_1_3

Label: SprachKopf_xSemantik_Pragmatik_1_3

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xSemantik_Pragmatik_1_3	69	0.19	0.99	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.234 xSemantik_Pragmatik_1_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSemantik_Pragmatik_1_4

Label: SprachKopf_xSemantik_Pragmatik_1_4

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xSemantik_Pragmatik_1_4	69	0.65	0.76	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.235 xSemantik_Pragmatik_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSemantik_Pragmatik_1

Label: Semantik_Pragmatik_1 ratekorrigiert

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xSemantik_Pragmatik_1	69	0.30	0.58	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.236 xSemantik_Pragmatik_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSemantik_Pragmatik_3

Label: Semantik_Pragmatik_3 ratekorrigiert

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xSemantik_Pragmatik_3	69	0.57	0.63	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.237 xSemantik_Pragmatik_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSemantik_Pragmatik_4

Label: Semantik_Pragmatik_4 ratekorrigiert

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xSemantik_Pragmatik_4	69	0.50	0.65	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.238 xSoziolinguistik_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSoziolinguistik_2

Label: Soziolinguistik_2 ratekorrigiert

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xSoziolinguistik_2	69	0.21	0.66	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.239 xSoziolinguistik_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSoziolinguistik_3

Label: Soziolinguistik_3 ratekorrigiert

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xSoziolinguistik_3	69	0.25	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.240 xSoziolinguistik_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSoziolinguistik_4

Label: Soziolinguistik_4 ratekorrigiert

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xSoziolinguistik_4	69	0.67	0.58	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.241 xErwerb_1_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_1_1

Label: SprachKopf_xErwerb_1_1

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xErwerb_1_1	69	-0.25	0.98	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.242 xErwerb_1_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_1_2

Label: SprachKopf_xErwerb_1_2

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xErwerb_1_2	69	-0.13	1.00	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.243 xErwerb_1_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_1_3

Label: SprachKopf_xErwerb_1_3

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xErwerb_1_3	69	0.74	0.68	-1.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.

N_{total} = 69.

8.244 xErwerb_1_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_1_4

Label: SprachKopf_xErwerb_1_4

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xErwerb_1_4	69	0.13	1.00	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.245 xErwerb_1_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_1_5

Label: SprachKopf_xErwerb_1_5

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xErwerb_1_5	69	-0.54	0.85	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.246 xErwerb_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_1

Label: Erwerb_1 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xErwerb_1	69	-0.01	0.49	-1.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

8.247 xErwerb_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_2

Label: Erwerb_2 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xErwerb_2	69	-0.08	0.53	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

8.248 xErwerb_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_3

Label: Erwerb_3 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xErwerb_3	69	0.27	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

8.249 xErwerb_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_4

Label: Erwerb_4 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xErwerb_4	69	0.61	0.61	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

8.250 xErwerb_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_5

Label: Erwerb_5 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xErwerb_5	69	0.57	0.63	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

8.251 xErwerb_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_6

Label: Erwerb_6 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xErwerb_6	69	0.79	0.49	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

8.252 xErwerb_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_8

Label: Erwerb_8 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xErwerb_8	69	0.29	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

8.253 xErwerb_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_10

Label: Erwerb_10 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xErwerb_10	69	0.65	0.59	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

8.254 xErwerb_11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_11

Label: Erwerb_11 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xErwerb_11	69	0.25	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

8.255 xErwerb_13

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_13

Label: Erwerb_13 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xErwerb_13	69	-0.22	0.38	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

8.256 xErwerb_14

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_14

Label: Erwerb_14 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xErwerb_14	69	0.25	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

8.257 xErwerb_16_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_16_1

Label: SprachKopf_xErwerb_16_1

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xErwerb_16_1	69	-0.13	1.00	-1.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

8.258 xErwerb_16_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_16_2

Label: SprachKopf_xErwerb_16_2

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xErwerb_16_2	69	0.94	0.34	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.259 xErwerb_16_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_16_3

Label: SprachKopf_xErwerb_16_3

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xErwerb_16_3	69	0.42	0.91	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.260 xErwerb_16_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_16_4

Label: SprachKopf_xErwerb_16_4

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xErwerb_16_4	69	0.88	0.47	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.261 xErwerb_16_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_16_5

Label: SprachKopf_xErwerb_16_5

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xErwerb_16_5	69	0.59	0.81	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.262 xErwerb_16

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_16

Label: Erwerb_16 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xErwerb_16	69	0.54	0.34	-0.2	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

8.263 xErwerb_17

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_17

Label: Erwerb_17 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xErwerb_17	69	0.38	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

8.264 xErwerb_19

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_19

Label: Erwerb_19 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xErwerb_19	69	0.25	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

8.265 xErwerb_31

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_31

Label: Erwerb_31 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xErwerb_31	69	0.85	0.46	-0.5	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

8.266 xErwerb_24_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_24_1

Label: SprachKopf_xErwerb_24_1

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xErwerb_24_1	69	0.71	0.71	-1.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.

N_{total} = 69.

8.267 xErwerb_24_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_24_2

Label: SprachKopf_xErwerb_24_2

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xErwerb_24_2	69	0.07	1.00	-1.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

8.268 xErwerb_24_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_24_3

Label: SprachKopf_xErwerb_24_3

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xErwerb_24_3	69	0.28	0.97	-1.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

8.269 xErwerb_24_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_24_4

Label: SprachKopf_xErwerb_24_4

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xErwerb_24_4	69	0.86	0.52	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.270 xErwerb_24

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_24

Label: Erwerb_24 ratekorrigiert

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xErwerb_24	69	0.48	0.47	-0.5	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.271 xErwerb_25

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_25

Label: Erwerb_25 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xErwerb_25	69	0.38	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

8.272 xErwerb_26

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_26

Label: Erwerb_26 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xErwerb_26	69	0.21	0.66	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

8.273 xErwerb_28_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_28_1

Label: SprachKopf_xErwerb_28_1

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xErwerb_28_1	69	0.01	1.01	-1.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

8.274 xErwerb_28_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_28_2

Label: SprachKopf_xErwerb_28_2

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xErwerb_28_2	69	0.77	0.65	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.275 xErwerb_28_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_28_3

Label: SprachKopf_xErwerb_28_3

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xErwerb_28_3	69	0.42	0.91	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.276 xErwerb_28_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_28_4

Label: SprachKopf_xErwerb_28_4

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xErwerb_28_4	69	0.10	1.00	-1.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

8.277 xErwerb_28_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_28_5

Label: SprachKopf_xErwerb_28_5

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xErwerb_28_5	69	0.80	0.61	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.278 xErwerb_28_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_28_6

Label: SprachKopf_xErwerb_28_6

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xErwerb_28_6	69	0.71	0.71	-1.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

8.279 xErwerb_28

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_28

Label: Erwerb_28 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xErwerb_28	69	0.47	0.34	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

8.280 xErwerb_29

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_29

Label: Erwerb_29 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xErwerb_29	69	0.56	0.63	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

8.281 xErwerb_30

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xErwerb_30

Label: Erwerb_30 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xErwerb_30	69	0.38	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

8.282 xSprachdiagnostik_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSprachdiagnostik_1

Label: Sprachdiagnostik_1 ratekorrigiert

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xSprachdiagnostik_1	69	0.25	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.283 xSprachdiagnostik_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSprachdiagnostik_2

Label: Sprachdiagnostik_2 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xSprachdiagnostik_2	69	0.36	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

8.284 xSprachdiagnostik_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSprachdiagnostik_4

Label: Sprachdiagnostik_4 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xSprachdiagnostik_4	69	0.38	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.

N_{total} = 69.

8.285 xSprachdiagnostik_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSprachdiagnostik_5

Label: Sprachdiagnostik_5 ratekorrigiert

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xSprachdiagnostik_5	69	0.34	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.286 xSprachdiagnostik_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSprachdiagnostik_6

Label: Sprachdiagnostik_6 ratekorrigiert

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xSprachdiagnostik_6	69	0.46	0.66	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.287 xSprachdiagnostik_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSprachdiagnostik_7

Label: Sprachdiagnostik_7 ratekorrigiert

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xSprachdiagnostik_7	69	0.09	0.63	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.288 xSprachdiagnostik_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSprachdiagnostik_8

Label: Sprachdiagnostik_8 ratekorrigiert

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xSprachdiagnostik_8	69	0.21	0.66	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.289 xSprachdiagnostik_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSprachdiagnostik_10

Label: Sprachdiagnostik_10 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xSprachdiagnostik_10	69	0.71	0.55	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

8.290 xSprachdiagnostik_12

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSprachdiagnostik_12

Label: Sprachdiagnostik_12 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xSprachdiagnostik_12	69	0.71	0.55	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

8.291 xSprachdiagnostik_13

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSprachdiagnostik_13

Label: Sprachdiagnostik_13 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xSprachdiagnostik_13	69	0.73	0.54	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

8.292 xSprachdiagnostik_14_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSprachdiagnostik_14_1

Label: SprachKopf_xSprachdiagnostik_14_1

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xSprachdiagnostik_14_1	69	0.97	0.24	-1.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

8.293 xSprachdiagnostik_14_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSprachdiagnostik_14_2

Label: SprachKopf_xSprachdiagnostik_14_2

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xSprachdiagnostik_14_2	69	0.62	0.79	-1.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

8.294 xSprachdiagnostik_14_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSprachdiagnostik_14_3

Label: SprachKopf_xSprachdiagnostik_14_3

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xSprachdiagnostik_14_3	69	-0.01	1.01	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.295 xSprachdiagnostik_14_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSprachdiagnostik_14_4

Label: SprachKopf_xSprachdiagnostik_14_4

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xSprachdiagnostik_14_4	69	0.97	0.24	-1.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

8.296 xSprachdiagnostik_14_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSprachdiagnostik_14_5

Label: SprachKopf_xSprachdiagnostik_14_5

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xSprachdiagnostik_14_5	69	0.30	0.96	-1.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

8.297 xSprachdiagnostik_14_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSprachdiagnostik_14_6

Label: SprachKopf_xSprachdiagnostik_14_6

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xSprachdiagnostik_14_6	69	-0.57	0.83	-1.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

8.298 xSprachdiagnostik_14_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSprachdiagnostik_14_7

Label: SprachKopf_xSprachdiagnostik_14_7

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xSprachdiagnostik_14_7	69	0.97	0.24	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.299 xSprachdiagnostik_14_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSprachdiagnostik_14_8

Label: SprachKopf_xSprachdiagnostik_14_8

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xSprachdiagnostik_14_8	69	0.86	0.52	-1.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

8.300 xSprachdiagnostik_14

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSprachdiagnostik_14

Label: Sprachdiagnostik_14 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xSprachdiagnostik_14	69	0.51	0.31	0.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

8.301 xSprachdiagnostik_15_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSprachdiagnostik_15_1

Label: SprachKopf_xSprachdiagnostik_15_1

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xSprachdiagnostik_15_1	69	-0.25	0.98	-1.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.

N_{total} = 69.

8.302 xSprachdiagnostik_15_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSprachdiagnostik_15_2

Label: SprachKopf_xSprachdiagnostik_15_2

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xSprachdiagnostik_15_2	69	-0.65	0.76	-1.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

8.303 xSprachdiagnostik_15_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSprachdiagnostik_15_3

Label: SprachKopf_xSprachdiagnostik_15_3

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xSprachdiagnostik_15_3	69	0.07	1.00	-1.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

8.304 xSprachdiagnostik_15_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSprachdiagnostik_15_4

Label: SprachKopf_xSprachdiagnostik_15_4

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xSprachdiagnostik_15_4	69	1.00	0.00	1.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

8.305 xSprachdiagnostik_15_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSprachdiagnostik_15_5

Label: SprachKopf_xSprachdiagnostik_15_5

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xSprachdiagnostik_15_5	69	-0.16	0.99	-1.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

8.306 xSprachdiagnostik_15_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSprachdiagnostik_15_6

Label: SprachKopf_xSprachdiagnostik_15_6

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xSprachdiagnostik_15_6	69	0.36	0.94	-1.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

8.307 xSprachdiagnostik_15

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xSprachdiagnostik_15

Label: Sprachdiagnostik_15 ratekorrigiert

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xSprachdiagnostik_15	69	0.06	0.46	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

8.308 xKoennenMethSprBerPhon_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethSprBerPhon_1

Label: xKoennenMethSprBerPhon_1

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenMethSprBerPhon_1	69	-0.06	0.81	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.309 xKoennenMethSprBerPhon_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethSprBerPhon_2

Label: xKoennenMethSprBerPhon_2

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenMethSprBerPhon_2	69	0.49	0.62	-0.2	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.310 xKoennenMethSprBerPhon_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethSprBerPhon_3

Label: xKoennenMethSprBerPhon_3

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenMethSprBerPhon_3	69	0.06	0.83	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.311 xKoennenMethSprBerPhon_6_AL

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethSprBerPhon_6_AL

Label: xKoennenMethSprBerPhon_6_AL

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenMethSprBerPhon_6_AL	69	0.13	0.84	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.312 xKoennenMethSprBerPhon_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethSprBerPhon_7

Label: xKoennenMethSprBerPhon_7

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenMethSprBerPhon_7	69	0.29	0.62	-0.2	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.313 xKoennenMethSprBerPhon_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethSprBerPhon_8

Label: xKoennenMethSprBerPhon_8

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenMethSprBerPhon_8	69	0.13	0.84	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.314 xKoennenMethSprBerPhon

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethSprBerPhon

Label: xKoennenMethSprBerPhon

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xKoennenMethSprBerPhon	69	0.17	0.40	-0.5	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

8.315 xStratKomm_Team2_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xStratKomm_Team2_1

Label: SprachKopf_ xStratKomm_Team2_1

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xStratKomm_Team2_1	69	0.80	0.46	-0.2	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.316 xStratKomm_Team2_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xStratKomm_Team2_2

Label: SprachKopf_ xStratKomm_Team2_2

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xStratKomm_Team2_2	69	0.49	0.62	-0.2	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.317 xStratKomm_Team2_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xStratKomm_Team2_3

Label: SprachKopf_ xStratKomm_Team2_3

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xStratKomm_Team2_3	69	0.60	0.59	-0.2	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.318 xStratKomm_Team2_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xStratKomm_Team2_4

Label: SprachKopf_ xStratKomm_Team2_4

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xStratKomm_Team2_4	69	-0.18	0.76	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.319 xStratKomm_Team2_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xStratKomm_Team2_5

Label: SprachKopf_ xStratKomm_Team2_5

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xStratKomm_Team2_5	69	0.30	0.83	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.320 xStratKomm_Team2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xStratKomm_Team2

Label: SprachKopf_ xStratKomm_Team2

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xStratKomm_Team2	69	0.40	0.31	-0.4	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.321 xKoennenStrategieFiltr_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenStrategieFiltr_1

Label: SprachKopf_ xKoennenStrategieFiltr_1

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenStrategieFiltr_1	69	-0.48	0.88	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.322 xKoennenStrategieFiltr_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenStrategieFiltr_2

Label: SprachKopf_ xKoennenStrategieFiltr_2

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenStrategieFiltr_2	69	0.04	1.01	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.323 xKoennenStrategieFiltr_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenStrategieFiltr_3

Label: SprachKopf_ xKoennenStrategieFiltr_3

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenStrategieFiltr_3	69	0.13	1.00	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.324 xKoennenStrategieFiltr_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenStrategieFiltr_4

Label: SprachKopf_ xKoennenStrategieFiltr_4

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenStrategieFiltr_4	69	0.28	0.97	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.325 xKoennenStrategieFiltr_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenStrategieFiltr_5

Label: SprachKopf_ xKoennenStrategieFiltr_5

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenStrategieFiltr_5	69	0.83	0.57	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.326 xKoennenStrategieFiltr_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenStrategieFiltr_6

Label: SprachKopf_ xKoennenStrategieFiltr_6

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenStrategieFiltr_6	69	0.45	0.90	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.327 xKoennenStrategieFiltr_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenStrategieFiltr_7

Label: SprachKopf_ xKoennenStrategieFiltr_7

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenStrategieFiltr_7	69	0.65	0.76	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.328 xKoennenStrategieFiltr_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenStrategieFiltr_8

Label: SprachKopf_ xKoennenStrategieFiltr_8

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenStrategieFiltr_8	69	0.71	0.71	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.329 xKoennenStrategieFiltr_9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenStrategieFiltr_9

Label: SprachKopf_ xKoennenStrategieFiltr_9

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenStrategieFiltr_9	69	0.33	0.95	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.330 xKoennenStrategieFiltr_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenStrategieFiltr_10

Label: SprachKopf_ xKoennenStrategieFiltr_10

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenStrategieFiltr_10	69	0.74	0.68	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.331 xKoennenStrategieFiltr_11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenStrategieFiltr_11

Label: SprachKopf_ xKoennenStrategieFiltr_11

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenStrategieFiltr_11	69	0.71	0.71	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.332 xKoennenStrategieFiltr

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenStrategieFiltr
 Label: SprachKopf_ xKoennenStrategieFiltr
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenStrategieFiltr	68	0.40	0.26	-0.1	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.333 xKoennenStraPlanVWort

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenStraPlanVWort

Label: SprachKopf_ xKoennenStraPlanVWort

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenStraPlanVWort	69	0.00	0.51	-0.2	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.334 xKoennenMethSprBerPraep_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethSprBerPraep_1

Label: SprachKopf_ xKoennenMethSprBerPraep_1

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenMethSprBerPraep_1	69	-0.23	0.74	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.335 xKoennenMethSprBerPraep_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethSprBerPraep_2

Label: SprachKopf_ xKoennenMethSprBerPraep_2

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenMethSprBerPraep_2	69	0.42	0.63	-0.2	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.336 xKoennenMethSprBerPraep_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethSprBerPraep_3

Label: SprachKopf_ xKoennenMethSprBerPraep_3

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenMethSprBerPraep_3	69	0.61	0.71	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.337 xKoennenMethSprBerPraep_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethSprBerPraep_4

Label: SprachKopf_ xKoennenMethSprBerPraep_4

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenMethSprBerPraep_4	69	-0.06	0.81	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.338 xKoennenMethSprBerPraep_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethSprBerPraep_5

Label: SprachKopf_ xKoennenMethSprBerPraep_5

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenMethSprBerPraep_5	69	0.40	0.63	-0.2	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.339 xKoennenMethSprBerPraep_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethSprBerPraep_6

Label: SprachKopf_ xKoennenMethSprBerPraep_6

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenMethSprBerPraep_6	69	0.40	0.63	-0.2	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.340 xKoennenMethSprBerPraep_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethSprBerPraep_7

Label: SprachKopf_ xKoennenMethSprBerPraep_7

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenMethSprBerPraep_7	69	0.49	0.62	-0.2	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.341 xKoennenMethSprBerPraep_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethSprBerPraep_8

Label: SprachKopf_ xKoennenMethSprBerPraep_8

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenMethSprBerPraep_8	69	0.18	0.60	-0.2	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.342 xKoennenMethSprBerPraep

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethSprBerPraep

Label: SprachKopf_ xKoennenMethSprBerPraep

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenMethSprBerPraep	69	0.28	0.38	-0.4	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.343 xKoennenDiagnSynDaM_01

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenDiagnSynDaM_01

Label: SprachKopf_ xKoennenDiagnSynDaM_01

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenDiagnSynDaM_01	69	-0.01	0.82	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.344 xKoennenBerichtInfo_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenBerichtInfo_4

Label: SprachKopf_ xKoennenBerichtInfo_4

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenBerichtInfo_4	69	0.37	0.81	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.345 xKoennenBerichtInfo_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenBerichtInfo_5

Label: SprachKopf_ xKoennenBerichtInfo_5

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenBerichtInfo_5	69	-0.28	0.71	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.346 xKoennenBerichtInfo_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenBerichtInfo_7

Label: SprachKopf_ xKoennenBerichtInfo_7

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenBerichtInfo_7	69	0.11	0.57	-0.2	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.347 xKoennenBerichtInfo

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenBerichtInfo

Label: SprachKopf_ xKoennenBerichtInfo

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenBerichtInfo	69	0.07	0.38	-0.5	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.348 xKoennenMethodikSelek1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethodikSelek1

Label: SprachKopf_ xKoennenMethodikSelek1

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenMethodikSelek1	69	0.05	0.46	-0.2	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.349 xKoennenDiagnSynDaZ_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenDiagnSynDaZ_1

Label: SprachKopf_ xKoennenDiagnSynDaZ_1

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenDiagnSynDaZ_1	69	0.13	0.71	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.350 xStrategie_L1_L2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xStrategie_L1_L2

Label: SprachKopf_ xStrategie_L1_L2

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xStrategie_L1_L2	69	0.54	0.64	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.351 nKoennenStrategieRefl_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: nKoennenStrategieRefl_1

Label: Selbst Notizen waehrend der Sprachfoerderung machen

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
nKoennenStrategieRefl_1	69	3.88	1.32	1.0	5.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.352 nKoennenStrategieRefl_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: nKoennenStrategieRefl_2

Label: Kollegin beobachtet und berichtet danach

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
nKoennenStrategieRefl_2	69	3.01	1.29	1.0	5.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.353 nKoennenStrategieRefl_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: nKoennenStrategieRefl_3

Label: Kollegin notiert Dialoge

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
nKoennenStrategieRefl_3	69	2.99	1.12	1.0	5.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.354 nKoennenStrategieRefl_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: nKoennenStrategieRefl_4

Label: Audio/Video-Aufnahme

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
nKoennenStrategieRefl_4	69	2.28	1.07	1.0	5.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.355 nKoennenStrategieRefl_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: nKoennenStrategieRefl_5

Label: Fortbildung zu Sprachfoerderung machen

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
nKoennenStrategieRefl_5	69	2.84	1.73	1.0	5.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.356 xKoennenStrategieRefl_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenStrategieRefl_3

Label: SprachKopf_ xKoennenStrategieRefl_3

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenStrategieRefl_3	69	-0.04	0.81	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.357 xKoennenStrategieRefl_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenStrategieRefl_4

Label: SprachKopf_ xKoennenStrategieRefl_4

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenStrategieRefl_4	69	0.40	0.81	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.358 xKoennenStrategieRefl_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenStrategieRefl_5

Label: SprachKopf_ xKoennenStrategieRefl_5

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenStrategieRefl_5	69	0.06	0.83	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.359 xKoennenStrategieRefl

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenStrategieRefl

Label: SprachKopf_ xKoennenStrategieRefl

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xKoennenStrategieRefl	69	0.14	0.52	-0.7	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

8.360 KoennenStraPlanWort_S

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenStraPlanWort_S

Label: SprachKopf_ KoennenStraPlanWort_S

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
KoennenStraPlanWort_S	69	1.00	0.00	1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.361 KoennenStraPlanWort_A

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenStraPlanWort_A

Label: SprachKopf_ KoennenStraPlanWort_A

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
KoennenStraPlanWort_A	69	0.54	0.50	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.362 KoennenStraPlanWort_V

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KoennenStraPlanWort_V

Label: SprachKopf_ KoennenStraPlanWort_V

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
KoennenStraPlanWort_V	69	0.42	0.50	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.363 xKoennenStraPlanWortgruppen

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenStraPlanWortgruppen
 Label: SprachKopf_ xKoennenStraPlanWortgruppen
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenStraPlanWortgruppen	69	0.48	0.39	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.364 xKoennenDiagnPhon_01

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenDiagnPhon_01

Label: SprachKopf_ xKoennenDiagnPhon_01

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenDiagnPhon_01	69	0.23	0.69	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.365 xKoennenStraPlankeinD

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenStraPlankeinD

Label: SprachKopf_ xKoennenStraPlankeinD

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenStraPlankeinD	69	0.34	0.60	-0.2	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.366 xKoennenMethMonitReflx_1_AL

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethMonitReflx_1_AL

Label: SprachKopf_ xKoennenMethMonitReflx_1_AL

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenMethMonitReflx_1_AL	69	-0.43	1.23	-1.5	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.367 xKoennenMethMonitReflx_3_AL

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethMonitReflx_3_AL

Label: SprachKopf_ xKoennenMethMonitReflx_3_AL

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenMethMonitReflx_3_AL	69	0.10	0.68	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.368 xKoennenMethMonitReflxAL

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethMonitReflxAL
 Label: SprachKopf_ xKoennenMethMonitReflxAL
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenMethMonitReflxAL	68	-0.18	0.54	-1.1	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.369 xKoennenMethodikAnpass_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethodikAnpass_1

Label: SprachKopf_ xKoennenMethodikAnpass_1

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenMethodikAnpass_1	69	-0.41	1.25	-1.5	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.370 xKoennenMethodikAnpass_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethodikAnpass_2

Label: SprachKopf_ xKoennenMethodikAnpass_2

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenMethodikAnpass_2	69	-0.49	1.24	-1.5	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.371 xKoennenMethodikAnpass_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethodikAnpass_3

Label: SprachKopf_ xKoennenMethodikAnpass_3

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenMethodikAnpass_3	69	0.81	0.54	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.372 xKoennenMethodikAnpass_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethodikAnpass_4

Label: SprachKopf_ xKoennenMethodikAnpass_4

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenMethodikAnpass_4	69	0.44	0.79	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.373 xKoennenMethodikAnpass_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethodikAnpass_6

Label: SprachKopf_ xKoennenMethodikAnpass_6

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenMethodikAnpass_6	69	0.42	0.63	-0.2	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.374 xKoennenMethodikAnpass_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethodikAnpass_7

Label: SprachKopf_ xKoennenMethodikAnpass_7

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenMethodikAnpass_7	69	0.13	0.58	-0.2	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

8.375 xKoennenMethodikAnpass

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethodikAnpass

Label: SprachKopf_ xKoennenMethodikAnpass

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenMethodikAnpass	69	0.15	0.30	-0.6	0.8

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.376 xKoennenDiagSelektion

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenDiagSelektion

Label: SprachKopf_ xKoennenDiagSelektion

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
xKoennenDiagSelektion	69	0.48	0.17	0.0	0.9

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

8.377 xKoennenMethMoniVari_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethMoniVari_1

Label: SprachKopf_ xKoennenMethMoniVari_1

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenMethMoniVari_1	69	0.29	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.378 xKoennenMethMoniVari_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethMoniVari_2

Label: SprachKopf_ xKoennenMethMoniVari_2

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenMethMoniVari_2	69	0.42	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.379 xKoennenMethMoniVari_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethMoniVari_3

Label: SprachKopf_ xKoennenMethMoniVari_3

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenMethMoniVari_3	69	0.17	0.65	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.380 xKoennenMethMoniVari_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethMoniVari_4

Label: SprachKopf_ xKoennenMethMoniVari_4

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenMethMoniVari_4	69	0.09	0.63	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

8.381 xKoennenMethMoniVari

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: xKoennenMethMoniVari

Label: SprachKopf_ xKoennenMethMoniVari

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
xKoennenMethMoniVari	69	0.24	0.30	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9 Sprachförderung Block 2

9.1 pBearbeitungsdauer

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pBearbeitungsdauer

Label: Bearbeitungszeit in Minuten

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pBearbeitungsdauer	42	71.26	17.91	41.0	123.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

9.2 psubmitdate

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: psubmitdate

Label: submitdate

Variablentyp: Zeichenfolge

9.3 pstartdate

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pstartdate
Label: startdate
Variablentyp: Zeichenfolge

9.4 pTechnik1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pTechnik1

Label: Hatten Sie während des Tests technische Schwierigkeiten?

Kategorien: 1 = *Ja*; 2 = *Nein*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pTechnik1	42	1.36	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Ja	64.3	39.1
2	Nein	35.7	21.7
-99	missing	–	39.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 42$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.5 pTechnik2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pTechnik2

Label: Bitte beschreiben Sie die technischen Schwierigkeiten moeglichst genau.

Variablentyp: Zeichenfolge

9.6 pTechnik3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pTechnik3

Label: Bei welchen Fragen traten die technischen Schwierigkeiten auf?

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pTechnik3	69	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		82.6	82.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.7 pSprachfoerderung_1_F1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachfoerderung_1_F1

Label: [In meiner Einrichtung legen wir grossen Wert auf die Foerderung der deutschen Sprache.] Bitte kreuzen Sie fuer jede Aussage an, was am ehesten auf Sie zutrifft.

Kategorien: 1 = 1 = trifft ueberhaupt nicht zu; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5; 6 = 6 = trifft voll und ganz zu

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachfoerderung_1_F1	44	5.20	1.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 = trifft ueberhaupt nicht zu	0.0	0.0
2	2	0.0	0.0
3	3	9.1	5.8
4	4	13.6	8.7
5	5	25.0	15.9
6	6 = trifft voll und ganz zu	52.3	33.3
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.8 pSprachfoerderung_1_F2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachfoerderung_1_F2

Label: [In meinem beruflichen Alltag mache ich Sprachfoerderung.] Bitte kreuzen Sie fuer jede Aussage an, was am ehesten auf Sie zutrifft.

Kategorien: 1 = 1 = trifft ueberhaupt nicht zu; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5; 6 = 6 = trifft voll und ganz zu

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachfoerderung_1_F2	44	4.93	1.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 = trifft ueberhaupt nicht zu	0.0	0.0
2	2	2.3	1.4
3	3	9.1	5.8
4	4	11.4	7.2
5	5	47.7	30.4
6	6 = trifft voll und ganz zu	29.5	18.8
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.9 pSprachfoerderung_1_F3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachfoerderung_1_F3

Label: [Ich fuehle mich persoendlich verantwortlich fuer die sprachliche Entwicklung der Kinder in meiner Einrichtung.] Bitte kreuzen Sie fuer jede Aussage an, was am ehesten auf Sie zutrifft.

Kategorien: 1 = 1 = trifft ueberhaupt nicht zu; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5; 6 = 6 = trifft voll und ganz zu

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachfoerderung_1_F3	44	4.98	0.85

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 = trifft ueberhaupt nicht zu	0.0	0.0
2	2	0.0	0.0
3	3	6.8	4.3
4	4	15.9	10.1
5	5	50.0	31.9
6	6 = trifft voll und ganz zu	27.3	17.4
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.10 pSprachfoerderung_1_F4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachfoerderung_1_F4

Label: [Ich fuehle mich dazu in der Lage, Sprachfoerderung durchzufuehren.] Bitte kreuzen Sie fuer jede Aussage an, was am ehesten auf Sie zutrifft.

Kategorien: 1 = 1 = trifft ueberhaupt nicht zu; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5; 6 = 6 = trifft voll und ganz zu

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachfoerderung_1_F4	44	4.61	1.13

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 = trifft ueberhaupt nicht zu	0.0	0.0
2	2	4.5	2.9
3	3	13.6	8.7
4	4	20.5	13.0
5	5	38.6	24.6
6	6 = trifft voll und ganz zu	22.7	14.5
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.11 pSprachfoerderung_1_F5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachfoerderung_1_F5

Label: [Ich fuehle mich dazu in der Lage, den Sprachstand von Kindern festzustellen.]

Bitte kreuzen Sie fuer jede Aussage an, was am ehesten auf Sie zutrifft.

Kategorien: 1 = 1 = trifft ueberhaupt nicht zu; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5; 6 = 6 = trifft voll und ganz zu

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachfoerderung_1_F5	44	4.05	1.26

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 = trifft ueberhaupt nicht zu	4.5	2.9
2	2	4.5	2.9
3	3	22.7	14.5
4	4	29.5	18.8
5	5	27.3	17.4
6	6 = trifft voll und ganz zu	11.4	7.2
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.12 pSprachfoerderung_1_F6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachfoerderung_1_F6

Label: [Ich foedere lieber intuitiv und spontan als spezielle Foerdermaterialien einzusetzen.] Bitte kreuzen Sie fuer jede Aussage an, was am ehesten auf Sie zutrifft.

Kategorien: 1 = 1 = trifft ueberhaupt nicht zu; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5; 6 = 6 = trifft voll und ganz zu

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachfoerderung_1_F6	44	3.57	1.30

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 = trifft ueberhaupt nicht zu	2.3	1.4
2	2	20.5	13.0
3	3	31.8	20.3
4	4	15.9	10.1
5	5	22.7	14.5
6	6 = trifft voll und ganz zu	6.8	4.3
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.13 pSprachfoerderung_1_F7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachfoerderung_1_F7

Label: [Ich finde ganzheitliche Sprachfoerderung wichtiger als Foerderung in speziellen sprachlichen Bereichen.] Bitte kreuzen Sie fuer jede Aussage an, was am ehesten auf Sie zutrifft.

Kategorien: 1 = 1 = trifft ueberhaupt nicht zu; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5; 6 = 6 = trifft voll und ganz zu

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachfoerderung_1_F7	44	4.16	1.26

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 = trifft ueberhaupt nicht zu	0.0	0.0
2	2	9.1	5.8
3	3	25.0	15.9
4	4	25.0	15.9
5	5	22.7	14.5
6	6 = trifft voll und ganz zu	18.2	11.6
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.14 pSprachfoerderung_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachfoerderung_2

Label: Seit wann machen Sie Sprachfoerderung?

Kategorien: 1 = *seit weniger als 1 Jahr*; 2 = *seit 1-3 Jahren*; 3 = *seit 4-6 Jahren*; 4 = *seit 7-10 Jahren*; 5 = *seit 11-20 Jahren*; 6 = *seit 21-30 Jahren*; 7 = *seit mehr als 30 Jahren*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachfoerderung_2	44	3.48	1.65

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	seit weniger als 1 Jahr	11.4	7.2
2	seit 1-3 Jahren	22.7	14.5
3	seit 4-6 Jahren	15.9	10.1
4	seit 7-10 Jahren	22.7	14.5
5	seit 11-20 Jahren	15.9	10.1
6	seit 21-30 Jahren	6.8	4.3
7	seit mehr als 30 Jahren	4.5	2.9
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.15 pSprachfoerderung_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachfoerderung_3
 Label: Nutzen Sie ein bestimmtes Foerderprogramm?
 Kategorien: 1 = *Ja*; 2 = *Nein*
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachfoerderung_3	44	1.77	0.42

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Ja	22.7	14.5
2	Nein	77.3	49.3
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.16 pSprachfoerderung_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachfoerderung_4

Label: Welche(s)?

Variablentyp: Zeichenfolge

9.17 pSprachstand_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachstand_1

Label: Stellen Sie vor der Sprachförderung den Sprachstand der Kinder fest?

Kategorien: 1 = *Ja*; 2 = *Nein*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachstand_1	44	1.41	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Ja	59.1	37.7
2	Nein	40.9	26.1
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.18 pSprachstand_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachstand_2

Label: Nutzen Sie dafuer ein bestimmtes Verfahren?

Kategorien: 1 = Ja; 2 = Nein, ich beobachte die Kinder, ohne ein bestimmtes Verfahren
anzuwenden

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachstand_2	26	1.69	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Ja	30.8	11.6
2	Nein, ich beobachte die Kinder, ohne ein bestimmtes Verfahren anzuwenden	69.2	26.1
-99	missing	–	62.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 26$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.19 pPhonologie_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pPhonologie_1

Label: Stellen Sie sich das Wort Schneemann ausgesprochen vor. Wie viele Laute hat dieses Wort? (Hilfe: Sprechen Sie das Wort einmal leise und langsam fuer sich aus.)

Kategorien: 1 = 2; 2 = 6; 3 = 8; 4 = 10

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pPhonologie_1	44	1.68	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	2	31.8	20.3
2	6	68.2	43.5
3	8	0.0	0.0
4	10	0.0	0.0
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.20 pPhonologie_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pPhonologie_4

Label: Welches der Woerter in der Liste hat das gleiche Betonungsmuster wie Sofa?

Kategorien: 1 = *Gesicht*; 2 = *Skandal*; 3 = *Tapete*; 4 = *Tennis*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pPhonologie_4	44	2.73	1.23

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Gesicht	18.2	11.6
2	Skandal	36.4	23.2
3	Tapete	0.0	0.0
4	Tennis	45.5	29.0
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.21 pPhonologie_5_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pPhonologie_5_1

Label: [Der Mann will unter der Absperrung durchfahren.] Welche Bedeutung(en) hat der folgende Satz? Der Mann will die Absperrung umfahren. Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pPhonologie_5_1	44	0.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	100.0	63.8
1	Ja	0.0	0.0
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.22 pPhonologie_5_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pPhonologie_5_2

Label: [Der Mann will die Absperrung zu Fall bringen.] Welche Bedeutung(en) hat der folgende Satz? Der Mann will die Absperrung umfahren. Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewählt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pPhonologie_5_2	44	0.27	0.45

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewählt	72.7	46.4
1	Ja	27.3	17.4
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.23 pPhonologie_5_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pPhonologie_5_3

Label: [Der Mann will um die Absperrung herumfahren.] Welche Bedeutung(en) hat der folgende Satz? Der Mann will die Absperrung umfahren. Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewählt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pPhonologie_5_3	44	1.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewählt	0.0	0.0
1	Ja	100.0	63.8
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.24 pPhonologie_5_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pPhonologie_5_4

Label: [Der Mann will die Absperrung woanders hinbringen.] Welche Bedeutung(en) hat der folgende Satz? Der Mann will die Absperrung umfahren. Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pPhonologie_5_4	44	0.02	0.15

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	97.7	62.3
1	Ja	2.3	1.4
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.25 pPhonologie_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pPhonologie_7

Label: Was versteht man unter „phonologischer Bewusstheit“ im engeren Sinne?

Kategorien: 1 = *Das bewusste Zuhören und Wiedergeben-Können beim Geschichten vorlesen.*; 2 = *Das bewusste, treffsichere Ausdrucksvermögen.*; 3 = *Den bewussten Einsatz von korrekten deutschen Begriffen.*; 4 = *Den bewussten Umgang mit den kleinsten Einheiten der gesprochenen Sprache.*

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pPhonologie_7	44	3.07	1.28

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Das bewusste Zuhören und Wiedergeben-Können beim Geschichten vorlesen.	22.7	14.5
2	Das bewusste, treffsichere Ausdrucksvermögen.	9.1	5.8
3	Den bewussten Einsatz von korrekten deutschen Begriffen.	6.8	4.3
4	Den bewussten Umgang mit den kleinsten Einheiten der gesprochenen Sprache.	61.4	39.1
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.26 pLexikon_2_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pLexikon_2_1

Label: [Der] Welche Woerter im untenstehenden Satz sind Pronomen? „Der soll dem Frosch doch nichts schenken“, rief sie und schmolle. Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pLexikon_2_1	44	0.45	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	54.5	34.8
1	Ja	45.5	29.0
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.27 pLexikon_2_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pLexikon_2_2

Label: [soll] Welche Woerter im untenstehenden Satz sind Pronomen? „Der soll dem Frosch doch nichts schenken“, rief sie und schmolle. Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pLexikon_2_2	44	0.07	0.25

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	93.2	59.4
1	Ja	6.8	4.3
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.28 pLexikon_2_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pLexikon_2_3

Label: [dem] Welche Woerter im untenstehenden Satz sind Pronomen? „Der soll dem Frosch doch nichts schenken“, rief sie und schmolle. Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pLexikon_2_3	44	0.34	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	65.9	42.0
1	Ja	34.1	21.7
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.29 pLexikon_2_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pLexikon_2_4

Label: [Frosch] Welche Woerter im untenstehenden Satz sind Pronomen? „Der soll dem Frosch doch nichts schenken“, rief sie und schmolle. Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pLexikon_2_4	44	0.07	0.25

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	93.2	59.4
1	Ja	6.8	4.3
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.30 pLexikon_2_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pLexikon_2_5

Label: [doch] Welche Woerter im untenstehenden Satz sind Pronomen? „Der soll dem Frosch doch nichts schenken“, rief sie und schmolle. Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pLexikon_2_5	44	0.11	0.32

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	88.6	56.5
1	Ja	11.4	7.2
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.31 pLexikon_2_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pLexikon_2_6

Label: [nichts] Welche Woerter im untenstehenden Satz sind Pronomen? „Der soll dem Frosch doch nichts schenken“, rief sie und schmolle. Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pLexikon_2_6	44	0.09	0.29

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	90.9	58.0
1	Ja	9.1	5.8
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.32 pLexikon_2_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pLexikon_2_7

Label: [schenken] Welche Woerter im untenstehenden Satz sind Pronomen? „Der soll dem Frosch doch nichts schenken“, rief sie und schmolte. Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pLexikon_2_7	44	0.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	100.0	63.8
1	Ja	0.0	0.0
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.33 pLexikon_2_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pLexikon_2_8

Label: [rief] Welche Woerter im untenstehenden Satz sind Pronomen? „Der soll dem Frosch doch nichts schenken“, rief sie und schmolle. Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pLexikon_2_8	44	0.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	100.0	63.8
1	Ja	0.0	0.0
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.34 pLexikon_2_9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pLexikon_2_9

Label: [sie] Welche Woerter im untenstehenden Satz sind Pronomen? „Der soll dem Frosch doch nichts schenken“, rief sie und schmolte. Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pLexikon_2_9	44	0.68	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	31.8	20.3
1	Ja	68.2	43.5
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.35 pLexikon_2_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pLexikon_2_10

Label: [und] Welche Woerter im untenstehenden Satz sind Pronomen? „Der soll dem Frosch doch nichts schenken“, rief sie und schmolte. Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pLexikon_2_10	44	0.05	0.21

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	95.5	60.9
1	Ja	4.5	2.9
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.36 pLexikon_2_11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pLexikon_2_11

Label: [schmolte] Welche Woerter im untenstehenden Satz sind Pronomen? „Der soll dem Frosch doch nichts schenken“, rief sie und schmolte. Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pLexikon_2_11	44	0.02	0.15

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	97.7	62.3
1	Ja	2.3	1.4
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.37 pLexikon_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pLexikon_4

Label: Kreuzen Sie an, zu welcher Wortklasse das unterstrichene Wort in diesem Satz gehoert. Er hat eine grosse Nase.

Kategorien: 1 = *Hilfsverb*; 2 = *Modalverb*; 3 = *Vollverb*; 4 = *Partikelverb*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pLexikon_4	44	2.30	0.95

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Hilfsverb	31.8	20.3
2	Modalverb	9.1	5.8
3	Vollverb	56.8	36.2
4	Partikelverb	2.3	1.4
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.38 pLexikon_6_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pLexikon_6_1

Label: [Da bin ich aus allen Socken gefallen.] Welche der folgenden Aeusserungen wuerden Sie bei Erwachsenen fuer erwartbare Versprecher halten? Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pLexikon_6_1	44	0.64	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	36.4	23.2
1	Ja	63.6	40.6
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.39 pLexikon_6_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pLexikon_6_2

Label: [Die Luftballone will der haben.] Welche der folgenden Aeusserungen wuerden Sie bei Erwachsenen fuer erwartbare Versprecher halten? Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pLexikon_6_2	44	0.16	0.37

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	84.1	53.6
1	Ja	15.9	10.1
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.40 pLexikon_6_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pLexikon_6_3

Label: [Mit dem Zinger feigt man nicht.] Welche der folgenden Aeusserungen wuerden Sie bei Erwachsenen fuer erwartbare Versprecher halten? Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pLexikon_6_3	44	0.50	0.51

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	50.0	31.9
1	Ja	50.0	31.9
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.41 pLexikon_6_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pLexikon_6_4

Label: [Meine Junge ist gut im Fussball.] Welche der folgenden Aeusserungen wuerden Sie bei Erwachsenen fuer erwartbare Versprecher halten? Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pLexikon_6_4	44	0.41	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	59.1	37.7
1	Ja	40.9	26.1
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.42 pMorphologie_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pMorphologie_1

Label: Was bedeutet es, wenn man sagt, dass ein Verb im Deutschen finit ist?

Kategorien: 1 = *Das Verb darf nur am Ende eines Satzes stehen.*; 2 = *Das Verb enthaelt Informationen ueber Person, Numerus, Tempus.*; 3 = *Das Verb enthaelt Informationen ueber Kasus und Genus.*; 4 = *Das Verb zeigt an, dass die Handlung abgeschlossen ist.*

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pMorphologie_1	44	2.32	0.86

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Das Verb darf nur am Ende eines Satzes stehen.	11.4	7.2
2	Das Verb enthaelt Informationen ueber Person, Numerus, Tempus.	59.1	37.7
3	Das Verb enthaelt Informationen ueber Kasus und Genus.	15.9	10.1
4	Das Verb zeigt an, dass die Handlung abgeschlossen ist.	13.6	8.7
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.43 pMorphologie_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pMorphologie_4

Label: Viele Sprachen – so auch das Deutsche – haben die Möglichkeit, die wichtigsten Mitspieler neben dem Verb, das Subjekt und das Objekt, zu markieren. Diese Markierung nennt man Kasus. Für Subjekt und Objekt bedeutet dies, dass die in ihnen enthaltenen

Kategorien: 1 = *Nominativ*; 2 = *Genitiv*; 3 = *Dativ*; 4 = *Akkusativ*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pMorphologie_4	44	2.95	1.43

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Nominativ	34.1	21.7
2	Genitiv	0.0	0.0
3	Dativ	2.3	1.4
4	Akkusativ	63.6	40.6
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.44 pMorphologie_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pMorphologie_5

Label: Wählen Sie das passende Genus des Nomens Krokodile.

Kategorien: 1 = weiblich; 2 = saechlich; 3 = maennlich; 4 = unbelebt

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pMorphologie_5	44	1.89	0.72

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	weiblich	27.3	17.4
2	saechlich	61.4	39.1
3	maennlich	6.8	4.3
4	unbelebt	4.5	2.9
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.45 pMorphologie_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pMorphologie_6

Label: Sehen Sie sich bitte folgende systematische Darstellung der verschiedenen Nomenklassen an. Einige Artikelformen in den verschiedenen Kasus und Genera kommen doppelt oder sogar dreifach vor. Eine Form/ein Artikel, z.B. die erfüllt also mehrere Funktionen.

Kategorien: 1 = *maennliche*; 2 = *saechliche und belebte*; 3 = *saechliche*; 4 = *weibliche und saechliche*

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pMorphologie_6	44	1.86	1.17

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	maennliche	56.8	36.2
2	saechliche und belebte	18.2	11.6
3	saechliche	6.8	4.3
4	weibliche und saechliche	18.2	11.6
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.46 pSyntax_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSyntax_1

Label: Betrachten Sie folgende Sätze und achten Sie besonders darauf, wo die finiten Verben stehen. Die Prinzessin wollte mit ihrer goldenen Kugel spielen. Ich habe eine goldene Kugel. Die kleine Prinzessin kusste den Frosch. In welcher Position steht normalerweise

Kategorien: 1 = *die Position des Verbs ist nicht festgelegt*; 2 = *in der dritten Position*; 3 = *in der zweiten Position*; 4 = *in der letzten Position*

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSyntax_1	44	2.95	0.83

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	die Position des Verbs ist nicht festgelegt	11.4	7.2
2	in der dritten Position	2.3	1.4
3	in der zweiten Position	65.9	42.0
4	in der letzten Position	20.5	13.0
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.47 pSyntax_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSyntax_2

Label: Betrachten Sie nun folgende Nebensätze und achten Sie dabei ebenfalls auf die finiten Verben. ... weil die Prinzessin den Frosch nicht mehr mag. ... weil der Frosch und der Prinz mit der Prinzessin spielen wollen. In welcher Position steht normalerweise

Kategorien: 1 = *die Position ist nicht festgelegt*; 2 = *in der letzten Position*; 3 = *in der dritten Position*; 4 = *in der vorletzten Position*

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSyntax_2	44	2.11	0.65

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	die Position ist nicht festgelegt	6.8	4.3
2	in der letzten Position	84.1	53.6
3	in der dritten Position	0.0	0.0
4	in der vorletzten Position	9.1	5.8
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.48 pSyntax_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSyntax_3

Label: Lesen Sie sich den folgenden Satz durch und kreuzen Sie eine Option an. Mit der ungehorsamen Prinzessin schimpfte der alte Koenig am Abend beim Festmahl. Welcher der Satzteile ist das Objekt?

Kategorien: 1 = *am Abend*; 2 = *beim Festmahl*; 3 = *der alte Koenig*; 4 = *mit der ungehorsamen Prinzessin*

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSyntax_3	44	3.52	0.82

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	am Abend	2.3	1.4
2	beim Festmahl	13.6	8.7
3	der alte Koenig	13.6	8.7
4	mit der ungehorsamen Prinzessin	70.5	44.9
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.49 pSyntax_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSyntax_4

Label: Woran kann man in diesem Satz verlässlich erkennen, welches Satzglied das Subjekt oder Objekt ist? Dann warf die kleine Prinzessin den Frosch an die Wand.
Verb Subjekt Objekt

Kategorien: 1 = *Bezug auf Personen (Subjekt) oder Gegenstände (Objekt)*;
2 = *Unterschiedliches Genus*; 3 = *Stellung im Satz*; 4 = *Unterschiedliche Kasusmarkierung*

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSyntax_4	44	2.43	1.30

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Bezug auf Personen (Subjekt) oder Gegenstände (Objekt)	38.6	24.6
2	Unterschiedliches Genus	11.4	7.2
3	Stellung im Satz	18.2	11.6
4	Unterschiedliche Kasusmarkierung	31.8	20.3
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.50 pSyntax_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSyntax_5

Label: Sobald Kinder die Struktur deutscher Sätze beherrschen, beginnen sie, Sätze miteinander zu kombinieren. Welche Sätze wurden hier in welcher Reihenfolge miteinander kombiniert? Die Prinzessin wusste nicht, dass er dann zum Prinzen wird.

Kategorien: 1 = *Nebensatz und Hauptsatz*; 2 = *Hauptsatz und Nebensatz*; 3 = *Hauptsatz und Hauptsatz*; 4 = *Hauptsatz und Relativsatz*

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSyntax_5	44	2.20	0.82

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Nebensatz und Hauptsatz	11.4	7.2
2	Hauptsatz und Nebensatz	70.5	44.9
3	Hauptsatz und Hauptsatz	4.5	2.9
4	Hauptsatz und Relativsatz	13.6	8.7
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.51 pSemantik_Pragmatik_1_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSemantik_Pragmatik_1_1

Label: [Maria dachte oft an den kleinen Jungen.] Welche der folgenden Sätze sind mehrdeutig und können nur durch zusätzliche Informationen eindeutig gemacht werden? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewählt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSemantik_Pragmatik_1_1	44	0.25	0.44

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewählt	75.0	47.8
1	Ja	25.0	15.9
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.52 pSemantik_Pragmatik_1_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSemantik_Pragmatik_1_2

Label: [Picasso malte den Kardinal ohne Brille.] Welche der folgenden Sätze sind mehrdeutig und können nur durch zusätzliche Informationen eindeutig gemacht werden? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewählt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSemantik_Pragmatik_1_2	44	0.66	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewählt	34.1	21.7
1	Ja	65.9	42.0
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.53 pSemantik_Pragmatik_1_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSemantik_Pragmatik_1_3

Label: [Alte Maenner und Frauen gingen von Bord.] Welche der folgenden Saetze sind mehrdeutig und koennen nur durch zusaetzliche Informationen eindeutig gemacht werden? Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSemantik_Pragmatik_1_3	44	0.80	0.41

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	20.5	13.0
1	Ja	79.5	50.7
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.54 pSemantik_Pragmatik_1_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSemantik_Pragmatik_1_4

Label: [Tina trank gestern Tee.] Welche der folgenden Sätze sind mehrdeutig und können nur durch zusätzliche Informationen eindeutig gemacht werden? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewählt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSemantik_Pragmatik_1_4	44	0.09	0.29

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewählt	90.9	58.0
1	Ja	9.1	5.8
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.55 pSemantik_Pragmatik_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSemantik_Pragmatik_3

Label: Was unterscheidet die beiden folgenden Sätze voneinander? Der Froschkönig gab der Prinzessin widerwillig den Ring. Den Ring gab der Froschkönig der Prinzessin widerwillig.

Kategorien: 1 = *die Sätze liefern unterschiedliche Informationen*; 2 = *die gleiche Information wird unterschiedlich verpackt*; 3 = *falsche Kasusmarkierung im zweiten Satz*; 4 = *falsche Satzstellung im zweiten Satz*

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSemantik_Pragmatik_3	44	2.36	0.92

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	die Sätze liefern unterschiedliche Informationen	9.1	5.8
2	die gleiche Information wird unterschiedlich verpackt	65.9	42.0
3	falsche Kasusmarkierung im zweiten Satz	4.5	2.9
4	falsche Satzstellung im zweiten Satz	20.5	13.0
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.56 pSemantik_Pragmatik_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSemantik_Pragmatik_4

Label: Was ist am folgenden Satz auffaellig? Auch der Koenig wollte einen Froschkoenig kuessen.

Kategorien: 1 = *Der Satz vermischt Gegenwarts- und Vergangenheitsformen.*; 2 = *Er ist unverstaendlich.*; 3 = *Eine bestimmte Aussage wird als wahr vorausgesetzt.*; 4 = *Eine bestimmte Aussage wird als nicht wahr vorausgesetzt.*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSemantik_Pragmatik_4	44	2.64	0.97

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Der Satz vermischt Gegenwarts- und Vergangenheitsformen.	18.2	11.6
2	Er ist unverstaendlich.	15.9	10.1
3	Eine bestimmte Aussage wird als wahr vorausgesetzt.	50.0	31.9
4	Eine bestimmte Aussage wird als nicht wahr vorausgesetzt.	15.9	10.1
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.57 pSoziolinguistik_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSoziolinguistik_2

Label: Woran koennte es liegen, wenn ein Kind zu fremden Erwachsenen immer „du“ sagt?

Kategorien: 1 = *Das Kind ist unhoeftlich.*; 2 = *Das Kind kennt die Moeglichkeit, Hoeflichkeit auszudruecken nicht.*; 3 = *Das Kind ist zu zutraulich.*; 4 = *Das Kind kann das Genus nicht unterscheiden.*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSoziolinguistik_2	44	3.14	0.98

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Das Kind ist unhoeftlich.	0.0	0.0
2	Das Kind kennt die Moeglichkeit, Hoeflichkeit auszudruecken nicht.	40.9	26.1
3	Das Kind ist zu zutraulich.	4.5	2.9
4	Das Kind kann das Genus nicht unterscheiden.	54.5	34.8
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.58 pSoziolinguistik_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSoziolinguistik_3

Label: Ein Kind sagt immer wieder Sätze folgender Art: Wir tun immer malen. Papa tut mir ein Luftballon kaufen. Was könnte der Grund dafür sein?

Kategorien: 1 = *Das Kind kann nicht richtig zuhören.*; 2 = *Das Kind hat eine Spracherwerbsstörung.*; 3 = *Das Kind kann deutsche Verben nicht richtig verwenden.*; 4 = *Dem Kind fehlt es an anderen stilistischen Ausdrucksmitteln.*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSoziolinguistik_3	44	3.52	0.51

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Das Kind kann nicht richtig zuhören.	0.0	0.0
2	Das Kind hat eine Spracherwerbsstörung.	0.0	0.0
3	Das Kind kann deutsche Verben nicht richtig verwenden.	47.7	30.4
4	Dem Kind fehlt es an anderen stilistischen Ausdrucksmitteln.	52.3	33.3
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.59 pSoziolinguistik_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSoziolinguistik_4

Label: Ein Junge mit Migrationshintergrund in Ihrer Einrichtung spricht Sie und Ihre Kolleginnen nicht spontan an. In der Gruppe haben Sie allerdings schon gehoert, dass er seine Freunde auf Deutsch anspricht. Was koennte die Ursache fuer dieses unterschiedliche

Kategorien: 1 = *Das Kind hat aufgrund seines kulturellen Hintergrunds bestimmte Annahmen darueber, wer wen anspricht.*; 2 = *Das Kind hat aufgrund seines Migrationshintergrundes grosse Defizite im Deutschen und kann sich nicht ausdruecken.*; 3 = *Das Kind ist schlecht erzogen.*; 4 = *Das Kind hat moeglicherweise eine Spracherwerbsstoerung.*

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSoziolinguistik_4	44	1.34	0.71

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Das Kind hat aufgrund seines kulturellen Hintergrunds bestimmte Annahmen darueber, wer wen anspricht.	75.0	47.8
2	Das Kind hat aufgrund seines Migrationshintergrundes grosse Defizite im Deutschen und kann sich nicht ausdruecken.	20.5	13.0
3	Das Kind ist schlecht erzogen.	0.0	0.0
4	Das Kind hat moeglicherweise eine Spracherwerbsstoerung.	4.5	2.9

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.60 pErwerb_1_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_1_1

Label: [regelt die Form von Woertern; besteht aus Flexion und Wortbildung] Wenn man Sprache genauer untersucht, kann man 5 verschiedene Teilbereiche identifizieren, die unter den unten stehenden Fachbegriffen bekannt sind. Welche Definition beschreibt welches sp

Kategorien: 1 = *Morphologie*; 2 = *Pragmatik*; 3 = *Phonologie*; 4 = *Syntax*; 5 = *Semantik*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_1_1	44	2.82	1.79

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Morphologie	43.2	27.5
2	Pragmatik	6.8	4.3
3	Phonologie	6.8	4.3
4	Syntax	11.4	7.2
5	Semantik	31.8	20.3
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.61 pErwerb_1_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_1_2

Label: [gibt Auskunft darüber, was Sprecher in bestimmten Situationen wirklich meinen und über angemessenes Sprachverhalten] Wenn man Sprache genauer untersucht, kann man 5 verschiedene Teilbereiche identifizieren, die unter den unten stehenden Fachbegriffen b

Kategorien: 1 = *Morphologie*; 2 = *Pragmatik*; 3 = *Phonologie*; 4 = *Syntax*; 5 = *Semantik*

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_1_2	44	2.68	1.27

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Morphologie	11.4	7.2
2	Pragmatik	52.3	33.3
3	Phonologie	6.8	4.3
4	Syntax	15.9	10.1
5	Semantik	13.6	8.7
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.62 pErwerb_1_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_1_3

Label: [gibt Auskunft ueber die Lautstruktur einer Sprache sowie ueber melodische und rhythmische Eigenschaften] Wenn man Sprache genauer untersucht, kann man 5 verschiedene Teilbereiche identifizieren, die unter den unten stehenden Fachbegriffen bekannt sind. W

Kategorien: 1 = *Morphologie*; 2 = *Pragmatik*; 3 = *Phonologie*; 4 = *Syntax*; 5 = *Semantik*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_1_3	44	2.98	0.70

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Morphologie	6.8	4.3
2	Pragmatik	0.0	0.0
3	Phonologie	86.4	55.1
4	Syntax	2.3	1.4
5	Semantik	4.5	2.9
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.63 pErwerb_1_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_1_4

Label: [beschäftigt sich mit dem Satzbau; System von Regeln, die beschreiben, wie aus Grundelementen (Wörtern) wohlgeformte Sätze gebildet werden] Wenn man Sprache genauer untersucht, kann man 5 verschiedene Teilbereiche identifizieren, die unter den unten st

Kategorien: 1 = *Morphologie*; 2 = *Pragmatik*; 3 = *Phonologie*; 4 = *Syntax*; 5 = *Semantik*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_1_4	44	3.57	1.23

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Morphologie	9.1	5.8
2	Pragmatik	15.9	10.1
3	Phonologie	2.3	1.4
4	Syntax	54.5	34.8
5	Semantik	18.2	11.6
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.64 pErwerb_1_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_1_5

Label: [beschreibt/betrifft die Bedeutung sprachlicher Zeichen] Wenn man Sprache genauer untersucht, kann man 5 verschiedene Teilbereiche identifizieren, die unter den unten stehenden Fachbegriffen bekannt sind. Welche Definition beschreibt welches sprachliche T

Kategorien: 1 = *Morphologie*; 2 = *Pragmatik*; 3 = *Phonologie*; 4 = *Syntax*; 5 = *Semantik*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_1_5	44	3.05	1.71

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Morphologie	29.5	18.8
2	Pragmatik	18.2	11.6
3	Phonologie	4.5	2.9
4	Syntax	13.6	8.7
5	Semantik	34.1	21.7
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.65 pErwerb_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_2

Label: Der 3-jaehrige Bruno (Deutsch als Erstsprache) lernt jeden Tag neue Woerter. Ueber mehrere Wochen spricht er sie aber anders aus. Er sagt z.B. nane fuer Banane toffel fuer Kartoffel Welche Regelmassigkeit erkennen Sie?

Kategorien: 1 = *Das Kind laesst unbetonte Silben aus.*; 2 = *Das Kind laesst bedeutungslose Silben aus.*; 3 = *Das Kind laesst komplexe Silben aus.*; 4 = *Das Kind laesst betonte Silben aus.*

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_2	44	2.84	1.38

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Das Kind laesst unbetonte Silben aus.	31.8	20.3
2	Das Kind laesst bedeutungslose Silben aus.	6.8	4.3
3	Das Kind laesst komplexe Silben aus.	6.8	4.3
4	Das Kind laesst betonte Silben aus.	54.5	34.8
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.66 pErwerb_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_3

Label: Warum produzieren Kinder Aeusserungen wie taputt dedang, ich tann neue Turm bauen, ein danz dosse Turm mach ich?

Kategorien: 1 = *Sie koennen keine Konsonanten produzieren.*; 2 = *Sie nutzen eine Vereinfachungsstrategie.*; 3 = *Sie koennen noch nicht lesen.*; 4 = *Sie machen nach, was sie von den Eltern gehoert haben.*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_3	44	1.43	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Sie koennen keine Konsonanten produzieren.	56.8	36.2
2	Sie nutzen eine Vereinfachungsstrategie.	43.2	27.5
3	Sie koennen noch nicht lesen.	0.0	0.0
4	Sie machen nach, was sie von den Eltern gehoert haben.	0.0	0.0
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.67 pErwerb_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_4

Label: Wie erkennen Kinder im kontinuierlichen Lautstrom einzelne Bestandteile (Woerter, Silben, etc.)?

Kategorien: 1 = *Sie achten auf Akzent und Rhythmus.*; 2 = *Sie warten, bis die Woerter alleine auftauchen.*; 3 = *Sie muessen zuerst die Bedeutung lernen.*; 4 = *Sie muessen die Woerter von verschiedenen Sprechern hoeren.*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_4	44	1.80	1.02

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Sie achten auf Akzent und Rhythmus.	61.4	39.1
2	Sie warten, bis die Woerter alleine auftauchen.	0.0	0.0
3	Sie muessen zuerst die Bedeutung lernen.	36.4	23.2
4	Sie muessen die Woerter von verschiedenen Sprechern hoeren.	2.3	1.4
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.68 pErwerb_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_5

Label: Sie geben einem zweijährigen Kind, mit dem sie zuvor schon mehrmals über Baeren gesprochen haben, ein Baeren-Stofftier in die Hand und sagen: „Schau mal, so ein liebes Tier!“ Das Kind sagt: „Das nicht Tier, das ein Baer.“ Was könnte aus Spracherwerbstheorie

Kategorien: 1 = Das Kind geht davon aus, dass man mit dem Wort Baer alle Tiere bezeichnen kann.; 2 = Das Kind geht davon aus, dass jedes Objekt nur durch einen Begriff bezeichnet werden kann.; 3 = Das Kind ist nicht intelligent genug, um zu verstehen, dass Baeren auch Tiere sind.; 4 = Das Kind geht davon aus, dass Baeren keine Tiere sind.

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
pErwerb_5	44	2.00	0.75

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Das Kind geht davon aus, dass man mit dem Wort Baer alle Tiere bezeichnen kann.	18.2	11.6
2	Das Kind geht davon aus, dass jedes Objekt nur durch einen Begriff bezeichnet werden kann.	72.7	46.4
3	Das Kind ist nicht intelligent genug, um zu verstehen, dass Baeren auch Tiere sind.	0.0	0.0
4	Das Kind geht davon aus, dass Baeren keine Tiere sind.	9.1	5.8

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.69 pErwerb_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_6

Label: In welcher Reihenfolge lernen Kinder normalerweise unterschiedliche Wortarten?

Kategorien: 1 = *zuerst Nomen, dann Verben, spaeter erst Konjunktionen*; 2 = *zuerst Nomen, dann Konjunktionen, spaeter erst Verben*; 3 = *zuerst Verben, dann Nomen, spaeter erst Konjunktionen*; 4 = *zuerst Konjunktionen, dann Nomen, spaeter erst Verben*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_6	44	1.25	0.61

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	zuerst Nomen, dann Verben, spaeter erst Konjunktionen	84.1	53.6
2	zuerst Nomen, dann Konjunktionen, spaeter erst Verben	6.8	4.3
3	zuerst Verben, dann Nomen, spaeter erst Konjunktionen	9.1	5.8
4	zuerst Konjunktionen, dann Nomen, spaeter erst Verben	0.0	0.0
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.70 pErwerb_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_8

Label: Ein einsprachiges Kind produziert weniger als 50 Woerter wie Ball oder Mama.
Ab welchem Alter machen Sie sich zum ersten Mal Sorgen und ueberlegen, ob
das Kind moeglicherweise eine Sprachentwicklungsstoerung hat?

Kategorien: 1 = ...wenn das Kind 2 Jahre alt ist.; 2 = ...wenn das Kind 1,5 Jahre alt ist.;
3 = ...wenn das Kind 3 Jahre alt ist.; 4 = ...wenn das Kind 1 Jahr alt ist.

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_8	44	1.73	0.90

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	...wenn das Kind 2 Jahre alt ist.	56.8	36.2
2	...wenn das Kind 1,5 Jahre alt ist.	13.6	8.7
3	...wenn das Kind 3 Jahre alt ist.	29.5	18.8
4	...wenn das Kind 1 Jahr alt ist.	0.0	0.0
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.71 pErwerb_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_10

Label: Ein Kind verwendet ueber einen Zeitraum von 4 Monaten die korrekte Pluralform von Bruder. Ploetzlich sagt es immer „Brudern“, wenn es mehr als einen Bruder meint. Das hat es vorher nie gemacht. Was nehmen Sie in diesem Fall an?

Kategorien: 1 = *Das Kind hat begonnen eine weitere Sprache zu erwerben.*; 2 = *Das Kind durchlauft den normalen Erwerbsprozess.*; 3 = *Das Kind hat vergessen, wie man Pluralformen bildet.*; 4 = *Das Kind hat eine Sprachstoerung im Bereich Phonologie.*

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_10	44	2.02	0.51

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Das Kind hat begonnen eine weitere Sprache zu erwerben.	9.1	5.8
2	Das Kind durchlauft den normalen Erwerbsprozess.	81.8	52.2
3	Das Kind hat vergessen, wie man Pluralformen bildet.	6.8	4.3
4	Das Kind hat eine Sprachstoerung im Bereich Phonologie.	2.3	1.4
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.72 pErwerb_11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_11

Label: Angenommen Sie hoeren, wie ein Kind folgenden Satz produziert: Die willt nach Hause. Was faellt Ihnen am Verb auf?

Kategorien: 1 = *Die Verbendung ist willkuerlich gewaehlt.*; 2 = *Das Verb ist nicht flektiert.*; 3 = *Das Verb ist von der Bedeutung her nicht angemessen.*; 4 = *Die Verbendung ist uebergeneralisiert.*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_11	44	2.91	1.22

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Die Verbendung ist willkuerlich gewaehlt.	15.9	10.1
2	Das Verb ist nicht flektiert.	29.5	18.8
3	Das Verb ist von der Bedeutung her nicht angemessen.	2.3	1.4
4	Die Verbendung ist uebergeneralisiert.	52.3	33.3
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.73 pErwerb_13

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_13

Label: Ein 5-jähriges Kind hat seit zwei Jahren intensiven Kontakt zur deutschen Sprache. Folgende Äußerung zeigt einen typischen Hauptsatz dieses Kindes. Was ist vermutlich der Grund für die Abweichung in dieser Äußerung? Frage eines Erwachsenen: Was hast

Kategorien: 1 = *Das Kind hat eine Sprachstörung.*; 2 = *Das ist ein Versprecher.*; 3 = *Das Kind stottert.*; 4 = *Das liegt an der Mehrsprachigkeit.*

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_13	44	3.70	0.85

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Das Kind hat eine Sprachstörung.	6.8	4.3
2	Das ist ein Versprecher.	4.5	2.9
3	Das Kind stottert.	0.0	0.0
4	Das liegt an der Mehrsprachigkeit.	88.6	56.5
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.74 pErwerb_14

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_14

Label: Einfache Hauptsätze wie Da mal ich jetzt ne Blume, Der schläft hier im Bett
beobachtet man bei Kindern mit Deutsch als Erstsprache normalerweise ab...Kategorien: 1 = 37-42 Monaten (3;1 bis 3;6 Jahre); 2 = 43-48 Monaten (3;7 bis 4;0 Jahre);
3 = 24-36 Monaten (2;0 bis 3;0 Jahre); 4 = 18-23 Monaten (1;6 bis 1;11 Jahre)

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_14	44	2.61	0.99

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	37-42 Monaten (3;1 bis 3;6 Jahre)	22.7	14.5
2	43-48 Monaten (3;7 bis 4;0 Jahre)	6.8	4.3
3	24-36 Monaten (2;0 bis 3;0 Jahre)	56.8	36.2
4	18-23 Monaten (1;6 bis 1;11 Jahre)	13.6	8.7
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.75 pErwerb_16_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_16_1

Label: [baum abgegang] Stellen Sie sich vor, Sie haben sich von einem Kind folgende Äußerungen notiert: da mama reingehn puppe apfel wauwau nicht apfel Welche der folgenden Äußerungen wurden Sie noch erwarten? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten

Kategorien: 0 = *Nicht Gewählt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_16_1	44	0.55	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewählt	45.5	29.0
1	Ja	54.5	34.8
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.76 pErwerb_16_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_16_2

Label: [weil mama apfel essen will] Stellen Sie sich vor, Sie haben sich von einem Kind folgende Aeusserungen notiert: da mama reingehn puppe apfel wauwau nicht apfel Welche der folgenden Aeusserungen wuerden Sie noch erwarten? Bitte waehlen Sie alle zutreffen

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_16_2	44	0.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	100.0	63.8
1	Ja	0.0	0.0
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.77 pErwerb_16_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_16_3

Label: [das auch apfel isst] Stellen Sie sich vor, Sie haben sich von einem Kind folgende Äußerungen notiert: da mama reingehn puppe apfel wauwau nicht apfel Welche der folgenden Äußerungen wurden Sie noch erwarten? Bitte wählen Sie alle zutreffenden An

Kategorien: 0 = *Nicht Gewählt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_16_3	44	0.20	0.41

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewählt	79.5	50.7
1	Ja	20.5	13.0
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.78 pErwerb_16_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_16_4

Label: [mama will nicht apfel essen] Stellen Sie sich vor, Sie haben sich von einem Kind folgende Aeusserungen notiert: da mama reingehn puppe apfel wauwau nicht apfel Welche der folgenden Aeusserungen wuerden Sie noch erwarten? Bitte waehlen Sie alle zutreffe

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_16_4	44	0.05	0.21

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	95.5	60.9
1	Ja	4.5	2.9
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.79 pErwerb_16_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_16_5

Label: [mama auch apfel] Stellen Sie sich vor, Sie haben sich von einem Kind folgende Äusserungen notiert: da mama reingehn puppe apfel wauwau nicht apfel Welche der folgenden Äusserungen wurden Sie noch erwarten? Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antwo

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_16_5	44	0.91	0.29

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	9.1	5.8
1	Ja	90.9	58.0
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.80 pErwerb_17

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_17

Label: Ein Erwachsener schaut sich gemeinsam mit einem Kind ein Bild an, auf dem zwei Kinder versuchen, eine kippende Lampe festzuhalten. Der Erwachsene stellt dem Kind die Frage: „Warum halten die Kinder die Lampe fest?“ Das Kind antwortet: „nnnn das sonst

Kategorien: 1 = *Das Kind hat die Wortstellung von Nebensaetzen noch nicht gelernt.*; 2 = *Das Kind weiss noch nicht, wie Verben korrekt flektiert werden.*; 3 = *Das Kind hat die Wortstellung von Hauptsatzen noch nicht gelernt.*; 4 = *Das Kind hat noch nicht die korrekte Konjunktion in seinem Wortschatz.*

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
pErwerb_17	44	2.84	1.29

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Das Kind hat die Wortstellung von Nebensaetzen noch nicht gelernt.	27.3	17.4
2	Das Kind weiss noch nicht, wie Verben korrekt flektiert werden.	9.1	5.8
3	Das Kind hat die Wortstellung von Hauptsatzen noch nicht gelernt.	15.9	10.1
4	Das Kind hat noch nicht die korrekte Konjunktion in seinem Wortschatz.	47.7	30.4

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.81 pErwerb_19

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_19

Label: Sie sehen sich mit einem etwa 15 Monate alten Kind zusammen ein Bilderbuch an, in dem verschiedene Tiere abgebildet sind. Das Kind deutet auf einen Hund und sagt: „WauWau“. Auf dem naechsten Bild ist eine Kuh zu sehen und das Kind deutet darauf und sag

Kategorien: 1 = *Verwendung eines Synonyms*; 2 = *Verwendung eines Oberbegriffs*;
3 = *Untergeneralisierung eines Begriffs*; 4 = *Uebergeneralisierung eines Begriffs*

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_19	44	2.59	1.19

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Verwendung eines Synonyms	18.2	11.6
2	Verwendung eines Oberbegriffs	43.2	27.5
3	Untergeneralisierung eines Begriffs	0.0	0.0
4	Uebergeneralisierung eines Begriffs	38.6	24.6
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.82 pErwerb_31

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_31

Label: Vergleichen Sie die folgenden Sätze. Welchen verstehen 3-jährige Kinder in der Regel besser? a) Die Fliege frisst der Frosch. b) Der Frosch frisst die Fliege

Kategorien: 1 = a); 2 = a) und b) gleich gut; 3 = b)

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_31	44	2.91	0.36

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	a)	2.3	1.4
2	a) und b) gleich gut	4.5	2.9
3	b)	93.2	59.4
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.83 pErwerb_24_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_24_1

Label: [Julia sieht, dass es gleich regnen wird.] Welche der untenstehenden Äußerungen eines Kindes zeigen, dass es andere Menschen als mentale Wesen auffasst, die Wünsche, Emotionen, etc. haben? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewählt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_24_1	44	0.05	0.21

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewählt	95.5	60.9
1	Ja	4.5	2.9
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.84 pErwerb_24_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_24_2

Label: [Papa glaubt, dass Mama seinen Fussball im Keller versteckt hat.] Welche der untenstehenden Aeusserungen eines Kindes zeigen, dass es andere Menschen als mentale Wesen auffasst, die Wuensche, Emotionen, etc. haben? Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antw

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_24_2	44	0.52	0.51

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	47.7	30.4
1	Ja	52.3	33.3
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.85 pErwerb_24_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_24_3

Label: [Tom klettert so hoch, dass ihn keiner mehr sieht.] Welche der untenstehenden Äußerungen eines Kindes zeigen, dass es andere Menschen als mentale Wesen auffasst, die Wünsche, Emotionen, etc. haben? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewählt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_24_3	44	0.32	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewählt	68.2	43.5
1	Ja	31.8	20.3
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.86 pErwerb_24_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_24_4

Label: [Mama weiss, dass alle Kinder Eis moegen.] Welche der untenstehenden Aeusserungen eines Kindes zeigen, dass es andere Menschen als mentale Wesen auffasst, die Wuensche, Emotionen, etc. haben? Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_24_4	44	0.93	0.25

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	6.8	4.3
1	Ja	93.2	59.4
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.87 pErwerb_25

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_25

Label: Die Bedeutung welches Verbs erwerben Kinder eher spaet?

Kategorien: 1 = *sagen*; 2 = *denken*; 3 = *wissen*; 4 = *kochen*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_25	44	2.57	0.62

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	sagen	0.0	0.0
2	denken	50.0	31.9
3	wissen	43.2	27.5
4	kochen	6.8	4.3
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.88 pErwerb_26

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_26

Label: Was bedeutet es, wenn jemand eine Sprache als fruehe Zweitsprache erworben hat?

Kategorien: 1 = Die Person wuchs von Geburt an mit zwei Sprachen auf.; 2 = Die Person kam ab ca. 13 Jahren mit einer zweiten Sprache in Kontakt.; 3 = Die Person hat auch eine dritte Sprache erworben.; 4 = Die Person hat ihre Erstsprache schon seit 2 bis 4 Jahren erworben und dann kam eine zweite Sprache hinzu.

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_26	44	2.43	1.52

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Die Person wuchs von Geburt an mit zwei Sprachen auf.	52.3	33.3
2	Die Person kam ab ca. 13 Jahren mit einer zweiten Sprache in Kontakt.	0.0	0.0
3	Die Person hat auch eine dritte Sprache erworben.	0.0	0.0
4	Die Person hat ihre Erstsprache schon seit 2 bis 4 Jahren erworben und dann kam eine zweite Sprache hinzu.	47.7	30.4
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.89 pErwerb_28_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_28_1

Label: [...haben eher einen kleineren Wortschatz in einer Sprache als einsprachig aufwachsende Kinder.] Kinder, die mit zwei Sprachen aufwachsen... Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_28_1	44	0.50	0.51

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	50.0	31.9
1	Ja	50.0	31.9
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.90 pErwerb_28_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_28_2

Label: [...koennen keine ihrer Sprachen richtig.] Kinder, die mit zwei Sprachen aufwachsen... Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_28_2	44	0.05	0.21

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	95.5	60.9
1	Ja	4.5	2.9
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.91 pErwerb_28_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_28_3

Label: [...sprechen langsamer als einsprachig aufwachsende Kinder.] Kinder, die mit zwei Sprachen aufwachsen... Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_28_3	44	0.20	0.41

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	79.5	50.7
1	Ja	20.5	13.0
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.92 pErwerb_28_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_28_4

Label: [...haben bei der Loesung von Problemen, die Aufmerksamkeit und Konzentration erfordern, Vorteile gegenueber einsprachig aufwachsenden Kindern.] Kinder, die mit zwei Sprachen aufwachsen... Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_28_4	44	0.61	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	38.6	24.6
1	Ja	61.4	39.1
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.93 pErwerb_28_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_28_5

Label: [...sind intelligenter als einsprachig aufwachsende Kinder.] Kinder, die mit zwei Sprachen aufwachsen... Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_28_5	44	0.11	0.32

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	88.6	56.5
1	Ja	11.4	7.2
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.94 pErwerb_28_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_28_6

Label: [...koennen ihre Sprachen nicht auseinanderhalten.] Kinder, die mit zwei Sprachen aufwachsen... Bitte waehlen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_28_6	44	0.07	0.25

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	93.2	59.4
1	Ja	6.8	4.3
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.95 pErwerb_29

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_29

Label: Sind manche Sprachen idealere Erstsprachen als andere? Ist es z.B. der Fall, dass ein Kind, das Chinesisch als Muttersprache erwirbt, es schwerer hat die Sprache zu erwerben als ein Kind, das Deutsch als Muttersprache erwirbt?

Kategorien: 1 = *nein, der Spracherwerb ist abhaengig von der Intelligenz des Kindes.*;
2 = *nein, jede Sprache kann gleich gut erworben werden.*; 3 = *nein, der Spracherwerb ist abhaengig von der Begabung, Sprachen zu erwerben.*; 4 = *ja, manche Sprachen sind schwerer zu erwerben.*

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_29	44	2.43	0.76

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	nein, der Spracherwerb ist abhaengig von der Intelligenz des Kindes.	2.3	1.4
2	nein, jede Sprache kann gleich gut erworben werden.	65.9	42.0
3	nein, der Spracherwerb ist abhaengig von der Begabung, Sprachen zu erwerben.	18.2	11.6
4	ja, manche Sprachen sind schwerer zu erwerben.	13.6	8.7
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.96 pErwerb_30

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pErwerb_30

Label: Welcher der folgenden Punkte ist aus biologischer Sicht keine Voraussetzung fuer den Erwerb der gesprochenen Sprache?

Kategorien: 1 = *funktionierende Atemorgane*; 2 = *normale Intelligenz*; 3 = *funktionierende Hoerorgane*; 4 = *funktionierendes Gehirn*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pErwerb_30	44	1.64	0.61

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	funktionierende Atemorgane	40.9	26.1
2	normale Intelligenz	56.8	36.2
3	funktionierende Hoerorgane	0.0	0.0
4	funktionierendes Gehirn	2.3	1.4
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.97 pSprachdiagnostik_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachdiagnostik_1

Label: Sie haben fuer Ihre Einrichtung ein standardisiertes Verfahren zur Sprachstandsbestimmung angeschafft. Im Handbuch steht zu jeder Aufgabe wie sie durchzufuehren und auszuwerten ist. Kreuzen Sie die zutreffende Aussage an.

Kategorien: 1 = *Die Anweisungen im Handbuch dienen lediglich als Hilfestellung, wenn einem selbst nicht einfaellt, wie man dem Kind eine*; 2 = *Man sollte sich anfangs an diese Vorgaben halten. Wenn man das Verfahren einige Male durchgefuehrt hat, kann man selbst*; 3 = *Das sind Beispiele an denen man sich orientieren kann, aber nicht muss.*; 4 = *Das sind strenge Vorgaben, die man moeglichst genau befolgen sollte.*

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachdiagnostik_1	44	3.27	0.95

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Die Anweisungen im Handbuch dienen lediglich als Hilfestellung, wenn einem selbst nicht einfaellt, wie man dem Kind eine	2.3	1.4
2	Man sollte sich anfangs an diese Vorgaben halten. Wenn man das Verfahren einige Male durchgefuehrt hat, kann man selbst	27.3	17.4
3	Das sind Beispiele an denen man sich orientieren kann, aber nicht muss.	11.4	7.2
4	Das sind strenge Vorgaben, die man moeglichst genau befolgen sollte.	59.1	37.7

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.98 pSprachdiagnostik_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachdiagnostik_2

Label: Wenn Sie bei einem Kind mit Deutsch als Zweitsprache den Sprachstand im Deutschen feststellen wollen, welches Kriterium muessen Sie bei der Auswahl des Verfahrens besonders beachten?

Kategorien: 1 = *Der Test sollte auch Uebersetzungen in der Erstsprache des Kindes enthalten.*; 2 = *Die Vergleichswerte sollten mit Daten von Kindern mit Deutsch als Erstsprache errechnet worden sein (normiert worden sei*; 3 = *Besonders der Bereich Wortschatz sollte abgedeckt sein.*; 4 = *Die Vergleichswerte sollten mit Daten von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache errechnet worden sein (normiert worden se*

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachdiagnostik_2	44	3.50	0.82

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Der Test sollte auch Uebersetzungen in der Erstsprache des Kindes enthalten.	2.3	1.4
2	Die Vergleichswerte sollten mit Daten von Kindern mit Deutsch als Erstsprache errechnet worden sein (normiert worden sei	13.6	8.7
3	Besonders der Bereich Wortschatz sollte abgedeckt sein.	15.9	10.1
4	Die Vergleichswerte sollten mit Daten von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache errechnet worden sein (normiert worden se	68.2	43.5

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.99 pSprachdiagnostik_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachdiagnostik_4

Label: Sie und eine Kollegin ueberpruefen unabhaengig voneinander zum selben Zeitpunkt ein Kind mit demselben standardisierten Verfahren. Sie erhalten sehr unterschiedliche Ergebnisse. Welche der Aussagen trifft zu?

Kategorien: 1 = *Das kann schon mal vorkommen. Jeder hat ja eine andere Art das Verfahren durchzufuehren.*; 2 = *Das ist weniger gut, ein standardisiertes Verfahren sollte, auch wenn es von verschiedenen Personen durchgefuehrt wurde.*; 3 = *Das ist positiv, denn so koennen verschiedene Staerken des Kindes und unterschiedliche Sichtweisen auf das Kind im Team*; 4 = *Das ist grundsaeztlich so, denn Kinder haben nicht immer zu allen Personen die gleiche Beziehung.*

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachdiagnostik_4	44	2.34	0.81

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Das kann schon mal vorkommen. Jeder hat ja eine andere Art das Verfahren durchzufuehren.	6.8	4.3
2	Das ist weniger gut, ein standardisiertes Verfahren sollte, auch wenn es von verschiedenen Personen durchgefuehrt wurde,	65.9	42.0
3	Das ist positiv, denn so koennen verschiedene Staerken des Kindes und unterschiedliche Sichtweisen auf das Kind im Team	13.6	8.7
4	Das ist grundsaeztlich so, denn Kinder haben nicht immer zu allen Personen die gleiche Beziehung.	13.6	8.7

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.100 pSprachdiagnostik_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachdiagnostik_5

Label: Wenn Sie mithilfe eines Sprachstandserhebungsverfahrens die Kompetenzen eines Kindes im Bereich Satzverständnis erheben möchten, was muss das Kind dann leisten?

Kategorien: 1 = *Das Kind muss Sätze produzieren können.*; 2 = *Das Kind muss Sätze umformulieren können.*; 3 = *Das Kind muss angemessen auf Sätze reagieren können.*; 4 = *Das Kind muss Sätze erklären können.*

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachdiagnostik_5	44	2.32	1.14

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Das Kind muss Sätze produzieren können.	38.6	24.6
2	Das Kind muss Sätze umformulieren können.	4.5	2.9
3	Das Kind muss angemessen auf Sätze reagieren können.	43.2	27.5
4	Das Kind muss Sätze erklären können.	13.6	8.7
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.101 pSprachdiagnostik_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachdiagnostik_6

Label: Angenommen Sie versuchen mithilfe eines Sprachstandsverfahrens ein Kind dazu zu animieren, Hauptsätze zu produzieren. Wann kann man sagen, hat ein Kind die Satzstellung in Hauptsätzen erworben?

Kategorien: 1 = Wenn mindestens ein Hauptsatz die korrekte Satzstellung aufweist.; 2 = Wenn 100 % der Hauptsätze die korrekte Satzstellung aufweisen.; 3 = Wenn 90 % der Hauptsätze die korrekte Satzstellung aufweisen.; 4 = Wenn 50 % der Hauptsätze die korrekte Satzstellung aufweisen.

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachdiagnostik_6	44	3.23	0.71

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Wenn mindestens ein Hauptsatz die korrekte Satzstellung aufweist.	4.5	2.9
2	Wenn 100 % der Hauptsätze die korrekte Satzstellung aufweisen.	2.3	1.4
3	Wenn 90 % der Hauptsätze die korrekte Satzstellung aufweisen.	59.1	37.7
4	Wenn 50 % der Hauptsätze die korrekte Satzstellung aufweisen.	34.1	21.7
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.102 pSprachdiagnostik_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachdiagnostik_7

Label: In einem Beobachtungsinstrument sollen Sie angeben, ob das Verb im Hauptsatz an der richtigen Stelle steht, z.B. Der macht immer so, Ich habe Durst, Ich muss (auf die) Toilette. Stellen Sie sich vor, Sie haben sich nach einer Bilderbuchbetrachtung folgend

Kategorien: 1 = *Im Hauptsatz steht das Verb nie an der richtigen Stelle.*; 2 = *Im Hauptsatz steht das Verb selten an der richtigen Stelle.*; 3 = *Im Hauptsatz steht das Verb manchmal an der richtigen Stelle.*; 4 = *Im Hauptsatz steht das Verb haeufig an der richtigen Stelle.*

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachdiagnostik_7	43	3.49	0.77

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Im Hauptsatz steht das Verb nie an der richtigen Stelle.	2.3	1.4
2	Im Hauptsatz steht das Verb selten an der richtigen Stelle.	9.3	5.8
3	Im Hauptsatz steht das Verb manchmal an der richtigen Stelle.	25.6	15.9
4	Im Hauptsatz steht das Verb haeufig an der richtigen Stelle.	62.8	39.1

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.103 pSprachdiagnostik_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachdiagnostik_8

Label: In einem Beobachtungsinstrument sollen Sie angeben, ob das Verb im Hauptsatz an der richtigen Stelle steht, z.B. Der macht immer so, Ich habe Durst, Ich muss (auf die) Toilette. Stellen Sie sich vor, Sie haben sich nach einer Bilderbuchbetrachtung folgend

Kategorien: 1 = *Es duerfen nur die Aeusserungen in die Auswertung einbezogen werden, die den Inhalt korrekt wiedergeben.*; 2 = *Es muessen alle Aeusserungen in die Auswertung einbezogen werden, die Hauptsatze sind.*; 3 = *Es muessen alle Aeusserungen in die Auswertung einbezogen werden.*; 4 = *Es duerfen nur die fehlerfreien Aeusserungen in die Auswertung einbezogen werden.*

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachdiagnostik_8	43	2.47	0.55

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Es duerfen nur die Aeusserungen in die Auswertung einbezogen werden, die den Inhalt korrekt wiedergeben.	2.3	1.4
2	Es muessen alle Aeusserungen in die Auswertung einbezogen werden, die Hauptsatze sind.	48.8	30.4
3	Es muessen alle Aeusserungen in die Auswertung einbezogen werden.	48.8	30.4
4	Es duerfen nur die fehlerfreien Aeusserungen in die Auswertung einbezogen werden.	0.0	0.0

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.104 pSprachdiagnostik_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachdiagnostik_10

Label: Welche Wortart ist am aufschlussreichsten, wenn Sie die Wortstellung in Kinderaeusserungen genauer anschauen und analysieren wollen?

Kategorien: 1 = *Verben*; 2 = *Artikel*; 3 = *Adjektive*; 4 = *Nomen*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachdiagnostik_10	43	1.23	0.78

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Verben	90.7	56.5
2	Artikel	2.3	1.4
3	Adjektive	0.0	0.0
4	Nomen	7.0	4.3
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.105 pSprachdiagnostik_12

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachdiagnostik_12

Label: In einem Foerderprogramm muss ein Kind herausfinden, welches Wort in einer Dreierreihe in dem Sinne 'anders' ist, dass es sich mit den anderen Woertern nicht reimt. Es bekommt jeweils drei Bilder gezeigt, die es benennen soll und dann das Bild aussortieren

Kategorien: 1 = *Bewusstheit ueber die Lautstruktur von Woertern*; 2 = *Unterscheidung von ein- und zweisilbigen Woertern*; 3 = *Ueben von komplexen Konsonantenkombinationen*; 4 = *Erschliessen von Wortfeldern*

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachdiagnostik_12	43	1.72	1.26

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Bewusstheit ueber die Lautstruktur von Woertern	74.4	46.4
2	Unterscheidung von ein- und zweisilbigen Woertern	0.0	0.0
3	Ueben von komplexen Konsonantenkombinationen	4.7	2.9
4	Erschliessen von Wortfeldern	20.9	13.0
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.106 pSprachdiagnostik_13

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachdiagnostik_13

Label: In einem Foerderprogramm sitzen die Foederkraft und die Kinder vor einem Bild von einem Haus, in dem viele verschiedene Tiere (in Form von Bildkaertchen) sind. Die Foederkraft erlaert, dass die Tiere muede sind und manche jetzt nach Hause gehen muessen,

Kategorien: 1 = *Hauptsatze mit Adjektiven*; 2 = *Subjekt-Verb-Kongruenz*; 3 = *prosodische Struktur deutscher Saetze*; 4 = *Hauptsatze und Nebensaetze*

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachdiagnostik_13	43	2.14	0.68

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Hauptsatze mit Adjektiven	7.0	4.3
2	Subjekt-Verb-Kongruenz	81.4	50.7
3	prosodische Struktur deutscher Saetze	2.3	1.4
4	Hauptsatze und Nebensaetze	9.3	5.8
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.107 pSprachdiagnostik_14_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachdiagnostik_14_1

Label: [Willst du Milch oder Kakao?] Welche zwei Fragen regen Kinder aufgrund ihrer Struktur besonders dazu an, viel zu sprechen?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachdiagnostik_14_1	44	0.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	100.0	63.8
1	Ja	0.0	0.0
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.108 pSprachdiagnostik_14_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachdiagnostik_14_2

Label: [Wie ist das denn passiert?] Welche zwei Fragen regen Kinder aufgrund ihrer Struktur besonders dazu an, viel zu sprechen?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachdiagnostik_14_2	44	0.80	0.41

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	20.5	13.0
1	Ja	79.5	50.7
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.109 pSprachdiagnostik_14_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachdiagnostik_14_3

Label: [Was macht denn das Kind da?] Welche zwei Fragen regen Kinder aufgrund ihrer Struktur besonders dazu an, viel zu sprechen?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachdiagnostik_14_3	44	0.41	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	59.1	37.7
1	Ja	40.9	26.1
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.110 pSprachdiagnostik_14_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachdiagnostik_14_4

Label: [Hast du dir schon die Zähne geputzt?] Welche zwei Fragen regen Kinder aufgrund ihrer Struktur besonders dazu an, viel zu sprechen?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewählt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachdiagnostik_14_4	44	0.02	0.15

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewählt	97.7	62.3
1	Ja	2.3	1.4
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.111 pSprachdiagnostik_14_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachdiagnostik_14_5

Label: [Wen hast du denn da mitgebracht?] Welche zwei Fragen regen Kinder aufgrund ihrer Struktur besonders dazu an, viel zu sprechen?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachdiagnostik_14_5	44	0.18	0.39

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	81.8	52.2
1	Ja	18.2	11.6
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.112 pSprachdiagnostik_14_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachdiagnostik_14_6

Label: [Warum willst du nicht in den Hof?] Welche zwei Fragen regen Kinder aufgrund ihrer Struktur besonders dazu an, viel zu sprechen?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachdiagnostik_14_6	44	0.39	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	61.4	39.1
1	Ja	38.6	24.6
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.113 pSprachdiagnostik_14_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachdiagnostik_14_7

Label: [Wo ist denn die rote Schere?] Welche zwei Fragen regen Kinder aufgrund ihrer Struktur besonders dazu an, viel zu sprechen?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachdiagnostik_14_7	44	0.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	100.0	63.8
1	Ja	0.0	0.0
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.114 pSprachdiagnostik_14_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachdiagnostik_14_8

Label: [Was hast du denn gestern gegessen?] Welche zwei Fragen regen Kinder aufgrund ihrer Struktur besonders dazu an, viel zu sprechen?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachdiagnostik_14_8	44	0.16	0.37

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	84.1	53.6
1	Ja	15.9	10.1
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.115 pSprachdiagnostik_15_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachdiagnostik_15_1

Label: [Es sollte von der Satzstruktur her moeglichst einfach sein.] Wie sollte das sprachliche Angebot beschaffen sein, damit es dem Kind moeglichst hilfreichen Input bezueglich der Struktur der Zielsprache liefert?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachdiagnostik_15_1	44	0.41	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	59.1	37.7
1	Ja	40.9	26.1
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.116 pSprachdiagnostik_15_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachdiagnostik_15_2
 Label: [Es sollte viele unterschiedliche Satzstrukturen enthalten.] Wie sollte das sprachliche Angebot beschaffen sein, damit es dem Kind moeglichst hilfreichen Input bezueglich der Struktur der Zielsprache liefert?
 Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachdiagnostik_15_2	44	0.39	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	61.4	39.1
1	Ja	38.6	24.6
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.117 pSprachdiagnostik_15_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachdiagnostik_15_3

Label: [Es sollte hauptsaechlich Woerter beinhalten, die das Kind schon kennt.] Wie sollte das sprachliche Angebot beschaffen sein, damit es dem Kind moeglichst hilfreichen Input bezueglich der Struktur der Zielsprache liefert?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachdiagnostik_15_3	44	0.23	0.42

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	77.3	49.3
1	Ja	22.7	14.5
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.118 pSprachdiagnostik_15_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachdiagnostik_15_4

Label: [Es sollte keine komplexen Lautverbindungen (z.B. Strumpf) enthalten.] Wie sollte das sprachliche Angebot beschaffen sein, damit es dem Kind moeglichst hilfreichen Input bezueglich der Struktur der Zielsprache liefert?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachdiagnostik_15_4	44	0.07	0.25

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	93.2	59.4
1	Ja	6.8	4.3
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.119 pSprachdiagnostik_15_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachdiagnostik_15_5

Label: [Es sollte neue Woerter in verschiedenen Formen wiederholt enthalten.] Wie sollte das sprachliche Angebot beschaffen sein, damit es dem Kind moeglichst hilfreichen Input bezueglich der Struktur der Zielsprache liefert?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachdiagnostik_15_5	44	0.52	0.51

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	47.7	30.4
1	Ja	52.3	33.3
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.120 pSprachdiagnostik_15_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pSprachdiagnostik_15_6

Label: [Es sollte keine ungewöhnlichen Satzstrukturen enthalten (z.B. Passiv).] Wie sollte das sprachliche Angebot beschaffen sein, damit es dem Kind moeglichst hilfreichen Input bezueglich der Struktur der Zielsprache liefert?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pSprachdiagnostik_15_6	44	0.34	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	65.9	42.0
1	Ja	34.1	21.7
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.121 pKoennenMethSprBerPhon_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenMethSprBerPhon_1

Label: [Ich sehe was, was du nicht siehst] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Übungen aus Ihrer Sicht zur Foerderung der phonologischen Faehigkeiten? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwandeln lassen.

Kategorien: 1 = 1 - gar nicht geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr gut geeignet

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenMethSprBerPhon_1	43	2.91	1.27

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	11.6	7.2
2	2	34.9	21.7
3	3	18.6	11.6
4	4	20.9	13.0
5	5 - sehr gut geeignet	14.0	8.7
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.122 pKoennenMethSprBerPhon_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenMethSprBerPhon_2

Label: [Reimwoerter finden] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Uebungen aus Ihrer Sicht zur Foerderung der phonologischen Faehigkeiten? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwandeln lassen.

Kategorien: 1 = 1 - gar nicht geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr gut geeignet

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenMethSprBerPhon_2	43	4.60	0.62

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	0.0	0.0
2	2	0.0	0.0
3	3	7.0	4.3
4	4	25.6	15.9
5	5 - sehr gut geeignet	67.4	42.0
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.123 pKoennenMethSprBerPhon_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenMethSprBerPhon_3

Label: [Dinge oder Personen auf Wimmelbildern suchen lassen] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Uebungen aus Ihrer Sicht zur Foerderung der phonologischen Faehigkeiten? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwandeln las

Kategorien: 1 = 1 - gar nicht geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr gut geeignet

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenMethSprBerPhon_3	43	2.84	1.51

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	30.2	18.8
2	2	11.6	7.2
3	3	20.9	13.0
4	4	18.6	11.6
5	5 - sehr gut geeignet	18.6	11.6
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.124 pKoennenMethSprBerPhon_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenMethSprBerPhon_4

Label: [Ich packe meinen Koffer] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Uebungen aus Ihrer Sicht zur Foerderung der phonologischen Faehigkeiten? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwandeln lassen.

Kategorien: 1 = 1 - *gar nicht geeignet*; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - *sehr gut geeignet*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenMethSprBerPhon_4	43	3.09	1.23

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	9.3	5.8
2	2	25.6	15.9
3	3	27.9	17.4
4	4	20.9	13.0
5	5 - sehr gut geeignet	16.3	10.1
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.125 pKoennenMethSprBerPhon_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenMethSprBerPhon_5

Label: [Zungenbrecher nachsprechen] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Übungen aus Ihrer Sicht zur Förderung der phonologischen Fähigkeiten? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwandeln lassen.

Kategorien: 1 = 1 - gar nicht geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr gut geeignet

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenMethSprBerPhon_5	43	3.98	1.08

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	2.3	1.4
2	2	9.3	5.8
3	3	16.3	10.1
4	4	32.6	20.3
5	5 - sehr gut geeignet	39.5	24.6
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.126 pKoennenMethSprBerPhon_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenMethSprBerPhon_6

Label: [Stille Post] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Uebungen aus Ihrer Sicht zur Foerderung der phonologischen Faehigkeiten? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwandeln lassen.

Kategorien: 1 = 1 - gar nicht geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr gut geeignet

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenMethSprBerPhon_6	43	3.51	1.26

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	7.0	4.3
2	2	16.3	10.1
3	3	23.3	14.5
4	4	25.6	15.9
5	5 - sehr gut geeignet	27.9	17.4
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.127 pKoennenMethSprBerPhon_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenMethSprBerPhon_7

Label: [Phantasieworte nachsprechen] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Übungen aus Ihrer Sicht zur Förderung der phonologischen Fähigkeiten? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwandeln lassen.

Kategorien: 1 = 1 - gar nicht geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr gut geeignet

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenMethSprBerPhon_7	43	4.02	1.03

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	2.3	1.4
2	2	7.0	4.3
3	3	16.3	10.1
4	4	34.9	21.7
5	5 - sehr gut geeignet	39.5	24.6
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.128 pKoennenMethSprBerPhon_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenMethSprBerPhon_8

Label: [Gegenstaende auf Zuruf verstecken] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Uebungen aus Ihrer Sicht zur Foerderung der phonologischen Faehigkeiten? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwandeln lassen.

Kategorien: 1 = 1 - gar nicht geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr gut geeignet

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenMethSprBerPhon_8	43	2.70	1.32

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	20.9	13.0
2	2	30.2	18.8
3	3	18.6	11.6
4	4	18.6	11.6
5	5 - sehr gut geeignet	11.6	7.2
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.129 pStratKomm_Team2_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pStratKomm_Team2_1

Label: [Ich tue nichts, da es in diesen Routinesituationen nicht so wichtig ist zu sprechen.] In einer fruehpaedagogischen Einrichtung wird beim gemeinsamen Fruehstueck wenig mit den Kindern gesprochen. Was wuerden Sie in diesem Fall tun? Bewerten Sie die Hand

Kategorien: 1 = 1 - am wenigsten geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - am besten geeignet

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pStratKomm_Team2_1	43	1.16	0.57

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - am wenigsten geeignet	90.7	56.5
2	2	4.7	2.9
3	3	2.3	1.4
4	4	2.3	1.4
5	5 - am besten geeignet	0.0	0.0
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.130 pStratKomm_Team2_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pStratKomm_Team2_2

Label: [Ich spreche es in der Teamsitzung an und bitte die Kolleginnen, darauf zu achten, dass sie ihre Handlungen sprachlich begleiten.] In einer fruehpaedagogischen Einrichtung wird beim gemeinsamen Fruehstueck wenig mit den Kindern gesprochen. Was wuerden S

Kategorien: 1 = 1 - am wenigsten geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - am besten geeignet

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pStratKomm_Team2_2	43	4.49	0.74

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - am wenigsten geeignet	0.0	0.0
2	2	2.3	1.4
3	3	7.0	4.3
4	4	30.2	18.8
5	5 - am besten geeignet	60.5	37.7
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.131 pStratKomm_Team2_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pStratKomm_Team2_3

Label: [Ich verlasse mich darauf, dass die Leitung der Einrichtung in der Situation das Richtige tut.] In einer fruehpaedagogischen Einrichtung wird beim gemeinsamen Fruehstueck wenig mit den Kindern gesprochen. Was wuerden Sie in diesem Fall tun? Bewerten Sie

Kategorien: 1 = 1 - am wenigsten geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - am besten geeignet

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pStratKomm_Team2_3	43	1.49	0.86

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - am wenigsten geeignet	67.4	42.0
2	2	20.9	13.0
3	3	9.3	5.8
4	4	0.0	0.0
5	5 - am besten geeignet	2.3	1.4
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.132 pStratKomm_Team2_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pStratKomm_Team2_4

Label: [Ich werde selbst aktiv und versprache meine Handlungen und die der Kinder während des Frühstückes.] In einer frühpädagogischen Einrichtung wird beim gemeinsamen Frühstück wenig mit den Kindern gesprochen. Was würden Sie in diesem Fall tun? B

Kategorien: 1 = 1 - am wenigsten geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - am besten geeignet

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pStratKomm_Team2_4	43	4.70	0.56

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - am wenigsten geeignet	0.0	0.0
2	2	0.0	0.0
3	3	4.7	2.9
4	4	20.9	13.0
5	5 - am besten geeignet	74.4	46.4
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.133 pStratKomm_Team2_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pStratKomm_Team2_5

Label: [Ich spreche einzelne Kolleginnen an und bitte sie, mehr zu sprechen.] In einer fruehpaedagogischen Einrichtung wird beim gemeinsamen Fruehstueck wenig mit den Kindern gesprochen. Was wuerden Sie in diesem Fall tun? Bewerten Sie die Handlungsoptionen vo

Kategorien: 1 = 1 - am wenigsten geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - am besten geeignet

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pStratKomm_Team2_5	43	3.56	1.10

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - am wenigsten geeignet	4.7	2.9
2	2	9.3	5.8
3	3	34.9	21.7
4	4	27.9	17.4
5	5 - am besten geeignet	23.3	14.5
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.134 pKoennenStrategieFiltr_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenStrategieFiltr_1

Label: [Die Satzstellung ist korrekt.] Welche drei Notizen wahlen Sie fuer die Dokumentation ueber die sprachliche Entwicklung dieses Kindes aus?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenStrategieFiltr_1	44	0.27	0.45

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	72.7	46.4
1	Ja	27.3	17.4
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.135 pKoennenStrategieFiltr_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenStrategieFiltr_2

Label: [Das Kind hat Probleme mit dem grammatischen Geschlecht.] Welche drei Notizen waehlen Sie fuer die Dokumentation ueber die sprachliche Entwicklung dieses Kindes aus?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenStrategieFiltr_2	44	0.70	0.46

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	29.5	18.8
1	Ja	70.5	44.9
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.136 pKoennenStrategieFiltr_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenStrategieFiltr_3

Label: [Das Kind verwendet nicht die richtigen Satzeinleiter/Bindewörter.] Welche drei Notizen wählen Sie für die Dokumentation über die sprachliche Entwicklung dieses Kindes aus?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewählt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenStrategieFiltr_3	44	0.48	0.51

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewählt	52.3	33.3
1	Ja	47.7	30.4
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.137 pKoennenStrategieFiltr_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenStrategieFiltr_4

Label: [Das Kind spricht undeutlich.] Welche drei Notizen waehlen Sie fuer die Dokumentation ueber die sprachliche Entwicklung dieses Kindes aus?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenStrategieFiltr_4	44	0.27	0.45

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	72.7	46.4
1	Ja	27.3	17.4
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.138 pKoennenStrategieFiltr_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenStrategieFiltr_5

Label: [Das Kind reagiert nicht angemessen auf Fragen.] Welche drei Notizen waehlen Sie fuer die Dokumentation ueber die sprachliche Entwicklung dieses Kindes aus?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenStrategieFiltr_5	44	0.05	0.21

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	95.5	60.9
1	Ja	4.5	2.9
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.139 pKoennenStrategieFiltr_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenStrategieFiltr_6

Label: [Die Verben sind nicht korrekt gebeugt.] Welche drei Notizen wachlen Sie fuer die Dokumentation ueber die sprachliche Entwicklung dieses Kindes aus?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenStrategieFiltr_6	44	0.20	0.41

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	79.5	50.7
1	Ja	20.5	13.0
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.140 pKoennenStrategieFiltr_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenStrategieFiltr_7

Label: [Die Verben stehen an der falschen Stelle im Satz.] Welche drei Notizen waehlen Sie fuer die Dokumentation ueber die sprachliche Entwicklung dieses Kindes aus?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenStrategieFiltr_7	44	0.18	0.39

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	81.8	52.2
1	Ja	18.2	11.6
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.141 pKoennenStrategieFiltr_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenStrategieFiltr_8

Label: [Das Kind spricht stockend.] Welche drei Notizen waehlen Sie fuer die Dokumentation ueber die sprachliche Entwicklung dieses Kindes aus?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenStrategieFiltr_8	44	0.09	0.29

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	90.9	58.0
1	Ja	9.1	5.8
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.142 pKoennenStrategieFiltr_9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenStrategieFiltr_9

Label: [Das Kind beherrscht die Praepositionen noch nicht.] Welche drei Notizen
waehlen Sie fuer die Dokumentation ueber die sprachliche Entwicklung dieses
Kindes aus?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenStrategieFiltr_9	44	0.45	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	54.5	34.8
1	Ja	45.5	29.0
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.143 pKoennenStrategieFiltr_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenStrategieFiltr_10

Label: [Das Kind bildet den Akkusativ (Wen-Fall) richtig.] Welche drei Notizen waehlen Sie fuer die Dokumentation ueber die sprachliche Entwicklung dieses Kindes aus?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenStrategieFiltr_10	44	0.18	0.39

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	81.8	52.2
1	Ja	18.2	11.6
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.144 pKoennenStrategieFiltr_11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenStrategieFiltr_11

Label: [Das Kind spricht schlecht Deutsch.] Welche drei Notizen waehlen Sie fuer die Dokumentation ueber die sprachliche Entwicklung dieses Kindes aus?

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenStrategieFiltr_11	44	0.05	0.21

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	95.5	60.9
1	Ja	4.5	2.9
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.145 pKoennenStraPlanVWort

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenStraPlanVWort

Label: Sie wollen das Verstaendnis des Wortschatzes im Bereich „Kindergarten“ in Ihrer Sprachfoerdergruppe mit einem grossen Wimmelbild „Unser Kindergarten“ abfragen. Fuer welche der folgenden Aufgaben entscheiden Sie sich?

Kategorien: 1 = *Sie geben den Kindern kleine Kaertchen, die Gegenstaende/Aktivitaeten darstellen, die auch auf dem Bild abgebildet sind*; 2 = *Sie fragen die Kinder einzeln nach bestimmten Gegenstaenden/Aktivitaeten, die auf dem Bild abgebildet sind und fordern s*; 3 = *Sie fordern die Kinder auf, eine Szene auf dem Bild auszusuchen und etwas dazu zu erzaehlen.*; 4 = *Sie zeigen ein Bildkaertchen und fragen, welches Kind Ihnen den abgebildeten Gegenstand auf dem Wimmelbild zeigen kann.*

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
pKoennenStraPlanVWort	43	2.19	0.96

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Sie geben den Kindern kleine Kaertchen, die Gegenstaende/Aktivitaeten darstellen, die auch auf dem Bild abgebildet sind	32.6	20.3
2	Sie fragen die Kinder einzeln nach bestimmten Gegenstaenden/Aktivitaeten, die auf dem Bild abgebildet sind und fordern s	20.9	13.0
3	Sie fordern die Kinder auf, eine Szene auf dem Bild auszusuchen und etwas dazu zu erzaehlen.	41.9	26.1

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
4	Sie zeigen ein Bildkaertchen und fragen, welches Kind Ihnen den abgebildeten Gegenstand auf dem Wimmelbild zeigen kann.	4.7	2.9
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.146 pKoennenMethSprBerPraep_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenMethSprBerPraep_1

Label: [Ich sehe was, was du nicht siehst] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Übungen aus Ihrer Sicht zur Foerderung des Bereichs Praepositionsverstaendnis? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwandeln lassen.

Kategorien: 1 = 1 - gar nicht geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr gut geeignet

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenMethSprBerPraep_1	43	3.37	1.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	11.6	7.2
2	2	25.6	15.9
3	3	11.6	7.2
4	4	16.3	10.1
5	5 - sehr gut geeignet	34.9	21.7
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.147 pKoennenMethSprBerPraep_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenMethSprBerPraep_2

Label: [Reimwoerter finden] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Uebungen aus Ihrer Sicht zur Foerderung des Bereichs Praepositionsverstaendnis? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwandeln lassen.

Kategorien: 1 = 1 - gar nicht geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr gut geeignet

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenMethSprBerPraep_2	43	1.72	0.80

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	46.5	29.0
2	2	37.2	23.2
3	3	14.0	8.7
4	4	2.3	1.4
5	5 - sehr gut geeignet	0.0	0.0
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.148 pKoennenMethSprBerPraep_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenMethSprBerPraep_3

Label: [Dinge oder Personen auf Wimmelbildern suchen lassen] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Uebungen aus Ihrer Sicht zur Foerderung des Bereichs Praepositionsverstaendnis? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwand

Kategorien: 1 = 1 - gar nicht geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr gut geeignet

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenMethSprBerPraep_3	43	4.30	1.06

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	4.7	2.9
2	2	2.3	1.4
3	3	9.3	5.8
4	4	25.6	15.9
5	5 - sehr gut geeignet	58.1	36.2
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.149 pKoennenMethSprBerPraep_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenMethSprBerPraep_4

Label: [Ich packe meinen Koffer] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Uebungen aus Ihrer Sicht zur Foerderung des Bereichs Praepositionsverstaendnis? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwandeln lassen.

Kategorien: 1 = 1 - gar nicht geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr gut geeignet

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenMethSprBerPraep_4	43	2.79	1.41

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	23.3	14.5
2	2	23.3	14.5
3	3	20.9	13.0
4	4	16.3	10.1
5	5 - sehr gut geeignet	16.3	10.1
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.150 pKoennenMethSprBerPraep_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenMethSprBerPraep_5

Label: [Zungenbrecher nachsprechen] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Übungen aus Ihrer Sicht zur Foerderung des Bereichs Praepositionsverstaendnis? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwandeln lassen.

Kategorien: 1 = 1 - gar nicht geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr gut geeignet

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenMethSprBerPraep_5	43	1.70	0.91

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	51.2	31.9
2	2	34.9	21.7
3	3	9.3	5.8
4	4	2.3	1.4
5	5 - sehr gut geeignet	2.3	1.4
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.151 pKoennenMethSprBerPraep_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenMethSprBerPraep_6

Label: [Stille Post] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Uebungen aus Ihrer Sicht zur Foerderung des Bereichs Praepositionsverstaendnis? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwandeln lassen.

Kategorien: 1 = 1 - gar nicht geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr gut geeignet

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenMethSprBerPraep_6	43	1.91	0.97

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	41.9	26.1
2	2	34.9	21.7
3	3	14.0	8.7
4	4	9.3	5.8
5	5 - sehr gut geeignet	0.0	0.0
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.152 pKoennenMethSprBerPraep_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenMethSprBerPraep_7

Label: [Phantasieworte nachsprechen] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Übungen aus Ihrer Sicht zur Foerderung des Bereichs Praepositionsverstaendnis? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwandeln lassen.

Kategorien: 1 = 1 - gar nicht geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr gut geeignet

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenMethSprBerPraep_7	43	1.49	0.74

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	62.8	39.1
2	2	27.9	17.4
3	3	7.0	4.3
4	4	2.3	1.4
5	5 - sehr gut geeignet	0.0	0.0
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.153 pKoennenMethSprBerPraep_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenMethSprBerPraep_8

Label: [Gegenstaende auf Zuruf verstecken] Wie geeignet sind die folgenden Spiele und Uebungen aus Ihrer Sicht zur Foerderung des Bereichs Praepositionsverstaendnis? Bitte bewerten Sie die typische Form der Spiele, und nicht, ob sie sich abwandeln lassen.

Kategorien: 1 = 1 - gar nicht geeignet; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr gut geeignet

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenMethSprBerPraep_8	43	3.93	1.40

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - gar nicht geeignet	9.3	5.8
2	2	11.6	7.2
3	3	9.3	5.8
4	4	16.3	10.1
5	5 - sehr gut geeignet	53.5	33.3
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.154 pKoennenDiagnSynDaM_01

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenDiagnSynDaM_01

Label: [Hendrik ist im Satzbau...] Sehen Sie sich die folgenden Aeusserungen von Hendrik (2;4 Jahre) mit Deutsch als Muttersprache an. Schaetzen Sie anschliessend bitte ein, ob Hendrik im Bereich Satzbau erwartungsgemaess entwickelt ist: aufmachen guckema tak

Kategorien: 1 = 1 - nicht erwartungsgemaess entwickelt; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - erwartungsgemaess entwickelt

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenDiagnSynDaM_01	43	2.33	0.92

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - nicht erwartungsgemaess entwickelt	20.9	13.0
2	2	32.6	20.3
3	3	41.9	26.1
4	4	2.3	1.4
5	5 - erwartungsgemaess entwickelt	2.3	1.4
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.155 pKoennenBerichtInfo_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenBerichtInfo_1

Label: [Sandra spricht sehr gerne und viel.] Bitte stellen Sie sich vor, Sie erhalten die Dokumentation einer Sprachfoerderkraft Ihrer Einrichtung. Wie informativ schaezten Sie die folgenden Aussagen fuer Ihre weitere gezielte Sprachfoerderung ein?

Kategorien: 1 = 1 - ueberhaupt nicht informativ; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr informativ

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenBerichtInfo_1	43	2.93	1.28

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - ueberhaupt nicht informativ	16.3	10.1
2	2	20.9	13.0
3	3	30.2	18.8
4	4	18.6	11.6
5	5 - sehr informativ	14.0	8.7
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.156 pKoennenBerichtInfo_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenBerichtInfo_2

Label: [Moritz verwendet oft falsche Woerter und verbessert sich danach.] Bitte stellen Sie sich vor, Sie erhalten die Dokumentation einer Sprachfoerderkraft Ihrer Einrichtung. Wie informativ schaezen Sie die folgenden Aussagen fuer Ihre weitere gezielte Spra

Kategorien: 1 = 1 - ueberhaupt nicht informativ; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr informativ

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenBerichtInfo_2	43	3.63	1.09

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - ueberhaupt nicht informativ	4.7	2.9
2	2	9.3	5.8
3	3	27.9	17.4
4	4	34.9	21.7
5	5 - sehr informativ	23.3	14.5
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.157 pKoennenBerichtInfo_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenBerichtInfo_3

Label: [Katrin muss noch lernen, dass auch andere Kinder reden duerfen.] Bitte stellen Sie sich vor, Sie erhalten die Dokumentation einer Sprachfoerderkraft Ihrer Einrichtung. Wie informativ schaezen Sie die folgenden Aussagen fuer Ihre weitere gezielte Sprac

Kategorien: 1 = 1 - ueberhaupt nicht informativ; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr informativ

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenBerichtInfo_3	43	1.77	1.02

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - ueberhaupt nicht informativ	53.5	33.3
2	2	25.6	15.9
3	3	14.0	8.7
4	4	4.7	2.9
5	5 - sehr informativ	2.3	1.4
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.158 pKoennenBerichtInfo_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenBerichtInfo_4

Label: [Bei der Verwendung von starken Verben macht Uemit grosse Fortschritte.] Bitte stellen Sie sich vor, Sie erhalten die Dokumentation einer Sprachfoerderkraft Ihrer Einrichtung. Wie informativ schaezen Sie die folgenden Aussagen fuer Ihre weitere gezielte

Kategorien: 1 = 1 - ueberhaupt nicht informativ; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr informativ

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenBerichtInfo_4	43	3.77	1.25

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - ueberhaupt nicht informativ	7.0	4.3
2	2	11.6	7.2
3	3	14.0	8.7
4	4	32.6	20.3
5	5 - sehr informativ	34.9	21.7
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.159 pKoennenBerichtInfo_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenBerichtInfo_5

Label: [Annica konnte heute schon mehr bei unserem Begruessungslied mitsingen als beim letzten Mal.] Bitte stellen Sie sich vor, Sie erhalten die Dokumentation einer Sprachfoerderkraft Ihrer Einrichtung. Wie informativ schaezen Sie die folgenden Aussagen fuer

Kategorien: 1 = 1 - ueberhaupt nicht informativ; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr informativ

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenBerichtInfo_5	43	3.07	1.10

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - ueberhaupt nicht informativ	4.7	2.9
2	2	30.2	18.8
3	3	30.2	18.8
4	4	23.3	14.5
5	5 - sehr informativ	11.6	7.2
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.160 pKoennenBerichtInfo_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenBerichtInfo_6

Label: [Kevin hat sich beim Reimen schnell entmutigen lassen und hat dann trotzig bis zum Ende der Stunde geschwiegen.] Bitte stellen Sie sich vor, Sie erhalten die Dokumentation einer Sprachfoerderkraft Ihrer Einrichtung. Wie informativ schaetzen Sie die folge

Kategorien: 1 = 1 - ueberhaupt nicht informativ; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr informativ

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenBerichtInfo_6	43	2.35	1.19

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - ueberhaupt nicht informativ	30.2	18.8
2	2	25.6	15.9
3	3	30.2	18.8
4	4	7.0	4.3
5	5 - sehr informativ	7.0	4.3
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.161 pKoennenBerichtInfo_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenBerichtInfo_7

Label: [Emre stellt jetzt das Verb in ungefaehr der Haelfte der Faelle an die 2. Stelle des Satzes.] Bitte stellen Sie sich vor, Sie erhalten die Dokumentation einer Sprachfoerderkraft Ihrer Einrichtung. Wie informativ schaetzen Sie die folgenden Aussagen fuer

Kategorien: 1 = 1 - ueberhaupt nicht informativ; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr informativ

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenBerichtInfo_7	43	4.23	0.97

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - ueberhaupt nicht informativ	2.3	1.4
2	2	2.3	1.4
3	3	16.3	10.1
4	4	27.9	17.4
5	5 - sehr informativ	51.2	31.9
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.162 pKoennenBerichtInfo_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenBerichtInfo_8

Label: [Vincenz hatte Schwierigkeiten beim Silben klatschen.] Bitte stellen Sie sich vor, Sie erhalten die Dokumentation einer Sprachfoerderkraft Ihrer Einrichtung. Wie informativ schaeetzen Sie die folgenden Aussagen fuer Ihre weitere gezielte Sprachfoerderung

Kategorien: 1 = 1 - ueberhaupt nicht informativ; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - sehr informativ

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenBerichtInfo_8	43	4.28	0.85

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - ueberhaupt nicht informativ	0.0	0.0
2	2	4.7	2.9
3	3	11.6	7.2
4	4	34.9	21.7
5	5 - sehr informativ	48.8	30.4
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.163 pKoennenMethodikSelek1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenMethodikSelek1

Label: Sie haben bei den Kindern in ihrer Sprachfoerdergruppe festgestellt, dass sie mit der Unterscheidung zwischen Akkusativ (Wen) und Dativ (Wem) Probleme haben. Sie sagen z.B. oft Sätze wie: Ich sitze auf den Stuhl. Welches der folgenden Spiele koennen Sie u

Kategorien: 1 = *Gegenstaende in einer Kiste ertasten und erraten*; 2 = *Bilder benennen lassen*; 3 = *Bildausschnitte von Personen und Gegenstaenden auf einem grossen Bild suchen lassen*; 4 = *Anziehspiel mit verschiedenen Puppen und Kleidungsstuecken*; 5 = *Ich sehe was, was du nicht siehst...*; 6 = *Ich packe meinen Koffer...*; 7 = *Klassisches Memory spielen*

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenMethodikSelek1	43	4.09	1.41

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Gegenstaende in einer Kiste ertasten und erraten	2.3	1.4
2	Bilder benennen lassen	4.7	2.9
3	Bildausschnitte von Personen und Gegenstaenden auf einem grossen Bild suchen lassen	34.9	21.7
4	Anziehspiel mit verschiedenen Puppen und Kleidungsstuecken	25.6	15.9
5	Ich sehe was, was du nicht siehst...	7.0	4.3
6	Ich packe meinen Koffer...	23.3	14.5
7	Klassisches Memory spielen	2.3	1.4

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.164 pKoennenDiagnSynDaZ_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenDiagnSynDaZ_1

Label: [Zeyneps Satzbau ist...] Sehen Sie sich die folgenden Aeusserungen von Zeynep (4;4 Jahre) mit Deutsch als Zweitsprache an. Das Kind hat seit 8 Monaten Kontakt zur deutschen Sprache. Schaetzen Sie anschliessend ein, ob es im Bereich Satzbau erwartungsgemae

Kategorien: 1 = 1 - nicht erwartungsgemaess entwickelt; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - erwartungsgemaess entwickelt

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenDiagnSynDaZ_1	43	4.07	0.91

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - nicht erwartungsgemaess entwickelt	0.0	0.0
2	2	4.7	2.9
3	3	23.3	14.5
4	4	32.6	20.3
5	5 - erwartungsgemaess entwickelt	39.5	24.6
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.165 pStrategie_L1_L2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pStrategie_L1_L2

Label: Im Elterngespräch erzählen Ihnen die türkischstämmigen Eltern eines Kindes, die seit ca. einem Jahr in Deutschland leben, dass sie mit dem Kind zu Hause nur noch Deutsch sprechen. Ihnen fällt auf, dass beide Eltern eher geringe Deutschkenntnisse haben

Kategorien: 1 = *Ich lobe die Eltern für ihr Engagement und sage, sie sollen genauso weitermachen, da es für das Kind wichtig ist, sehr*; 2 = *Ich erkläre den Eltern, dass es sinnvoller ist, wenn sie mit ihrem Kind die Sprache sprechen, die sie am besten beherrs*; 3 = *Ich ermutige die Eltern, so weiterzumachen und zusätzlich noch einen Deutschkurs an der Volkshochschule zu besuchen.*; 4 = *Ich ermutige die Eltern, sich deutschsprachige Bücher und Liedtexte zu besorgen. So können die Eltern gezielt auch etw*

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pStrategie_L1_L2	43	2.28	0.59

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Ich lobe die Eltern für ihr Engagement und sage, sie sollen genauso weitermachen, da es für das Kind wichtig ist, sehr	2.3	1.4
2	Ich erkläre den Eltern, dass es sinnvoller ist, wenn sie mit ihrem Kind die Sprache sprechen, die sie am besten beherrs	72.1	44.9

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
3	Ich ermutige die Eltern, so weiterzumachen und zusätzlich noch einen Deutschkurs an der Volkshochschule zu besuchen.	20.9	13.0
4	Ich ermutige die Eltern, sich deutschsprachige Buecher und Liedtexte zu besorgen. So koennen die Eltern gezielt auch etw	4.7	2.9
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.166 pKoennenStrategieReflk_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenStrategieReflk_1

Label: [Rank 1] Sie machen seit einem halben Jahr Sprachfoerderung in der Kita. Sie sind sich nicht sicher, ob Ihr Sprachverhalten in der Interaktion mit den Kindern gut ist und wollen Ihr Verhalten moeglichst genau ueberpruefen. Ordnen Sie die verschiedenen Moe

Kategorien: 1 = *Ich notiere mir waehrend einer Sprachfoerderstunde, immer wenn ich Zeit habe, was ich zu den Kindern gesagt habe und ana*; 2 = *Ich bitte eine Kollegin, mich in der Interaktion mit den Kindern zu beobachten und mir zu sagen, ob ich mich richtig ver*; 3 = *Ich bitte eine Kollegin, sich kurze Dialoge zwischen mir und den Kindern woertlich zu notieren und analysiere anhand des*; 4 = *Ich nehme Gespraechе zwischen mir und den Kindern in unterschiedlichen Situationen auf (Audio/Video, in der Einrichtung*; 5 = *Ich frage meine Kitaleitung, ob ich an einer Fortbildung zum Thema Sprachfoerderung teilnehmen kann.*

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenStrategieReflk_1	43	3.77	1.09

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Ich notiere mir waehrend einer Sprachfoerderstunde, immer wenn ich Zeit habe, was ich zu den Kindern gesagt habe und ana	4.7	2.9
2	Ich bitte eine Kollegin, mich in der Interaktion mit den Kindern zu beobachten und mir zu sagen, ob ich mich richtig ver	9.3	5.8
Fortsetzung auf der nächsten Seite			

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
3	Ich bitte eine Kollegin, sich kurze Dialoge zwischen mir und den Kindern woertlich zu notieren und analysiere anhand des	16.3	10.1
4	Ich nehme Gespraechе zwischen mir und den Kindern in unterschiedlichen Situationen auf (Audio/Video, in der Einrichtung	44.2	27.5
5	Ich frage meine Kitaleitung, ob ich an einer Fortbildung zum Thema Sprachfoerderung teilnehmen kann.	25.6	15.9
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.167 pKoennenStrategieReflk_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenStrategieReflk_2

Label: [Rank 2] Sie machen seit einem halben Jahr Sprachfoerderung in der Kita. Sie sind sich nicht sicher, ob Ihr Sprachverhalten in der Interaktion mit den Kindern gut ist und wollen Ihr Verhalten moeglichst genau ueberpruefen. Ordnen Sie die verschiedenen Moe

Kategorien: 1 = *Ich notiere mir waehrend einer Sprachfoerderstunde, immer wenn ich Zeit habe, was ich zu den Kindern gesagt habe und ana*; 2 = *Ich bitte eine Kollegin, mich in der Interaktion mit den Kindern zu beobachten und mir zu sagen, ob ich mich richtig ver*; 3 = *Ich bitte eine Kollegin, sich kurze Dialoge zwischen mir und den Kindern woertlich zu notieren und analysiere anhand des*; 4 = *Ich nehme Gespraechе zwischen mir und den Kindern in unterschiedlichen Situationen auf (Audio/Video, in der Einrichtung*; 5 = *Ich frage meine Kitaleitung, ob ich an einer Fortbildung zum Thema Sprachfoerderung teilnehmen kann.*

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenStrategieReflk_2	43	2.95	1.23

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Ich notiere mir waehrend einer Sprachfoerderstunde, immer wenn ich Zeit habe, was ich zu den Kindern gesagt habe und ana	14.0	8.7
2	Ich bitte eine Kollegin, mich in der Interaktion mit den Kindern zu beobachten und mir zu sagen, ob ich mich richtig ver	23.3	14.5
Fortsetzung auf der nächsten Seite			

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
3	Ich bitte eine Kollegin, sich kurze Dialoge zwischen mir und den Kindern woertlich zu notieren und analysiere anhand des	27.9	17.4
4	Ich nehme Gespraechе zwischen mir und den Kindern in unterschiedlichen Situationen auf (Audio/Video, in der Einrichtung	23.3	14.5
5	Ich frage meine Kitaleitung, ob ich an einer Fortbildung zum Thema Sprachfoerderung teilnehmen kann.	11.6	7.2
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.168 pKoennenStrategieReflk_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenStrategieReflk_3

Label: [Rank 3] Sie machen seit einem halben Jahr Sprachfoerderung in der Kita. Sie sind sich nicht sicher, ob Ihr Sprachverhalten in der Interaktion mit den Kindern gut ist und wollen Ihr Verhalten moeglichst genau ueberpruefen. Ordnen Sie die verschiedenen Moe

Kategorien: 1 = *Ich notiere mir waehrend einer Sprachfoerderstunde, immer wenn ich Zeit habe, was ich zu den Kindern gesagt habe und ana*; 2 = *Ich bitte eine Kollegin, mich in der Interaktion mit den Kindern zu beobachten und mir zu sagen, ob ich mich richtig ver*; 3 = *Ich bitte eine Kollegin, sich kurze Dialoge zwischen mir und den Kindern woertlich zu notieren und analysiere anhand des*; 4 = *Ich nehme Gespraechе zwischen mir und den Kindern in unterschiedlichen Situationen auf (Audio/Video, in der Einrichtung*; 5 = *Ich frage meine Kitaleitung, ob ich an einer Fortbildung zum Thema Sprachfoerderung teilnehmen kann.*

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenStrategieReflk_3	43	2.98	1.12

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Ich notiere mir waehrend einer Sprachfoerderstunde, immer wenn ich Zeit habe, was ich zu den Kindern gesagt habe und ana	9.3	5.8
2	Ich bitte eine Kollegin, mich in der Interaktion mit den Kindern zu beobachten und mir zu sagen, ob ich mich richtig ver	23.3	14.5
Fortsetzung auf der nächsten Seite			

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
3	Ich bitte eine Kollegin, sich kurze Dialoge zwischen mir und den Kindern woertlich zu notieren und analysiere anhand des	39.5	24.6
4	Ich nehme Gespraechе zwischen mir und den Kindern in unterschiedlichen Situationen auf (Audio/Video, in der Einrichtung	16.3	10.1
5	Ich frage meine Kitaleitung, ob ich an einer Fortbildung zum Thema Sprachfoerderung teilnehmen kann.	11.6	7.2
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.169 pKoennenStrategieReflk_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenStrategieReflk_4

Label: [Rank 4] Sie machen seit einem halben Jahr Sprachfoerderung in der Kita. Sie sind sich nicht sicher, ob Ihr Sprachverhalten in der Interaktion mit den Kindern gut ist und wollen Ihr Verhalten moeglichst genau ueberpruefen. Ordnen Sie die verschiedenen Moe

Kategorien: 1 = *Ich notiere mir waehrend einer Sprachfoerderstunde, immer wenn ich Zeit habe, was ich zu den Kindern gesagt habe und ana*; 2 = *Ich bitte eine Kollegin, mich in der Interaktion mit den Kindern zu beobachten und mir zu sagen, ob ich mich richtig ver*; 3 = *Ich bitte eine Kollegin, sich kurze Dialoge zwischen mir und den Kindern woertlich zu notieren und analysiere anhand des*; 4 = *Ich nehme Gespraechе zwischen mir und den Kindern in unterschiedlichen Situationen auf (Audio/Video, in der Einrichtung*; 5 = *Ich frage meine Kitaleitung, ob ich an einer Fortbildung zum Thema Sprachfoerderung teilnehmen kann.*

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenStrategieReflk_4	43	2.53	1.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Ich notiere mir waehrend einer Sprachfoerderstunde, immer wenn ich Zeit habe, was ich zu den Kindern gesagt habe und ana	34.9	21.7
2	Ich bitte eine Kollegin, mich in der Interaktion mit den Kindern zu beobachten und mir zu sagen, ob ich mich richtig ver	20.9	13.0

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
3	Ich bitte eine Kollegin, sich kurze Dialoge zwischen mir und den Kindern woertlich zu notieren und analysiere anhand des	16.3	10.1
4	Ich nehme Gespraechе zwischen mir und den Kindern in unterschiedlichen Situationen auf (Audio/Video, in der Einrichtung	11.6	7.2
5	Ich frage meine Kitaleitung, ob ich an einer Fortbildung zum Thema Sprachfoerderung teilnehmen kann.	16.3	10.1
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.170 pKoennenStrategieReflk_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenStrategieReflk_5

Label: [Rank 5] Sie machen seit einem halben Jahr Sprachfoerderung in der Kita. Sie sind sich nicht sicher, ob Ihr Sprachverhalten in der Interaktion mit den Kindern gut ist und wollen Ihr Verhalten moeglichst genau ueberpruefen. Ordnen Sie die verschiedenen Moe

Kategorien: 1 = *Ich notiere mir waehrend einer Sprachfoerderstunde, immer wenn ich Zeit habe, was ich zu den Kindern gesagt habe und ana*; 2 = *Ich bitte eine Kollegin, mich in der Interaktion mit den Kindern zu beobachten und mir zu sagen, ob ich mich richtig ver*; 3 = *Ich bitte eine Kollegin, sich kurze Dialoge zwischen mir und den Kindern woertlich zu notieren und analysiere anhand des*; 4 = *Ich nehme Gespraechе zwischen mir und den Kindern in unterschiedlichen Situationen auf (Audio/Video, in der Einrichtung*; 5 = *Ich frage meine Kitaleitung, ob ich an einer Fortbildung zum Thema Sprachfoerderung teilnehmen kann.*

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenStrategieReflk_5	43	2.77	1.78

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Ich notiere mir waehrend einer Sprachfoerderstunde, immer wenn ich Zeit habe, was ich zu den Kindern gesagt habe und ana	37.2	23.2
2	Ich bitte eine Kollegin, mich in der Interaktion mit den Kindern zu beobachten und mir zu sagen, ob ich mich richtig ver	23.3	14.5
Fortsetzung auf der nächsten Seite			

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
3	Ich bitte eine Kollegin, sich kurze Dialoge zwischen mir und den Kindern woertlich zu notieren und analysiere anhand des	0.0	0.0
4	Ich nehme Gespraechе zwischen mir und den Kindern in unterschiedlichen Situationen auf (Audio/Video, in der Einrichtung	4.7	2.9
5	Ich frage meine Kitaleitung, ob ich an einer Fortbildung zum Thema Sprachfoerderung teilnehmen kann.	34.9	21.7
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.171 pKoennenStraPlanWort_01

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenStraPlanWort_01

Label: [Oma, Opa, Onkel, Tante] Sie planen fuer Ihre Sprachfoerdergruppe von 3-4-jaehrigen Kindern mit Deutsch als Zweitsprache eine Sprachfoerderstunde mit dem Thema „Meine Familie“. Sie beginnen gerade mit diesem Thema und moechten neuen Wortschatz einfueh

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenStraPlanWort_01	44	0.66	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	34.1	21.7
1	Ja	65.9	42.0
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.172 pKoennenStraPlanWort_02

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenStraPlanWort_02

Label: [Junge, Maedchen, Mann, Frau] Sie planen fuer Ihre Sprachfoerdergruppe von 3-4-jaehrigen Kindern mit Deutsch als Zweitsprache eine Sprachfoerderstunde mit dem Thema „Meine Familie“. Sie beginnen gerade mit diesem Thema und moechten neuen Wortschatz ei

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenStraPlanWort_02	44	0.68	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	31.8	20.3
1	Ja	68.2	43.5
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.173 pKoennenStraPlanWort_03

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenStraPlanWort_03

Label: [spielen, besuchen, weinen, troesten] Sie planen fuer Ihre Sprachfoerdergruppe von 3-4-jaehrigen Kindern mit Deutsch als Zweitsprache eine Sprachfoerderstunde mit dem Thema „Meine Familie“. Sie beginnen gerade mit diesem Thema und moechten neuen Worts

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenStraPlanWort_03	44	0.27	0.45

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	72.7	46.4
1	Ja	27.3	17.4
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.174 pKoennenStraPlanWort_04

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenStraPlanWort_04

Label: [Mama, Papa, Bruederchen, Schwesterchen] Sie planen fuer Ihre Sprachfoerdergruppe von 3-4-jaehrigen Kindern mit Deutsch als Zweitsprache eine Sprachfoederstunde mit dem Thema „Meine Familie“. Sie beginnen gerade mit diesem Thema und moechten neuen Wo

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenStraPlanWort_04	44	0.41	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	59.1	37.7
1	Ja	40.9	26.1
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.175 pKoennenStraPlanWort_05

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenStraPlanWort_05

Label: [arbeiten, abholen, wohnen, zusammen sein] Sie planen fuer Ihre Sprachfoerdergruppe von 3-4-jaehrigen Kindern mit Deutsch als Zweitsprache eine Sprachfoerderstunde mit dem Thema „Meine Familie“. Sie beginnen gerade mit diesem Thema und moechten neuen

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenStraPlanWort_05	44	0.14	0.35

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	86.4	55.1
1	Ja	13.6	8.7
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.176 pKoennenStraPlanWort_06

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenStraPlanWort_06

Label: [Ich, Mutter, Vater, Schwester, Bruder] Sie planen fuer Ihre Sprachfoerdergruppe von 3-4-jaehrigen Kindern mit Deutsch als Zweitsprache eine Sprachfoerderstunde mit dem Thema „Meine Familie“. Sie beginnen gerade mit diesem Thema und moechten neuen Wor

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenStraPlanWort_06	44	0.91	0.29

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	9.1	5.8
1	Ja	90.9	58.0
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.177 pKoennenStraPlanWort_07

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenStraPlanWort_07

Label: [klein, gross, jung, alt] Sie planen fuer Ihre Sprachfoerdergruppe von 3-4-jaehrigen Kindern mit Deutsch als Zweitsprache eine Sprachfoerderstunde mit dem Thema „Meine Familie“. Sie beginnen gerade mit diesem Thema und moechten neuen Wortschatz einfue

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenStraPlanWort_07	44	0.61	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	38.6	24.6
1	Ja	61.4	39.1
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.178 pKoennenStraPlanWort_08

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenStraPlanWort_08

Label: [Erwachsener, Kind, Baby, Haustier] Sie planen fuer Ihre Sprachfoerdergruppe von 3-4-jaehrigen Kindern mit Deutsch als Zweitsprache eine Sprachfoerderstunde mit dem Thema „Meine Familie“. Sie beginnen gerade mit diesem Thema und moechten neuen Wortsch

Kategorien: 0 = *Nicht Gewaehlt*; 1 = *Ja*Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenStraPlanWort_08	44	0.23	0.42

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Nicht Gewaehlt	77.3	49.3
1	Ja	22.7	14.5
-99	missing	–	36.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 44$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.179 pKoennenDiagnPhon_01

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenDiagnPhon_01

Label: [Majas Aussprache ist...] Sehen Sie sich die folgenden Aeusserungen von Maja (4;7 Jahre) mit Erstsprache Deutsch an. Schaetzen Sie anschliessend ein, ob das Kind im Bereich der Aussprache erwartungsgemaess entwickelt ist. Der metterling ist ganz blau. Ich

Kategorien: 1 = 1 - nicht erwartungsgemaess entwickelt; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - erwartungsgemaess entwickelt

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenDiagnPhon_01	43	2.49	1.08

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - nicht erwartungsgemaess entwickelt	18.6	11.6
2	2	37.2	23.2
3	3	23.3	14.5
4	4	18.6	11.6
5	5 - erwartungsgemaess entwickelt	2.3	1.4
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.180 pKoennenStraPlankeinD

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenStraPlankeinD

Label: Ein Kind (3;10 Jahre) mit Erstsprache Tuerkisch besucht seit 9 Monaten die Kita und hatte dort zum ersten Mal Kontakt zur deutschen Sprache. Im Alltag ist Ihnen aufgefallen, dass das Kind nicht Deutsch spricht. Es kommuniziert mit Ihnen, Ihren Kolleginnen

Kategorien: 1 = bei den Eltern erfragen, ob das Kind in der Erstsprache normal entwickelt ist oder ob sie Auffaelligkeiten bemerkt haben; 2 = die Eltern informieren, dass das Kind Sprachprobleme hat und zum Logopaeden schicken; 3 = einen Sprachtest durchfuehren, um den Sprachstand objektiv festzustellen; 4 = besonders viel mit dem Kind sprechen und ihm ein gutes Sprachvorbild sein; 5 = das Kind immer wieder zum Sprechen auffordern; 6 = abwarten; manche Kinder brauchen etwas Zeit, bis sie sich in der Zweitsprache sprachlich aeussern

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenStraPlankeinD	43	2.26	1.54

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	bei den Eltern erfragen, ob das Kind in der Erstsprache normal entwickelt ist oder ob sie Auffaelligkeiten bemerkt haben	55.8	34.8
2	die Eltern informieren, dass das Kind Sprachprobleme hat und zum Logopaeden schicken	2.3	1.4
3	einen Sprachtest durchfuehren, um den Sprachstand objektiv festzustellen	11.6	7.2

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
4	besonders viel mit dem Kind sprechen und ihm ein gutes Sprachvorbild sein	23.3	14.5
5	das Kind immer wieder zum Sprechen auffordern	4.7	2.9
6	abwarten; manche Kinder brauchen etwas Zeit, bis sie sich in der Zweitsprache sprachlich äussern	2.3	1.4
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.181 pKoennenMethMonitReflx_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenMethMonitReflx_1

Label: [Fragetechnik] Sehen Sie sich den Dialog zwischen einer Erzieherin und vier Kindern nochmals an. Bewerten Sie das sprachliche Verhalten der Erzieherin anschliessend auf den angegebenen Ebenen.

Kategorien: 1 = 1 - *wenig sprachfoerderlich*; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - *sehr sprachfoerderlich*

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenMethMonitReflx_1	43	3.58	1.24

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - wenig sprachfoerderlich	7.0	4.3
2	2	11.6	7.2
3	3	27.9	17.4
4	4	23.3	14.5
5	5 - sehr sprachfoerderlich	30.2	18.8
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.182 pKoennenMethMonitReflx_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenMethMonitReflx_2

Label: [Feedbackverhalten] Sehen Sie sich den Dialog zwischen einer Erzieherin und vier Kindern nochmals an. Bewerten Sie das sprachliche Verhalten der Erzieherin anschliessend auf den angegebenen Ebenen.

Kategorien: 1 = 1 - *wenig sprachfoerderlich*; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - *sehr sprachfoerderlich*

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenMethMonitReflx_2	43	3.84	0.87

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - wenig sprachfoerderlich	0.0	0.0
2	2	2.3	1.4
3	3	39.5	24.6
4	4	30.2	18.8
5	5 - sehr sprachfoerderlich	27.9	17.4
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.183 pKoennenMethMonitReflx_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenMethMonitReflx_3

Label: [Gegenueberstellen von Wortformen] Sehen Sie sich den Dialog zwischen einer Erzieherin und vier Kindern nochmals an. Bewerten Sie das sprachliche Verhalten der Erzieherin anschliessend auf den angegebenen Ebenen.

Kategorien: 1 = 1 - *wenig sprachfoerderlich*; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - *sehr sprachfoerderlich*

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenMethMonitReflx_3	43	3.67	1.21

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - wenig sprachfoerderlich	4.7	2.9
2	2	14.0	8.7
3	3	23.3	14.5
4	4	25.6	15.9
5	5 - sehr sprachfoerderlich	32.6	20.3
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.184 pKoennenMethodikAnpass_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenMethodikAnpass_1

Label: [genauso wie mit anderen Kindern] Ein 2 1/2 Jaehriges Kind bildet bisher nur Wortkombinationen wie „Apfel essen“, „Ball draussen“ und formt noch keine richtigen Saetze. Wie sprechen Sie mit dem Kind?

Kategorien: 1 = 1 - keinesfalls; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - auf jeden Fall

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenMethodikAnpass_1	43	3.70	1.39

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - keinesfalls	9.3	5.8
2	2	14.0	8.7
3	3	16.3	10.1
4	4	18.6	11.6
5	5 - auf jeden Fall	41.9	26.1
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.185 pKoennenMethodikAnpass_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenMethodikAnpass_2

Label: [langsam und deutlich] Ein 2 1/2 Jaehriges Kind bildet bisher nur Wortkombinationen wie „Apfel essen“, „Ball draussen“ und formt noch keine richtigen Saetze. Wie sprechen Sie mit dem Kind?

Kategorien: 1 = 1 - keinesfalls; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - auf jeden Fall

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenMethodikAnpass_2	43	4.05	1.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - keinesfalls	2.3	1.4
2	2	2.3	1.4
3	3	25.6	15.9
4	4	27.9	17.4
5	5 - auf jeden Fall	41.9	26.1
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.186 pKoennenMethodikAnpass_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenMethodikAnpass_3

Label: [in kurzen, deutlichen Hauptsätzen] Ein 2 1/2 Jähriges Kind bildet bisher nur Wortkombinationen wie „Apfel essen“, „Ball draussen“ und formt noch keine richtigen Sätze. Wie sprechen Sie mit dem Kind?

Kategorien: 1 = 1 - keinesfalls; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - auf jeden Fall

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenMethodikAnpass_3	43	4.00	1.05

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - keinesfalls	2.3	1.4
2	2	4.7	2.9
3	3	25.6	15.9
4	4	25.6	15.9
5	5 - auf jeden Fall	41.9	26.1
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.187 pKoennenMethodikAnpass_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenMethodikAnpass_4
 Label: [in komplexeren Sätzen] Ein 2 1/2 Jähriges Kind bildet bisher nur Wortkombinationen wie „Apfel essen“, „Ball draussen“ und formt noch keine richtigen Sätze. Wie sprechen Sie mit dem Kind?
 Kategorien: 1 = 1 - keinesfalls; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - auf jeden Fall
 Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenMethodikAnpass_4	43	2.40	1.43

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - keinesfalls	37.2	23.2
2	2	23.3	14.5
3	3	16.3	10.1
4	4	9.3	5.8
5	5 - auf jeden Fall	14.0	8.7
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.188 pKoennenMethodikAnpass_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenMethodikAnpass_5

Label: [in ungewöhnlichen Satzstrukturen] Ein 2 1/2 Jähriges Kind bildet bisher nur Wortkombinationen wie „Apfel essen“, „Ball draussen“ und formt noch keine richtigen Sätze. Wie sprechen Sie mit dem Kind?

Kategorien: 1 = 1 - keinesfalls; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - auf jeden Fall

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenMethodikAnpass_5	43	1.53	0.91

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - keinesfalls	67.4	42.0
2	2	16.3	10.1
3	3	14.0	8.7
4	4	0.0	0.0
5	5 - auf jeden Fall	2.3	1.4
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.189 pKoennenMethodikAnpass_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenMethodikAnpass_6

Label: [das vom Kind Gesagte in Form eines Satzes wiederholen] Ein 2 1/2 Jaehriges Kind bildet bisher nur Wortkombinationen wie „Apfel essen“, „Ball draussen“ und formt noch keine richtigen Saetze. Wie sprechen Sie mit dem Kind?

Kategorien: 1 = 1 - keinesfalls; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - auf jeden Fall

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenMethodikAnpass_6	43	4.26	1.24

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - keinesfalls	7.0	4.3
2	2	7.0	4.3
3	3	2.3	1.4
4	4	20.9	13.0
5	5 - auf jeden Fall	62.8	39.1
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.190 pKoennenMethodikAnpass_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenMethodikAnpass_7

Label: [das Kind richtige Sätze nachsprechen lassen] Ein 2 1/2 Jähriges Kind bildet bisher nur Wortkombinationen wie „Apfel essen“, „Ball draussen“ und formt noch keine richtigen Sätze. Wie sprechen Sie mit dem Kind?

Kategorien: 1 = 1 - keinesfalls; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 - auf jeden Fall

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenMethodikAnpass_7	43	2.35	1.36

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - keinesfalls	39.5	24.6
2	2	16.3	10.1
3	3	23.3	14.5
4	4	11.6	7.2
5	5 - auf jeden Fall	9.3	5.8
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.191 pKoennenDiagSelektion_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenDiagSelektion_1

Label: [Hauptsätze und Nebensätze gegenüberstellen] Sie haben beobachtet, dass ein Kind typischerweise folgende Äußerungen produziert: de Junge haltet die Ball dass die Mädchen aufhören soll der willt die Hund gucken de Muell is da rausgefallt weil die Hu

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenDiagSelektion_1	43	8.26	9.44

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-99	missing	—	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.192 pKoennenDiagSelektion_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenDiagSelektion_2

Label: [Aussprache bestimmter Laute besonders hervorheben] Sie haben beobachtet, dass ein Kind typischerweise folgende Aeusserungen produziert: de Junge haltet die Ball dass die Maedchen aufhoeren soll der willt die Hund gucken de Muell is da rausgefallt weil di

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenDiagSelektion_2	43	5.81	5.34

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.193 pKoennenDiagSelektion_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenDiagSelektion_3

Label: [Artikel mit unterschiedlichem Geschlecht (der, die, das) kontrastieren] Sie haben beobachtet, dass ein Kind typischerweise folgende Aeusserungen produziert: de Junge haltet die Ball dass die Maedchen aufhoeren soll der willt die Hund gucken de Muell is d

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenDiagSelektion_3	43	12.09	8.11

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.194 pKoennenDiagSelektion_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenDiagSelektion_4

Label: [Artikel im Singular und Plural kontrastieren] Sie haben beobachtet, dass ein Kind typischerweise folgende Aeusserungen produziert: de Junge haltet die Ball dass die Maedchen aufhoeren soll der willt die Hund gucken de Muell is da rausgefallt weil die Hun

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenDiagSelektion_4	43	6.98	7.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.195 pKoennenDiagSelektion_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenDiagSelektion_5

Label: [Artikel im Dativ (Wem-Fall) und Nominativ (Wer-Fall) kontrastieren] Sie haben beobachtet, dass ein Kind typischerweise folgende Aeusserungen produziert: de Junge haltet die Ball dass die Maedchen aufhoeren soll der willt die Hund gucken de Muell is da ra

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenDiagSelektion_5	43	6.40	7.35

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-99	missing	—	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.196 pKoennenDiagSelektion_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenDiagSelektion_6

Label: [reichhaltigen Wortschatz im Themenfeld „Freizeit“ anbieten] Sie haben beobachtet, dass ein Kind typischerweise folgende Aeusserungen produziert: de Junge haltet die Ball dass die Maedchen aufhoeren soll der willt die Hund gucken de Muell is da rausge

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenDiagSelektion_6	43	3.60	5.27

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.197 pKoennenDiagSelektion_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenDiagSelektion_7

Label: [Verben in unterschiedlichen Formen anbieten] Sie haben beobachtet, dass ein Kind typischerweise folgende Aeusserungen produziert: de Junge haltet die Ball dass die Maedchen aufhoeren soll der willt die Hund gucken de Muell is da rausgefallt weil die Hund

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenDiagSelektion_7	43	16.86	11.80

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.198 pKoennenMethMoniVari_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenMethMoniVari_1

Label: [„Und bevor du das Bild gemalt hast, was hast du da gemacht?“] Bitte schätzen Sie bei den folgenden Aussagen ein, wie variantenreich sie grammatisch gesehen sind:

Kategorien: 1 = 1 - ueberhaupt nicht variantenreich; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4 - sehr variantenreich

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenMethMoniVari_1	43	2.95	0.79

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - ueberhaupt nicht variantenreich	2.3	1.4
2	2	25.6	15.9
3	3	46.5	29.0
4	4 - sehr variantenreich	25.6	15.9
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.199 pKoennenMethMoniVari_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenMethMoniVari_2

Label: [„Erst schneiden wir die Paprika in kleine Wuerfel, damit wir die winzigen Stuecke auf den Teller legen koennen.“] Bitte schaezen Sie bei den folgenden Aussagen ein, wie variantenreich sie grammatisch gesehen sind:

Kategorien: 1 = 1 - ueberhaupt nicht variantenreich; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4 - sehr variantenreich

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenMethMoniVari_2	43	3.51	0.77

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - ueberhaupt nicht variantenreich	2.3	1.4
2	2	9.3	5.8
3	3	23.3	14.5
4	4 - sehr variantenreich	65.1	40.6
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.200 pKoennenMethMoniVari_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenMethMoniVari_3

Label: [„Essen kommen, aber vorher Haende waschen!“] Bitte schaezten Sie bei den folgenden Aussagen ein, wie variantenreich sie grammatisch gesehen sind:

Kategorien: 1 = 1 - ueberhaupt nicht variantenreich; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4 - sehr variantenreich

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenMethMoniVari_3	43	1.67	0.75

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - ueberhaupt nicht variantenreich	48.8	30.4
2	2	34.9	21.7
3	3	16.3	10.1
4	4 - sehr variantenreich	0.0	0.0
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.201 pKoennenMethMoniVari_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenMethMoniVari_4

Label: [„Auf einem Bauernhof gibt es viele Tiere: Kuehe zum Beispiel, und Huehner, oder auch Schweine.“] Bitte schatzen Sie bei den folgenden Aussagen ein, wie variantenreich sie grammatisch gesehen sind:

Kategorien: 1 = 1 - ueberhaupt nicht variantenreich; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4 - sehr variantenreich

Fehlende Werte: -99 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
pKoennenMethMoniVari_4	43	2.60	1.07

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	1 - ueberhaupt nicht variantenreich	16.3	10.1
2	2	34.9	21.7
3	3	20.9	13.0
4	4 - sehr variantenreich	27.9	17.4
-99	missing	–	37.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 43$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 69$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

9.202 pxPhonologie_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxPhonologie_1

Label: Phonologie_1 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxPhonologie_1	44	0.58	0.63	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.

N_{total} = 69.

9.203 pxPhonologie_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxPhonologie_4

Label: Phonologie_4 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxPhonologie_4	44	0.27	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.204 pxPhonologie_5_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxPhonologie_5_1
 Label: SprachKopf_pxPhonologie_5_1
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxPhonologie_5_1	44	1.00	0.00	1.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

9.205 pxPhonologie_5_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxPhonologie_5_2
 Label: SprachKopf_ pxPhonologie_5_2
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxPhonologie_5_2	44	-0.45	0.90	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.206 pxPhonologie_5_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxPhonologie_5_3
 Label: SprachKopf_ pxPhonologie_5_3
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxPhonologie_5_3	44	1.00	0.00	1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.207 pxPhonologie_5_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxPhonologie_5_4
 Label: SprachKopf_pxPhonologie_5_4
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxPhonologie_5_4	44	0.95	0.30	-1.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

9.208 pxPhonologie_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxPhonologie_5

Label: Phonologie_5 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxPhonologie_5	44	0.62	0.22	0.5	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.209 pxPhonologie_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxPhonologie_7

Label: Phonologie_7 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxPhonologie_7	44	0.48	0.66	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

9.210 pxLexikon_2_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxLexikon_2_1
 Label: SprachKopf_ pxLexikon_2_1
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxLexikon_2_1	44	-0.09	1.01	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.211 pxLexikon_2_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxLexikon_2_2
 Label: SprachKopf_ pxLexikon_2_2
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxLexikon_2_2	44	0.86	0.51	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.212 pxLexikon_2_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxLexikon_2_3
 Label: SprachKopf_ pxLexikon_2_3
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxLexikon_2_3	44	0.32	0.96	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.213 pxLexikon_2_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxLexikon_2_4
 Label: SprachKopf_ pxLexikon_2_4
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxLexikon_2_4	44	0.86	0.51	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.214 pxLexikon_2_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxLexikon_2_5
 Label: SprachKopf_ pxLexikon_2_5
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxLexikon_2_5	44	0.77	0.64	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.215 pxLexikon_2_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxLexikon_2_6
 Label: SprachKopf_ pxLexikon_2_6
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxLexikon_2_6	44	0.82	0.58	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.216 pxLexikon_2_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxLexikon_2_7
 Label: SprachKopf_ pxLexikon_2_7
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxLexikon_2_7	44	1.00	0.00	1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.217 pxLexikon_2_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxLexikon_2_8
 Label: SprachKopf_ pxLexikon_2_8
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxLexikon_2_8	44	1.00	0.00	1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.218 pxLexikon_2_9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxLexikon_2_9
 Label: SprachKopf_ pxLexikon_2_9
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxLexikon_2_9	44	0.36	0.94	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.219 pxLexikon_2_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxLexikon_2_10
 Label: SprachKopf_ pxLexikon_2_10
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxLexikon_2_10	44	0.91	0.42	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.220 pxLexikon_2_11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxLexikon_2_11
 Label: SprachKopf_ pxLexikon_2_11
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxLexikon_2_11	44	0.95	0.30	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.221 pxLexikon_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxLexikon_2

Label: Lexikon_2 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxLexikon_2	44	0.71	0.25	0.1	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.

N_{total} = 69.

9.222 pxLexikon_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxLexikon_4

Label: Lexikon_4 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxLexikon_4	44	0.42	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.223 pxLexikon_6_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxLexikon_6_1
 Label: SprachKopf_ pxLexikon_6_1
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxLexikon_6_1	44	0.27	0.97	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.224 pxLexikon_6_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxLexikon_6_2
 Label: SprachKopf_ pxLexikon_6_2
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxLexikon_6_2	44	0.68	0.74	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.225 pxLexikon_6_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxLexikon_6_3
 Label: SprachKopf_ pxLexikon_6_3
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxLexikon_6_3	44	0.00	1.01	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.226 pxLexikon_6_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxLexikon_6_4
 Label: SprachKopf_ pxLexikon_6_4
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxLexikon_6_4	44	0.18	0.99	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.227 pxLexikon_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxLexikon_6

Label: Lexikon_6 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxLexikon_6	44	0.28	0.52	-0.5	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.228 pxMorphologie_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxMorphologie_1

Label: Morphologie_1 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxMorphologie_1	44	0.45	0.66	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

9.229 pxMorphologie_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxMorphologie_4

Label: Morphologie_4 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxMorphologie_4	44	0.52	0.65	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.230 pxMorphologie_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxMorphologie_5

Label: Morphologie_5 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxMorphologie_5	44	0.48	0.66	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.231 pxMorphologie_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxMorphologie_6

Label: Morphologie_6 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxMorphologie_6	44	0.42	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

9.232 pxSyntax_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSyntax_1

Label: Syntax_1 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxSyntax_1	44	0.55	0.64	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.

N_{total} = 69.

9.233 pxSyntax_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSyntax_2

Label: Syntax_2 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxSyntax_2	44	0.79	0.49	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.234 pxSyntax_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSyntax_3

Label: Syntax_3 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxSyntax_3	44	0.61	0.62	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

9.235 pxSyntax_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSyntax_4

Label: Syntax_4 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxSyntax_4	44	0.09	0.63	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.236 pxSyntax_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSyntax_5

Label: Syntax_5 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxSyntax_5	44	0.61	0.62	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

9.237 pxSemantik_Pragmatik_1_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSemantik_Pragmatik_1_1
 Label: SprachKopf_ pxSemantik_Pragmatik_1_1
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxSemantik_Pragmatik_1_1	44	0.50	0.88	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.238 pxSemantik_Pragmatik_1_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSemantik_Pragmatik_1_2
 Label: SprachKopf_ pxSemantik_Pragmatik_1_2
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxSemantik_Pragmatik_1_2	44	0.32	0.96	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.239 pxSemantik_Pragmatik_1_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSemantik_Pragmatik_1_3
 Label: SprachKopf_ pxSemantik_Pragmatik_1_3
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxSemantik_Pragmatik_1_3	44	0.59	0.82	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.240 pxSemantik_Pragmatik_1_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSemantik_Pragmatik_1_4

Label: SprachKopf_ pxSemantik_Pragmatik_1_4

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxSemantik_Pragmatik_1_4	44	0.82	0.58	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.241 pxSemantik_Pragmatik_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSemantik_Pragmatik_1

Label: Semantik_Pragmatik_1 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxSemantik_Pragmatik_1	44	0.56	0.46	-0.5	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

9.242 pxSemantik_Pragmatik_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSemantik_Pragmatik_3

Label: Semantik_Pragmatik_3 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxSemantik_Pragmatik_3	44	0.55	0.64	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

9.243 pxSemantik_Pragmatik_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSemantik_Pragmatik_4

Label: Semantik_Pragmatik_4 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxSemantik_Pragmatik_4	44	0.33	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

9.244 pxSoziolinguistik_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSoziolinguistik_2

Label: Soziolinguistik_2 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxSoziolinguistik_2	44	0.21	0.66	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

9.245 pxSoziolinguistik_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSoziolinguistik_3

Label: Soziolinguistik_3 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxSoziolinguistik_3	44	0.36	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

9.246 pxSoziolinguistik_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSoziolinguistik_4

Label: Soziolinguistik_4 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxSoziolinguistik_4	44	0.67	0.58	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

9.247 pxErwerb_1_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_1_1
 Label: SprachKopf_ pxErwerb_1_1
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxErwerb_1_1	44	-0.14	1.00	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.248 pxErwerb_1_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_1_2
 Label: SprachKopf_ pxErwerb_1_2
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxErwerb_1_2	44	0.05	1.01	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.249 pxErwerb_1_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_1_3
 Label: SprachKopf_ pxErwerb_1_3
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxErwerb_1_3	44	0.73	0.69	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.250 pxErwerb_1_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_1_4
 Label: SprachKopf_ pxErwerb_1_4
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxErwerb_1_4	44	0.09	1.01	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.251 pxErwerb_1_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_1_5
 Label: SprachKopf_ pxErwerb_1_5
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxErwerb_1_5	44	-0.32	0.96	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.252 pxErwerb_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_1

Label: Erwerb_1 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxErwerb_1	44	0.08	0.63	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.253 pxErwerb_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_2

Label: Erwerb_2 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxErwerb_2	44	0.09	0.63	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

9.254 pxErwerb_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_3

Label: Erwerb_3 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxErwerb_3	44	0.24	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

9.255 pxErwerb_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_4

Label: Erwerb_4 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxErwerb_4	44	0.48	0.66	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

9.256 pxErwerb_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_5

Label: Erwerb_5 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxErwerb_5	44	0.64	0.60	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

9.257 pxErwerb_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_6

Label: Erwerb_6 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxErwerb_6	44	0.79	0.49	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

9.258 pxErwerb_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_8

Label: Erwerb_8 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxErwerb_8	44	0.42	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

9.259 pxErwerb_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_10

Label: Erwerb_10 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxErwerb_10	44	0.76	0.52	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

9.260 pxErwerb_11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_11

Label: Erwerb_11 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxErwerb_11	44	0.36	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

9.261 pxErwerb_13

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_13

Label: Erwerb_13 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxErwerb_13	44	-0.24	0.34	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.262 pxErwerb_14

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_14

Label: Erwerb_14 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxErwerb_14	44	0.42	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.263 pxErwerb_16_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_16_1
 Label: SprachKopf_ pxErwerb_16_1
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxErwerb_16_1	44	0.09	1.01	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.264 pxErwerb_16_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_16_2
 Label: SprachKopf_ pxErwerb_16_2
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxErwerb_16_2	44	1.00	0.00	1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.265 pxErwerb_16_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_16_3
 Label: SprachKopf_ pxErwerb_16_3
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxErwerb_16_3	44	0.59	0.82	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.266 pxErwerb_16_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_16_4
 Label: SprachKopf_ pxErwerb_16_4
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxErwerb_16_4	44	0.91	0.42	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.267 pxErwerb_16_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_16_5
 Label: SprachKopf_ pxErwerb_16_5
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxErwerb_16_5	44	0.82	0.58	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.268 pxErwerb_16

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_16

Label: Erwerb_16 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxErwerb_16	44	0.68	0.25	-0.2	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

9.269 pxErwerb_17

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_17

Label: Erwerb_17 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxErwerb_17	44	0.30	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

9.270 pxErwerb_19

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_19

Label: Erwerb_19 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxErwerb_19	44	0.18	0.66	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

9.271 pxErwerb_31

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_31

Label: Erwerb_31 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxErwerb_31	44	0.90	0.38	-0.5	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

9.272 pxErwerb_24_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_24_1
 Label: SprachKopf_ pxErwerb_24_1
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxErwerb_24_1	44	0.91	0.42	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.273 pxErwerb_24_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_24_2
 Label: SprachKopf_ pxErwerb_24_2
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxErwerb_24_2	44	0.05	1.01	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.274 pxErwerb_24_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_24_3
 Label: SprachKopf_ pxErwerb_24_3
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxErwerb_24_3	44	0.36	0.94	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.275 pxErwerb_24_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_24_4
 Label: SprachKopf_ pxErwerb_24_4
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxErwerb_24_4	44	0.86	0.51	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.276 pxErwerb_24

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_24

Label: Erwerb_24 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxErwerb_24	44	0.55	0.35	0.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

9.277 pxErwerb_25

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_25

Label: Erwerb_25 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxErwerb_25	44	0.33	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

9.278 pxErwerb_26

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_26

Label: Erwerb_26 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxErwerb_26	44	0.30	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

9.279 pxErwerb_28_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_28_1
 Label: SprachKopf_ pxErwerb_28_1
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxErwerb_28_1	44	0.00	1.01	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.280 pxErwerb_28_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_28_2
 Label: SprachKopf_ pxErwerb_28_2
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxErwerb_28_2	44	0.91	0.42	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.281 pxErwerb_28_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_28_3
 Label: SprachKopf_ pxErwerb_28_3
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxErwerb_28_3	44	0.59	0.82	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.282 pxErwerb_28_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_28_4
 Label: SprachKopf_ pxErwerb_28_4
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxErwerb_28_4	44	0.23	0.99	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.283 pxErwerb_28_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_28_5
 Label: SprachKopf_ pxErwerb_28_5
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxErwerb_28_5	44	0.77	0.64	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.284 pxErwerb_28_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_28_6
 Label: SprachKopf_ pxErwerb_28_6
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxErwerb_28_6	44	0.86	0.51	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.285 pxErwerb_28

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_28

Label: Erwerb_28 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxErwerb_28	44	0.56	0.33	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.286 pxErwerb_29

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_29

Label: Erwerb_29 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxErwerb_29	44	0.55	0.64	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.287 pxErwerb_30

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxErwerb_30

Label: Erwerb_30 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxErwerb_30	44	0.42	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

9.288 pxSprachdiagnostik_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSprachdiagnostik_1

Label: Sprachdiagnostik_1 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxSprachdiagnostik_1	44	0.45	0.66	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.

N_{total} = 69.

9.289 pxSprachdiagnostik_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSprachdiagnostik_2

Label: Sprachdiagnostik_2 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxSprachdiagnostik_2	44	0.58	0.63	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

9.290 pxSprachdiagnostik_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSprachdiagnostik_4

Label: Sprachdiagnostik_4 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxSprachdiagnostik_4	44	0.55	0.64	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

9.291 pxSprachdiagnostik_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSprachdiagnostik_5

Label: Sprachdiagnostik_5 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxSprachdiagnostik_5	44	0.24	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

9.292 pxSprachdiagnostik_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSprachdiagnostik_6

Label: Sprachdiagnostik_6 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxSprachdiagnostik_6	44	0.45	0.66	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

9.293 pxSprachdiagnostik_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSprachdiagnostik_7

Label: Sprachdiagnostik_7 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxSprachdiagnostik_7	43	0.50	0.65	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.294 pxSprachdiagnostik_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSprachdiagnostik_8

Label: Sprachdiagnostik_8 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxSprachdiagnostik_8	43	0.32	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.295 pxSprachdiagnostik_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSprachdiagnostik_10

Label: Sprachdiagnostik_10 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxSprachdiagnostik_10	43	0.88	0.39	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.296 pxSprachdiagnostik_12

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSprachdiagnostik_12

Label: Sprachdiagnostik_12 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxSprachdiagnostik_12	43	0.66	0.59	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

9.297 pxSprachdiagnostik_13

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSprachdiagnostik_13

Label: Sprachdiagnostik_13 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxSprachdiagnostik_13	43	0.75	0.52	-0.3	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

9.298 pxSprachdiagnostik_14_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSprachdiagnostik_14_1
 Label: SprachKopf_ pxSprachdiagnostik_14_1
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxSprachdiagnostik_14_1	44	1.00	0.00	1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.299 pxSprachdiagnostik_14_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSprachdiagnostik_14_2
 Label: SprachKopf_ pxSprachdiagnostik_14_2
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxSprachdiagnostik_14_2	44	0.59	0.82	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.300 pxSprachdiagnostik_14_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSprachdiagnostik_14_3

Label: SprachKopf_ pxSprachdiagnostik_14_3

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxSprachdiagnostik_14_3	44	0.18	0.99	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.301 pxSprachdiagnostik_14_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSprachdiagnostik_14_4

Label: SprachKopf_ pxSprachdiagnostik_14_4

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxSprachdiagnostik_14_4	44	0.95	0.30	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.302 pxSprachdiagnostik_14_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSprachdiagnostik_14_5
 Label: SprachKopf_ pxSprachdiagnostik_14_5
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxSprachdiagnostik_14_5	44	0.64	0.78	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.303 pxSprachdiagnostik_14_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSprachdiagnostik_14_6
 Label: SprachKopf_ pxSprachdiagnostik_14_6
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxSprachdiagnostik_14_6	44	-0.23	0.99	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.304 pxSprachdiagnostik_14_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSprachdiagnostik_14_7
 Label: SprachKopf_ pxSprachdiagnostik_14_7
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxSprachdiagnostik_14_7	44	1.00	0.00	1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.305 pxSprachdiagnostik_14_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSprachdiagnostik_14_8
 Label: SprachKopf_ pxSprachdiagnostik_14_8
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxSprachdiagnostik_14_8	44	0.68	0.74	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.306 pxSprachdiagnostik_14

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSprachdiagnostik_14

Label: Sprachdiagnostik_14 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxSprachdiagnostik_14	44	0.61	0.33	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.307 pxSprachdiagnostik_15_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSprachdiagnostik_15_1
 Label: SprachKopf_ pxSprachdiagnostik_15_1
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxSprachdiagnostik_15_1	44	0.18	0.99	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.308 pxSprachdiagnostik_15_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSprachdiagnostik_15_2
 Label: SprachKopf_ pxSprachdiagnostik_15_2
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxSprachdiagnostik_15_2	44	-0.23	0.99	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.309 pxSprachdiagnostik_15_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSprachdiagnostik_15_3
 Label: SprachKopf_ pxSprachdiagnostik_15_3
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxSprachdiagnostik_15_3	44	0.55	0.85	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.310 pxSprachdiagnostik_15_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSprachdiagnostik_15_4
 Label: SprachKopf_ pxSprachdiagnostik_15_4
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxSprachdiagnostik_15_4	44	0.86	0.51	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.311 pxSprachdiagnostik_15_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSprachdiagnostik_15_5
 Label: SprachKopf_ pxSprachdiagnostik_15_5
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxSprachdiagnostik_15_5	44	0.05	1.01	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.312 pxSprachdiagnostik_15_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSprachdiagnostik_15_6
 Label: SprachKopf_ pxSprachdiagnostik_15_6
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxSprachdiagnostik_15_6	44	0.32	0.96	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.313 pxSprachdiagnostik_15

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxSprachdiagnostik_15

Label: Sprachdiagnostik_15 ratekorrigiert

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxSprachdiagnostik_15	44	0.29	0.55	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.314 pxKoennenMethSprBerPhon_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethSprBerPhon_1
 Label: SprachKopf_ pxKoennenMethSprBerPhon_1
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenMethSprBerPhon_1	43	0.11	0.84	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.315 pxKoennenMethSprBerPhon_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethSprBerPhon_2
 Label: SprachKopf_ pxKoennenMethSprBerPhon_2
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenMethSprBerPhon_2	43	0.59	0.59	-0.2	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.316 pxKoennenMethSprBerPhon_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethSprBerPhon_3
 Label: SprachKopf_ pxKoennenMethSprBerPhon_3
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenMethSprBerPhon_3	43	0.03	0.83	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.317 pxKoennenMethSprBerPhon_6_AL

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethSprBerPhon_6_AL

Label: SprachKopf_ pxKoennenMethSprBerPhon_6_AL

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenMethSprBerPhon_6_AL	43	0.22	0.84	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.318 pxKoennenMethSprBerPhon_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethSprBerPhon_7
 Label: SprachKopf_ pxKoennenMethSprBerPhon_7
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenMethSprBerPhon_7	43	0.24	0.62	-0.2	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.319 pxKoennenMethSprBerPhon_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethSprBerPhon_8
 Label: SprachKopf_ pxKoennenMethSprBerPhon_8
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenMethSprBerPhon_8	43	0.19	0.84	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.320 pxKoennenMethSprBerPhon

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethSprBerPhon
 Label: SprachKopf_ pxKoennenMethSprBerPhon
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenMethSprBerPhon	43	0.23	0.47	-0.5	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.321 pxStratKomm_Team2_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxStratKomm_Team2_1
 Label: SprachKopf_ pxStratKomm_Team2_1
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxStratKomm_Team2_1	43	0.88	0.37	-0.2	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

9.322 pxStratKomm_Team2_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxStratKomm_Team2_2
 Label: SprachKopf_ pxStratKomm_Team2_2
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxStratKomm_Team2_2	43	0.51	0.62	-0.2	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

9.323 pxStratKomm_Team2_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxStratKomm_Team2_3
 Label: SprachKopf_ pxStratKomm_Team2_3
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxStratKomm_Team2_3	43	0.59	0.59	-0.2	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

9.324 pxStratKomm_Team2_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxStratKomm_Team2_4
 Label: SprachKopf_ pxStratKomm_Team2_4
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxStratKomm_Team2_4	43	-0.24	0.74	-0.7	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

9.325 pxStratKomm_Team2_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxStratKomm_Team2_5
 Label: SprachKopf_ pxStratKomm_Team2_5
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxStratKomm_Team2_5	43	0.38	0.82	-0.7	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

9.326 pxStratKomm_Team2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxStratKomm_Team2
 Label: SprachKopf_ pxStratKomm_Team2
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxStratKomm_Team2	43	0.42	0.26	-0.2	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.327 pxKoennenStrategieFiltr_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenStrategieFiltr_1
 Label: SprachKopf_ pxKoennenStrategieFiltr_1
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenStrategieFiltr_1	40	-0.50	0.88	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.328 pxKoennenStrategieFiltr_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenStrategieFiltr_2
 Label: SprachKopf_ pxKoennenStrategieFiltr_2
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenStrategieFiltr_2	40	0.40	0.93	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.329 pxKoennenStrategieFiltr_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenStrategieFiltr_3
 Label: SprachKopf_ pxKoennenStrategieFiltr_3
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenStrategieFiltr_3	40	0.00	1.01	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.330 pxKoennenStrategieFiltr_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenStrategieFiltr_4
 Label: SprachKopf_ pxKoennenStrategieFiltr_4
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenStrategieFiltr_4	40	0.45	0.90	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.331 pxKoennenStrategieFiltr_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenStrategieFiltr_5
 Label: SprachKopf_ pxKoennenStrategieFiltr_5
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenStrategieFiltr_5	40	0.90	0.44	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.332 pxKoennenStrategieFiltr_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenStrategieFiltr_6
 Label: SprachKopf_ pxKoennenStrategieFiltr_6
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenStrategieFiltr_6	40	0.65	0.77	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.333 pxKoennenStrategieFiltr_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenStrategieFiltr_7
 Label: SprachKopf_ pxKoennenStrategieFiltr_7
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenStrategieFiltr_7	40	0.65	0.77	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.334 pxKoennenStrategieFiltr_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenStrategieFiltr_8
 Label: SprachKopf_ pxKoennenStrategieFiltr_8
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenStrategieFiltr_8	40	0.80	0.61	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.335 pxKoennenStrategieFiltr_9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenStrategieFiltr_9
 Label: SprachKopf_ pxKoennenStrategieFiltr_9
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenStrategieFiltr_9	40	0.00	1.01	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.336 pxKoennenStrategieFiltr_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenStrategieFiltr_10
 Label: SprachKopf_ pxKoennenStrategieFiltr_10
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenStrategieFiltr_10	40	0.65	0.77	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.337 pxKoennenStrategieFiltr_11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenStrategieFiltr_11
 Label: SprachKopf_ pxKoennenStrategieFiltr_11
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenStrategieFiltr_11	40	0.95	0.32	-1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.338 pxKoennenStrategieFiltr

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenStrategieFiltr
 Label: SprachKopf_ pxKoennenStrategieFiltr
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxKoennenStrategieFiltr	31	0.50	0.24	-0.1	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

9.339 pxKoennenStraPlanVWort

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenStraPlanVWort
 Label: SprachKopf_ pxKoennenStraPlanVWort
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenStraPlanVWort	43	0.01	0.51	-0.2	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.340 pxKoennenMethSprBerPraep_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethSprBerPraep_1
 Label: SprachKopf_ pxKoennenMethSprBerPraep_1
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenMethSprBerPraep_1	43	-0.05	0.82	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.341 pxKoennenMethSprBerPraep_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethSprBerPraep_2
 Label: SprachKopf_ pxKoennenMethSprBerPraep_2
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenMethSprBerPraep_2	43	0.33	0.63	-0.2	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.342 pxKoennenMethSprBerPraep_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethSprBerPraep_3
 Label: SprachKopf_ pxKoennenMethSprBerPraep_3
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenMethSprBerPraep_3	43	0.73	0.62	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.343 pxKoennenMethSprBerPraep_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethSprBerPraep_4
 Label: SprachKopf_ pxKoennenMethSprBerPraep_4
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenMethSprBerPraep_4	43	0.11	0.84	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.344 pxKoennenMethSprBerPraep_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethSprBerPraep_5
 Label: SprachKopf_ pxKoennenMethSprBerPraep_5
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenMethSprBerPraep_5	43	0.39	0.63	-0.2	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.345 pxKoennenMethSprBerPraep_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethSprBerPraep_6
 Label: SprachKopf_ pxKoennenMethSprBerPraep_6
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenMethSprBerPraep_6	43	0.27	0.62	-0.2	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.346 pxKoennenMethSprBerPraep_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethSprBerPraep_7
 Label: SprachKopf_ pxKoennenMethSprBerPraep_7
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenMethSprBerPraep_7	43	0.53	0.61	-0.2	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.347 pxKoennenMethSprBerPraep_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethSprBerPraep_8
 Label: SprachKopf_ pxKoennenMethSprBerPraep_8
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenMethSprBerPraep_8	43	0.42	0.63	-0.2	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.348 pxKoennenMethSprBerPraep

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethSprBerPraep
 Label: SprachKopf_ pxKoennenMethSprBerPraep
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenMethSprBerPraep	43	0.34	0.36	-0.4	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.349 pxKoennenDiagnSynDaM_01

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenDiagnSynDaM_01
 Label: SprachKopf_ pxKoennenDiagnSynDaM_01
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenDiagnSynDaM_01	43	0.22	0.84	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.350 pxKoennenBerichtInfo_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenBerichtInfo_4
 Label: SprachKopf_ pxKoennenBerichtInfo_4
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenBerichtInfo_4	43	0.46	0.79	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.351 pxKoennenBerichtInfo_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenBerichtInfo_5
 Label: SprachKopf_ pxKoennenBerichtInfo_5
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenBerichtInfo_5	43	-0.09	0.80	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.352 pxKoennenBerichtInfo_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenBerichtInfo_7
 Label: SprachKopf_ pxKoennenBerichtInfo_7
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenBerichtInfo_7	43	0.39	0.63	-0.2	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.353 pxKoennenBerichtInfo

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenBerichtInfo
 Label: SprachKopf_ pxKoennenBerichtInfo
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenBerichtInfo	43	0.25	0.43	-0.5	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.354 pxKoennenMethodikSelek1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethodikSelek1
 Label: SprachKopf_ pxKoennenMethodikSelek1
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxKoennenMethodikSelek1	43	0.13	0.52	-0.2	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

9.355 pxKoennenDiagnSynDaZ_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenDiagnSynDaZ_1
 Label: SprachKopf_ pxKoennenDiagnSynDaZ_1
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenDiagnSynDaZ_1	43	0.37	0.69	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.356 pxStrategie_L1_L2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxStrategie_L1_L2
 Label: SprachKopf_ pxStrategie_L1_L2
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxStrategie_L1_L2	43	0.63	0.61	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.357 pnKoennenStrategieRefl_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pnKoennenStrategieRefl_1

Label: Selbst Notizen waehrend der Sprachfoerderung machen

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pnKoennenStrategieRefl_1	43	3.86	1.21	1.0	5.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 69.

9.358 pnKoennenStrategieRefl_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pnKoennenStrategieRefl_2

Label: Kollegin beobachtet und berichtet danach

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pnKoennenStrategieRefl_2	43	3.26	1.31	1.0	5.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.359 pnKoennenStrategieRefl_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pnKoennenStrategieRefl_3

Label: Kollegin notiert Dialoge

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pnKoennenStrategieRefl_3	43	2.56	0.96	1.0	4.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 69.

9.360 pnKoennenStrategieRefl_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pnKoennenStrategieRefl_4

Label: Audio/Video-Aufnahme

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pnKoennenStrategieRefl_4	43	2.09	1.23	1.0	5.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.361 pnKoennenStrategieRefl_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pnKoennenStrategieRefl_5

Label: Fortbildung zu Sprachfoerderung machen

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pnKoennenStrategieRefl_5	43	3.23	1.65	1.0	5.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.362 pxKoennenStrategieRefl_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenStrategieRefl_3
 Label: SprachKopf_ pxKoennenStrategieRefl_3
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenStrategieRefl_3	43	0.07	0.84	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.363 pxKoennenStrategieRefl_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenStrategieRefl_4
 Label: SprachKopf_ pxKoennenStrategieRefl_4
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenStrategieRefl_4	43	0.46	0.79	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.364 pxKoennenStrategieRefl_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenStrategieRefl_5
 Label: SprachKopf_ pxKoennenStrategieRefl_5
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenStrategieRefl_5	43	0.19	0.84	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.365 pxKoennenStrategieRefl

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenStrategieRefl
 Label: SprachKopf_ pxKoennenStrategieRefl
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
pxKoennenStrategieRefl	43	0.24	0.51	-0.7	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 69$.

9.366 pKoennenStraPlanWort_S

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenStraPlanWort_S
 Label: SprachKopf_ pKoennenStraPlanWort_S
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pKoennenStraPlanWort_S	44	0.98	0.15	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.367 pKoennenStraPlanWort_A

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenStraPlanWort_A
 Label: SprachKopf_ pKoennenStraPlanWort_A
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pKoennenStraPlanWort_A	44	0.61	0.49	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.368 pKoennenStraPlanWort_V

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pKoennenStraPlanWort_V
 Label: SprachKopf_ pKoennenStraPlanWort_V
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pKoennenStraPlanWort_V	44	0.34	0.48	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.369 pxKoennenStraPlanWortgruppen

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenStraPlanWortgruppen
 Label: SprachKopf_ pxKoennenStraPlanWortgruppen
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenStraPlanWortgruppen	44	0.49	0.37	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.370 pxKoennenDiagnPhon_01

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenDiagnPhon_01
 Label: SprachKopf_ pxKoennenDiagnPhon_01
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenDiagnPhon_01	43	0.08	0.69	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.371 pxKoennenStraPlankeinD

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenStraPlankeinD
 Label: SprachKopf_ pxKoennenStraPlankeinD
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenStraPlankeinD	43	0.47	0.60	-0.2	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.372 pxKoennenMethMonitReflx_1_AL

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethMonitReflx_1_AL

Label: SprachKopf_ pxKoennenMethMonitReflx_1_AL

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenMethMonitReflx_1_AL	39	-0.38	1.23	-1.5	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.373 pxKoennenMethMonitReflx_3_AL

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethMonitReflx_3_AL

Label: SprachKopf_ pxKoennenMethMonitReflx_3_AL

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenMethMonitReflx_3_AL	39	0.18	0.74	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.374 pxKoennenMethMonitReflxAL

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethMonitReflxAL
 Label: SprachKopf_ pxKoennenMethMonitReflxAL
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenMethMonitReflxAL	30	-0.11	0.39	-1.1	0.8

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.375 pxKoennenMethodikAnpass_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethodikAnpass_1
 Label: SprachKopf_ pxKoennenMethodikAnpass_1
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenMethodikAnpass_1	43	-0.51	1.24	-1.5	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.376 pxKoennenMethodikAnpass_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethodikAnpass_2
 Label: SprachKopf_ pxKoennenMethodikAnpass_2
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenMethodikAnpass_2	43	-0.10	1.26	-1.5	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.377 pxKoennenMethodikAnpass_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethodikAnpass_3
 Label: SprachKopf_ pxKoennenMethodikAnpass_3
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenMethodikAnpass_3	43	0.46	0.79	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.378 pxKoennenMethodikAnpass_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethodikAnpass_4
 Label: SprachKopf_ pxKoennenMethodikAnpass_4
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenMethodikAnpass_4	43	0.34	0.82	-0.7	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.379 pxKoennenMethodikAnpass_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethodikAnpass_6
 Label: SprachKopf_ pxKoennenMethodikAnpass_6
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenMethodikAnpass_6	43	0.53	0.61	-0.2	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.380 pxKoennenMethodikAnpass_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethodikAnpass_7
 Label: SprachKopf_ pxKoennenMethodikAnpass_7
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenMethodikAnpass_7	43	0.24	0.62	-0.2	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.381 pxKoennenMethodikAnpass

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethodikAnpass
 Label: SprachKopf_ pxKoennenMethodikAnpass
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenMethodikAnpass	43	0.16	0.36	-0.4	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.382 pxKoennenDiagSelektion

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenDiagSelektion
 Label: SprachKopf_ pxKoennenDiagSelektion
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenDiagSelektion	43	0.48	0.19	0.2	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.383 pxKoennenMethMoniVari_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethMoniVari_1
 Label: SprachKopf_ pxKoennenMethMoniVari_1
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenMethMoniVari_1	43	0.29	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.384 pxKoennenMethMoniVari_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethMoniVari_2
 Label: SprachKopf_ pxKoennenMethMoniVari_2
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenMethMoniVari_2	43	0.53	0.64	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.385 pxKoennenMethMoniVari_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethMoniVari_3
 Label: SprachKopf_ pxKoennenMethMoniVari_3
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenMethMoniVari_3	43	0.32	0.67	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.386 pxKoennenMethMoniVari_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethMoniVari_4

Label: SprachKopf_ pxKoennenMethMoniVari_4

Quelle: Thoma & Tracy, 2015

Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenMethMoniVari_4	43	0.13	0.64	-0.3	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.387 pxKoennenMethMoniVari

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: pxKoennenMethMoniVari
 Label: SprachKopf_ pxKoennenMethMoniVari
 Quelle: Thoma & Tracy, 2015
 Fehlende Werte: -99 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
pxKoennenMethMoniVari	43	0.32	0.28	-0.3	0.7

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 69.

9.388 filter__

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: filter__

Label: PraePost = 1 (FILTER)

II AGTB

II AGTB

1 Allgemeine Infos

1.1 Code

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Code

Label: t1PB Versuchspersonencode

II AGTB

1 ALLGEMEINE INFOS

1.2 t1AGTBBemerk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1AGTBBemerk
Label: t1AGTB Bemerkungen
Variablentyp: Zeichenfolge
Quelle: Hasselhorn et al., 2012

II AGTB

1 ALLGEMEINE INFOS

1.3 t1AGTBGebdat

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1AGTBGebdat

Label: t1AGTB Geburtsdatum, das vom TL eingegeben. ACHTUNG: NICHT zur
Altersberechnung verwenden weil evtl. FALSCH

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

II AGTB

1 ALLGEMEINE INFOS

1.4 t1AGTBGebdat_FDZ

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1AGTBGebdat_FDZ

Label: t1AGTB Geburtsdatum, das vom TL eingegeben. ACHTUNG: NICHT zur Altersberechnung verwenden weil evtl. FALSCH (zur Anonymisierung aggregiert (FDZ))

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

II AGTB

1 ALLGEMEINE INFOS

1.5 t1AGTBTestdat

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1AGTBTestdat
Label: t1AGTB Testdatum
Variablentyp: Zeichenfolge
Quelle: Hasselhorn et al., 2012

II AGTB

1 ALLGEMEINE INFOS

1.6 t1AGTBTestdat2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1AGTBTestdat2

Label: t1AGTB Testdatum 2. Testtag (falls vorhanden wegen Nachholtermin)

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

II AGTB

1 ALLGEMEINE INFOS

1.7 t1AGTBAbbruch

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1AGTBAbbruch
Label: t1AGTB Bearbeitung abgebrochen
Quelle: Hasselhorn et al., 2012
Kategorien: 0 = *kein Abbruch*; 1 = *Abbruch nach wv*; 2 = *Abbruch nach zv*; 3 = *Abbruch nach wr*; 4 = *Aufgabe gar nicht durchgeführt*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1AGTBAbbruch	305	0.29	0.93

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Abbruch	89.8	89.8
1	Abbruch nach wv	1.3	1.3
2	Abbruch nach zv	2.6	2.6
3	Abbruch nach wr	2.3	2.3
4	Aufgabe gar nicht durchgeführt	3.9	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

II AGTB

1 ALLGEMEINE INFOS

1.8 t1AGTBNachtestung

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1AGTBNachtestung
Label: t1AGTB Nachtestung: Wurden einzelne Subtests bei dem Kind wiederholt?
Quelle: Hasselhorn et al., 2012
Kategorien: 0 = *keine Nachtestung*; 1 = *Nachtestung*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1AGTBNachtestung	294	0.11	0.32

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	keine Nachtestung	88.8	85.6
1	Nachtestung	11.2	10.8
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

II AGTB

1 ALLGEMEINE INFOS

1.9 t1AGTBVoll

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1AGTBVoll
Label: t2AGTB Daten vollstaendig?
Quelle: Hasselhorn et al., 2012
Kategorien: 0 = *AGTB unvollstaendig*; 1 = *AGTB vollstaendig*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1AGTBVoll	293	0.94	0.25

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	AGTB unvollstaendig	6.5	6.2
1	AGTB vollstaendig	93.5	89.8
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2 AGTB Testzeitpunkt 1

2.1 t1wv_ma1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_ma1

Label: t1AGTB Wortspanne vorwaerts AUFFAELLIGER RW, ggf. fehlendes
Instruktionsverstaendnis: Mittelwert aller relevanten Serien = 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *nicht auffaellig*; 1 = *auffaellig*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_ma1	293	0.04	0.19

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	nicht auffaellig	96.2	92.5
1	auffaellig	3.8	3.6
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

II AGTB

2 AGTB TESTZEITPUNKT 1

2.2 t1zv_ma1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_ma1
 Label: t1AGTB Ziffernschritte vorwärts AUFFAELLIGER RW, ggf. fehlendes
 Instruktionsverständnis: Mittelwert aller relevanten Serien = 1
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *nicht auffällig*; 1 = *auffällig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_ma1	289	0.03	0.16

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	nicht auffällig	97.2	92.1
1	auffällig	2.8	2.6
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

II AGTB

2 AGTB TESTZEITPUNKT 1

2.3 t1wr_ma1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_ma1

Label: t1AGTB Wortspanne ruckwaerts AUFFAELLIGER RW, ggf. fehlendes
Instruktionsverstaendnis: Mittelwert aller relevanten Serien = 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *nicht auffaellig*; 1 = *auffaellig*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_ma1	280	0.14	0.35

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	nicht auffaellig	85.7	78.7
1	auffaellig	14.3	13.1
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

II AGTB

2 AGTB TESTZEITPUNKT 1

2.4 t1zr_ma1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_ma1

Label: t1AGTB Ziffernschritte rückwärts AUFFAELLIGER RW, ggf. fehlendes
Instruktionsverständnis: Mittelwert aller relevanten Serien = 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *nicht auffällig*; 1 = *auffällig*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_ma1	274	0.15	0.36

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	nicht auffällig	85.0	76.4
1	auffällig	15.0	13.4
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

II AGTB

2 AGTB TESTZEITPUNKT 1

2.5 t1AGTB_age

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1AGTB_age

Label: Alter bei AGTB Testung in Monaten (abgerundet)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1AGTB_age	295	67.62	3.86	59.0	81.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

II AGTB

2 AGTB TESTZEITPUNKT 1

2.6 t1AGTB_age2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1AGTB_age2

Label: Alter bei AGTB Testung in Monaten (abgerundet) bei Nachholtermin

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1AGTB_age2	34	68.18	4.09	60.0	79.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

II AGTB

2 AGTB TESTZEITPUNKT 1

2.7 t1AG_ageAG

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1AG_ageAG

Label: Alter unter dem das Kind mit der AGTB getestet wurde

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1AG_ageAG	294	67.95	4.39	57.0	81.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

II AGTB

2 AGTB TESTZEITPUNKT 1

2.8 t1agtbage

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1agtbage

Label: Alterskategorie fuer AGTB Normen

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 1 = 5;0 - 5;5; 2 = 5;6 - 5;11; 3 = 6;0 - 6;5; 4 = 6;6 - 6;11; 5 = 7;0 - 7;5;
6 = 7;6 - 7;11; 7 = 8;0 - 8;11; 8 = 9;0 - 9;11; 9 = 10;0 - 10;11; 10 = 11;0 -
11;11; 11 = 12;0 - 12;11

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
t1agtbage	295	1.86	0.69

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	5;0 - 5;5	30.5	29.5
2	5;6 - 5;11	53.2	51.5
3	6;0 - 6;5	15.6	15.1
4	6;6 - 6;11	0.7	0.7
5	7;0 - 7;5	0.0	0.0
6	7;6 - 7;11	0.0	0.0
7	8;0 - 8;11	0.0	0.0
8	9;0 - 9;11	0.0	0.0
9	10;0 - 10;11	0.0	0.0
10	11;0 - 11;11	0.0	0.0
11	12;0 - 12;11	0.0	0.0

Fortsetzung auf der nächsten Seite

II AGTB

2 AGTB TESTZEITPUNKT 1

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	3.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 295$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.9 t1agtbage2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1agtbage2

Label: Alterskategorie fuer AGTB Normen: Nur falls andere Alterskategorie bei
Nachtestung

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 1 = 5;0-5;5; 2 = 5;6-5;11; 3 = 6;0-6;5

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1agtbage2	5	2.40	0.55

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	5;0-5;5	0.0	0.0
2	5;6-5;11	60.0	1.0
3	6;0-6;5	40.0	0.7
-999	missing	–	98.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 5$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.10 t1wr_m4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_m4

Label: t1 Wortspanne einsilbig ruckwaerts: Mittelwert der letzten vier relevanten Serien
(d.h. Item 7-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_m4	280	1.79	0.54

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.11 t1wv_m4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_m4
 Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Mittelwert der letzten vier relevanten Serien (d.h. Item 7-10)
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_m4	293	2.61	0.68

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.12 t1zr_m4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_m4
 Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Mittelwert der letzten vier relevanten Serien (d.h. Item 7-10)
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_m4	274	1.75	0.53

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	—	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.13 t1zv_m4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_m4

Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Mittelwert der letzten vier relevanten Serien (d.h. Item 7-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_m4	289	2.74	0.75

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	—	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.14 t1wr_ca

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_ca
 Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Anzahl richtiger relevanter
 Rekonstruktionen (d.h. aus Item 3-10)
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_ca	280	2.93	1.74

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	—	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.15 t1wr_ls

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_ls
 Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: laengste relevante Serie (d.h. aus Item 3-10)
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_ls	280	2.34	0.74

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.16 t1wr_l2s

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_l2s
 Label: t1 Wortspanne einsilbig ruckwaerts: Mittelwert der beiden laengsten relevanten Serien (d.h. aus Item 3-10)
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_l2s	280	2.24	0.70

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	—	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.17 t1wr_ma

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_ma

Label: t1 Wortspanne einsilbig ruckwaerts: Mittelwert aller relevanten Serien (d.h. Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_ma	280	1.86	0.52

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.18 t1wv_ca

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_ca
 Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Anzahl richtiger relevanter Rekonstruktionen
 (d.h. aus Item 3-10)
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_ca	293	3.71	1.35

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.19 t1wv_ls

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_ls

Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: laengste relevante Serie (d.h. aus Items 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_ls	293	3.30	0.77

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.20 t1wv_l2s

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_l2s
 Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Mittelwert der beiden laengsten relevanten Serien (d.h. aus Item 3-10)
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_l2s	293	3.18	0.72

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.21 t1wv_ma

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_ma
 Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Mittelwert aller relevanten Serien (d.h. Item 3-10)
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_ma	293	2.69	0.64

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.22 t1zr_ca

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_ca
 Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Anzahl richtiger relevanter Rekonstruktionen (d.h. aus Item 3-10)
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_ca	274	3.00	1.69

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.23 t1zr_ls

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_ls
 Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: laengste relevante Serie (d.h. aus Item 3-10)
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_ls	274	2.26	0.74

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.24 t1zr_l2s

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_l2s
 Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Mittelwert der beiden laengsten relevanten Serien
 (d.h. aus Item 3-10)
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_l2s	274	2.16	0.68

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	—	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.25 t1zr_ma

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_ma

Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Mittelwert aller relevanten Serien (d.h. Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_ma	274	1.81	0.52

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.26 t1zv_ca

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_ca
 Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Anzahl richtiger relevanter Rekonstruktionen (d.h. aus Item 3-10)
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_ca	289	3.83	1.28

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	—	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.27 t1zv_ls

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_ls
 Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: laengste relevante Serie (d.h. aus Item 3-10)
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_ls	289	3.36	0.80

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.28 t1zv_l2s

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_l2s
 Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Mittelwert der beiden laengsten relevanten Serien
 (d.h. aus Item 3-10)
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_l2s	289	3.22	0.74

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	—	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.29 t1zv_ma

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_ma

Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Mittelwert aller relevanten Serien (d.h. Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_ma	289	2.78	0.69

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.30 t1wv_s1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_s1

Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Serie (Itemnummer) 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_s1	293	1.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.31 t1wv_s2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_s2
 Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Serie (Itemnummer) 2
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_s2	293	2.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.32 t1wv_s3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_s3

Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Serie (Itemnummer) 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_s3	293	3.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.33 t1wv_s4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_s4
 Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Serie (Itemnummer) 4
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_s4	293	4.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.34 t1wv_s5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_s5
 Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Serie (Itemnummer) 5
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_s5	293	5.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.35 t1wv_s6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_s6
 Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Serie (Itemnummer) 6
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_s6	293	6.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.36 t1wv_s7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_s7
 Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Serie (Itemnummer) 7
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_s7	293	7.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.37 t1wv_s8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_s8
 Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Serie (Itemnummer) 8
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_s8	293	8.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.38 t1wv_s9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_s9
 Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Serie (Itemnummer) 9
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_s9	293	9.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.39 t1wv_s10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_s10

Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Serie (Itemnummer) 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_s10	293	10.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.40 t1wv_l1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_l1
 Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 1
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_l1	293	2.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.41 t1wv_l2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_l2
 Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 2
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_l2	293	2.90	0.30

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.42 t1wv_l3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_l3
 Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 3
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_l3	293	3.29	0.93

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.43 t1wv_l4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_l4
 Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 4
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_l4	293	3.29	0.93

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.44 t1wv_l5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_l5
 Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 5
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_l5	293	3.40	0.85

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.45 t1wv_l6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_l6
 Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 6
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_l6	293	3.40	0.85

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.46 t1wv_l7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_l7
 Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 7
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_l7	293	3.09	0.78

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.47 t1wv_l8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_l8
 Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 8
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_l8	293	3.09	0.78

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.48 t1wv_l9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_l9
 Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 9
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_l9	293	3.14	0.73

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.49 t1wv_l10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_l10

Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_l10	293	3.14	0.73

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.50 t1wv_i1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_i1

Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_i1	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		3.9	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.51 t1wv_i2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_i2

Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 2

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_i2	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		3.9	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.52 t1wv_i3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_i3

Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_i3	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		3.9	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.53 t1wv_i4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_i4

Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 4

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_i4	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		3.9	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.54 t1wv_i5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_i5

Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 5

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_i5	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		3.9	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.55 t1wv_i6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_i6

Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 6

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_i6	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		3.9	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.56 t1wv_i7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_i7

Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 7

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_i7	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		3.9	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.57 t1wv_i8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_i8

Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 8

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_i8	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		3.9	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.58 t1wv_i9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_i9

Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 9

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_i9	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		3.9	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.59 t1wv_i10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_i10

Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_i10	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		3.9	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.60 t1wv_r1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_r1
 Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 1
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_r1	293	0.90	0.30

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	10.2	9.8
1	richtig	89.8	86.2
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.61 t1wv_r2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_r2
 Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 2
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_r2	293	0.67	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	32.8	31.5
1	richtig	67.2	64.6
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.62 t1wv_r3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_r3
 Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 3
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_r3	293	0.52	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	48.1	46.2
1	richtig	51.9	49.8
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.63 t1wv_r4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_r4
 Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 4
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_r4	293	0.55	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	45.1	43.3
1	richtig	54.9	52.8
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.64 t1wv_r5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_r5
 Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 5
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_r5	293	0.41	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	59.4	57.0
1	richtig	40.6	39.0
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.65 t1wv_r6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_r6
 Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 6
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_r6	293	0.24	0.43

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	76.1	73.1
1	richtig	23.9	23.0
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.66 t1wv_r7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_r7
 Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 7
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_r7	293	0.56	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	44.0	42.3
1	richtig	56.0	53.8
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.67 t1wv_r8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_r8
 Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 8
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_r8	293	0.44	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	56.3	54.1
1	richtig	43.7	42.0
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.68 t1wv_r9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_r9
 Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 9
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_r9	293	0.54	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	45.7	43.9
1	richtig	54.3	52.1
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.69 t1wv_r10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_r10

Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wv_r10	293	0.45	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	54.6	52.5
1	richtig	45.4	43.6
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.70 t1zv_s1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_s1
 Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Serie (Itemnummer) 1
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_s1	289	1.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.71 t1zv_s2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_s2
 Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Serie (Itemnummer) 2
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_s2	289	2.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.72 t1zv_s3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_s3
 Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Serie (Itemnummer) 3
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_s3	289	3.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.73 t1zv_s4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_s4
 Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Serie (Itemnummer) 4
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_s4	289	4.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.74 t1zv_s5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_s5
 Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Serie (Itemnummer) 5
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_s5	289	5.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.75 t1zv_s6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_s6
 Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Serie (Itemnummer) 6
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_s6	289	6.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.76 t1zv_s7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_s7
 Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Serie (Itemnummer) 7
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_s7	289	7.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.77 t1zv_s8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_s8
 Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Serie (Itemnummer) 8
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_s8	289	8.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.78 t1zv_s9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_s9
 Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Serie (Itemnummer) 9
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_s9	289	9.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.79 t1zv_s10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_s10
 Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Serie (Itemnummer) 10
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_s10	289	10.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.80 t1zv_l1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_l1
 Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 1
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_l1	289	2.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.81 t1zv_l2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_l2
 Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 2
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_l2	289	2.94	0.24

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.82 t1zv_l3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_l3

Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_l3	289	3.30	0.94

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.83 t1zv_l4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_l4
 Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 4
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_l4	289	3.30	0.94

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.84 t1zv_15

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_15
 Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 5
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_15	289	3.38	0.81

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.85 t1zv_l6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_l6
 Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 6
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_l6	289	3.38	0.81

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.86 t1zv_17

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_17

Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 7

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_17	289	3.27	0.82

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.87 t1zv_l8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_l8

Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 8

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_l8	289	3.27	0.82

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.88 t1zv_l9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_l9

Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 9

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_l9	289	3.25	0.84

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.89 t1zv_l10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_l10
 Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 10
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_l10	289	3.25	0.84

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.90 t1zv_i1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_i1

Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_i1	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		5.2	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.91 t1zv_i2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_i2

Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 2

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_i2	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		5.2	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.92 t1zv_i3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_i3

Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_i3	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		5.2	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.93 t1zv_i4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_i4

Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 4

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_i4	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		5.2	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.94 t1zv_i5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_i5

Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 5

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_i5	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		5.2	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.95 t1zv_i6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_i6

Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 6

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_i6	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		5.2	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.96 t1zv_i7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_i7

Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 7

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_i7	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		5.2	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.97 t1zv_i8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_i8

Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 8

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_i8	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		5.2	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.98 t1zv_i9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_i9

Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 9

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_i9	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		5.2	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.99 t1zv_i10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_i10

Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_i10	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		5.2	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.100 t1zv_r1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_r1

Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_r1	289	0.94	0.24

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	5.9	5.6
1	richtig	94.1	89.2
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.101 t1zv_r2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_r2

Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 2

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_r2	289	0.66	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	33.6	31.8
1	richtig	66.4	63.0
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.102 t1zv_r3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_r3

Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_r3	289	0.55	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	45.0	42.6
1	richtig	55.0	52.1
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.103 t1zv_r4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_r4

Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 4

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_r4	289	0.50	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	50.2	47.5
1	richtig	49.8	47.2
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.104 t1zv_r5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_r5

Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 5

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = falsch; 1 = richtig

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_r5	289	0.39	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	60.6	57.4
1	richtig	39.4	37.4
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.105 t1zv_r6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_r6
 Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 6
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_r6	289	0.46	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	53.6	50.8
1	richtig	46.4	43.9
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.106 t1zv_r7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_r7

Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 7

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_r7	289	0.46	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	54.3	51.5
1	richtig	45.7	43.3
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.107 t1zv_r8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_r8
 Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 8
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_r8	289	0.48	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	51.6	48.9
1	richtig	48.4	45.9
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.108 t1zv_r9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_r9

Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 9

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_r9	289	0.47	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	52.6	49.8
1	richtig	47.4	44.9
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.109 t1zv_r10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_r10

Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zv_r10	289	0.51	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	48.8	46.2
1	richtig	51.2	48.5
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.110 t1wr_s1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_s1

Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_s1	280	1.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.111 t1wr_s2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_s2
 Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 2
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_s2	280	2.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.112 t1wr_s3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_s3

Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_s3	280	3.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.113 t1wr_s4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_s4

Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 4

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_s4	280	4.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.114 t1wr_s5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_s5
 Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 5
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_s5	280	5.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.115 t1wr_s6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_s6
 Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 6
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_s6	280	6.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.116 t1wr_s7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_s7

Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 7

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_s7	280	7.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.117 t1wr_s8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_s8

Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 8

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_s8	280	8.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.118 t1wr_s9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_s9

Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 9

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_s9	280	9.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.119 t1wr_s10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_s10

Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_s10	280	10.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.120 t1wr_l1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_l1
 Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 1
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_l1	280	2.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.121 t1wr_l2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_l2
 Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 2
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_l2	280	2.70	0.46

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.122 t1wr_l3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_l3
 Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 3
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_l3	280	2.53	0.82

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.123 t1wr_l4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_l4
 Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 4
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_l4	280	2.53	0.82

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.124 t1wr_l5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_l5
 Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 5
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_l5	280	2.62	0.52

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.125 t1wr_l6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_l6
 Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 6
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_l6	280	2.62	0.52

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.126 t1wr_l7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_l7
 Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 7
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_l7	280	2.38	0.57

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.127 t1wr_l8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_l8
 Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 8
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_l8	280	2.38	0.57

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.128 t1wr_l9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_l9
 Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 9
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_l9	280	2.46	0.53

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.129 t1wr_l10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_l10

Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_l10	280	2.46	0.53

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.130 t1wr_i1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_i1

Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_i1	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		8.2	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.131 t1wr_i2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_i2

Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 2

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_i2	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		8.2	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.132 t1wr_i3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_i3

Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_i3	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		8.2	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.133 t1wr_i4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_i4

Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 4

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_i4	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		8.2	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.134 t1wr_i5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_i5

Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 5

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_i5	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		8.2	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.135 t1wr_i6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_i6

Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 6

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_i6	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		8.2	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.136 t1wr_i7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_i7

Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 7

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_i7	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		8.2	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.137 t1wr_i8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_i8

Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 8

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_i8	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		8.2	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.138 t1wr_i9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_i9

Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 9

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_i9	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		8.2	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.139 t1wr_i10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_i10

Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_i10	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		8.2	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.140 t1wr_r1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_r1
 Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 1
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_r1	280	0.70	0.46

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	30.4	27.9
1	richtig	69.6	63.9
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.141 t1wr_r2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_r2
 Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 2
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_r2	280	0.32	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	67.9	62.3
1	richtig	32.1	29.5
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.142 t1wr_r3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_r3
 Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 3
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_r3	280	0.44	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	56.4	51.8
1	richtig	43.6	40.0
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.143 t1wr_r4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_r4
 Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 4
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_r4	280	0.45	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	55.4	50.8
1	richtig	44.6	41.0
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.144 t1wr_r5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_r5
 Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 5
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_r5	280	0.31	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	68.6	63.0
1	richtig	31.4	28.9
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.145 t1wr_r6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_r6
 Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 6
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_r6	280	0.24	0.43

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	76.4	70.2
1	richtig	23.6	21.6
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.146 t1wr_r7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_r7
 Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 7
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_r7	280	0.41	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	59.3	54.4
1	richtig	40.7	37.4
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.147 t1wr_r8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_r8
 Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 8
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_r8	280	0.42	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	57.9	53.1
1	richtig	42.1	38.7
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.148 t1wr_r9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_r9
 Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 9
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_r9	280	0.36	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	63.6	58.4
1	richtig	36.4	33.4
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.149 t1wr_r10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wr_r10

Label: t1 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = falsch; 1 = richtig

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1wr_r10	280	0.31	0.46

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	69.3	63.6
1	richtig	30.7	28.2
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.150 t1zr_s1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_s1
 Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 1
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_s1	274	1.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.151 t1zr_s2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_s2
 Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 2
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_s2	274	2.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.152 t1zr_s3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_s3
 Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 3
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_s3	274	3.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.153 t1zr_s4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_s4
 Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 4
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_s4	274	4.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.154 t1zr_s5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_s5
 Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 5
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_s5	274	5.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.155 t1zr_s6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_s6
 Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 6
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_s6	274	6.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.156 t1zr_s7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_s7
 Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 7
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_s7	274	7.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.157 t1zr_s8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_s8
 Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 8
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_s8	274	8.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.158 t1zr_s9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_s9
 Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 9
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_s9	274	9.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.159 t1zr_s10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_s10

Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_s10	274	10.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.160 t1zr_l1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_l1

Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_l1	274	2.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.161 t1zr_l2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_l2

Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 2

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_l2	274	2.76	0.43

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.162 t1zr_l3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_l3

Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_l3	274	2.41	0.76

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.163 t1zr_l4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_l4

Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 4

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_l4	274	2.41	0.76

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.164 t1zr_l5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_l5

Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 5

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_l5	274	2.54	0.56

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.165 t1zr_l6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_l6
 Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 6
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_l6	274	2.54	0.56

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.166 t1zr_l7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_l7
 Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 7
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_l7	274	2.39	0.55

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.167 t1zr_l8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_l8
 Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 8
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_l8	274	2.39	0.55

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.168 t1zr_l9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_l9

Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 9

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_l9	274	2.38	0.54

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.169 t1zr_l10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_l10
 Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 10
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_l10	274	2.38	0.54

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.170 t1zr_i1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_i1

Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_i1	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.2	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.171 t1zr_i2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_i2

Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 2

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_i2	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.2	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.172 t1zr_i3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_i3

Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_i3	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.2	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.173 t1zr_i4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_i4

Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 4

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_i4	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.2	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.174 t1zr_i5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_i5

Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 5

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_i5	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.2	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.175 t1zr_i6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_i6

Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 6

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_i6	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.2	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.176 t1zr_i7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_i7

Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 7

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_i7	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.2	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.177 t1zr_i8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_i8

Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 8

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_i8	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.2	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.178 t1zr_i9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_i9

Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 9

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_i9	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.2	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.179 t1zr_i10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_i10

Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_i10	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.2	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.180 t1zr_r1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_r1

Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_r1	274	0.76	0.43

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	24.1	21.6
1	richtig	75.9	68.2
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.181 t1zr_r2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_r2

Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 2

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_r2	274	0.24	0.43

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	75.5	67.9
1	richtig	24.5	22.0
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.182 t1zr_r3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_r3

Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = falsch; 1 = richtig

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_r3	274	0.45	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	55.5	49.8
1	richtig	44.5	40.0
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.183 t1zr_r4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_r4

Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 4

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = falsch; 1 = richtig

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_r4	274	0.45	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	55.1	49.5
1	richtig	44.9	40.3
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.184 t1zr_r5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_r5
 Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 5
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_r5	274	0.30	0.46

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	69.7	62.6
1	richtig	30.3	27.2
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.185 t1zr_r6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_r6
 Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 6
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_r6	274	0.33	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	67.2	60.3
1	richtig	32.8	29.5
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.186 t1zr_r7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_r7

Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 7

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = falsch; 1 = richtig

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_r7	274	0.33	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	66.8	60.0
1	richtig	33.2	29.8
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.187 t1zr_r8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_r8

Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 8

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_r8	274	0.41	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	59.1	53.1
1	richtig	40.9	36.7
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.188 t1zr_r9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_r9

Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 9

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_r9	274	0.33	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	66.8	60.0
1	richtig	33.2	29.8
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.189 t1zr_r10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_r10
 Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 10
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1zr_r10	274	0.40	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	60.2	54.1
1	richtig	39.8	35.7
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.190 t1zr_l2t

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_l2t

Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: T-Wert basierend auf l2-Rohwert, Normen aus Manual

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1zr_l2t	274	46.75	9.42	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.191 t1wv_l2t

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_l2t

Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: T-Wert basierend auf l2-Rohwert, Normen aus Manual

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1wv_l2t	293	46.18	9.36	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

II AGTB

2 AGTB TESTZEITPUNKT 1

2.192 t1zv_l2t

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_l2t

Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: T-Wert basierend auf l2-Rohwert, Normen aus
Manual

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1zv_l2t	289	46.34	9.69	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.193 t1zr_m4t

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_m4t

Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: T-Wert basierend auf m4-Rohwert, Normen aus Manual

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t1zr_m4t	274	47.18	9.45	29.0	71.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

2.194 t1wv_m4t

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_m4t

Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: T-Wert basierend auf m4-Rohwert, Normen
aus Manual

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1wv_m4t	293	46.37	10.84	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.195 t1zv_m4t

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_m4t

Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: T-Wert basierend auf m4-Rohwert, Normen aus
Manual

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1zv_m4t	289	46.65	10.31	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.196 t1zr_mat

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zr_mat

Label: t1 Zahlenspanne rueckwaerts: T-Wert basierend auf mat-Rohwert, Normen aus Manual

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t1zr_mat	274	46.86	10.31	29.0	71.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

2.197 t1wv_mat

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wv_mat

Label: t1 Wortspanne einsilbig vorwaerts: T-Wert basierend auf mat-Rohwert, Normen aus Manual

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1wv_mat	293	45.80	10.44	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.198 t1zv_mat

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1zv_mat

Label: t1 Zahlenspanne vorwaerts: T-Wert basierend auf mat-Rohwert, Normen aus
Manual

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1zv_mat	289	46.03	10.48	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3 AGTB Testzeitpunkt 2

3.1 t2AGTBDropout

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2AGTBDropout

Label: t2AGTB Daten vorhanden?

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = AGTB MZP2 vorhanden; 1 = AGTB MZP2 fehlt

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2AGTBDropout	305	0.10	0.29

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	AGTB MZP2 vorhanden	90.5	90.5
1	AGTB MZP2 fehlt	9.5	9.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

II AGTB

3 AGTB TESTZEITPUNKT 2

3.2 t2AGTBBemerkungen_speziell

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2AGTBBemerkungen_speziell
Label: t2AGTB Spezielle Bemerkungen
Variablentyp: Zeichenfolge
Quelle: Hasselhorn et al., 2012

II AGTB

3 AGTB TESTZEITPUNKT 2

3.3 t2AGTBGebdat

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2AGTBGebdat

Label: t2AGTB Geburtsdatum vom TL eingegeben. ACHTUNG: NICHT zur Altersberechnung verwenden Alle Kids hatten das gleiche Gebdat erhalten, damit Einstiegslevel fuer KN identisch)

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

II AGTB

3 AGTB TESTZEITPUNKT 2

3.4 t2AGTBGebdat_FDZ

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2AGTBGebdat_FDZ

Label: t2AGTB Geburtsdatum vom TL eingegeben. ACHTUNG: NICHT zur Altersberechnung verwenden Alle Kids hatten das gleiche Gebdat erhalten, damit Einstiegslevel fuer KN identisch) (zur Anonymisierung aggregiert (FDZ))

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

II AGTB

3 AGTB TESTZEITPUNKT 2

3.5 t2AGTBTestdat

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname:	t2AGTBTestdat
Label:	t2AGTB Testdatum
Variablentyp:	Zeichenfolge
Quelle:	Hasselhorn et al., 2012

II AGTB

3 AGTB TESTZEITPUNKT 2

3.6 t2AGTBTestdat2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2AGTBTestdat2
Label: t2AGTB Testdatum Nachholtermin
Variablentyp: Zeichenfolge
Quelle: Hasselhorn et al., 2012

II AGTB

3 AGTB TESTZEITPUNKT 2

3.7 t2AGTBTestdat3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2AGTBTestdat3
Label: t2AGTB Testdatum Nachholtermin
Variablentyp: Zeichenfolge
Quelle: Hasselhorn et al., 2012

II AGTB

3 AGTB TESTZEITPUNKT 2

3.8 t2AGTBAbbruch

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2AGTBAbbruch

Label: t2AGTB Abbruch waehrend der AGTB-Testung?

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

3.9 t2AGTBNachtestung

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2AGTBNachtestung
 Label: t2AGTB Nachtestung durchgeführt?
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *keine Nachtestung*; 1 = *Nachtestung*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2AGTBNachtestung	226	0.26	0.44

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	keine Nachtestung	74.3	55.1
1	Nachtestung	25.7	19.0
-999	missing	–	25.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 226$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.10 t2AGTBVoll

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2AGTBVoll
 Label: t2AGTB Daten vollstaendig?
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *AGTB unvollstaendig*; 1 = *AGTB vollstaendig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2AGTBVoll	226	0.93	0.25

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	AGTB unvollstaendig	6.6	4.9
1	AGTB vollstaendig	93.4	69.2
-999	missing	–	25.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 226$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.11 t2wv_ma1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_ma1

Label: t2AGTB Wortspanne vorwaerts AUFFAELLIGER RW, ggf. fehlendes
Instruktionsverstaendnis: Mittelwert aller relevanten Serien = 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *nicht auffaellig*; 1 = *auffaellig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_ma1	272	0.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	nicht auffaellig	100.0	89.2
1	auffaellig	0.0	0.0
-999	missing	–	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 272$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.12 t2zv_ma1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_ma1

Label: t2AGTB Ziffernschritte vorwärts AUFFAELLIGER RW, ggf. fehlendes
Instruktionsverständnis: Mittelwert aller relevanten Serien = 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *nicht auffaellig*; 1 = *auffaellig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_ma1	270	0.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	nicht auffaellig	100.0	88.5
1	auffaellig	0.0	0.0
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.13 t2wr_ma1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_ma1

Label: t2AGTB Wortspanne ruckwaerts AUFFAELLIGER RW, ggf. fehlendes
Instruktionsverstaendnis: Mittelwert aller relevanten Serien = 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *nicht auffaellig*; 1 = *auffaellig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_ma1	263	0.03	0.17

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	nicht auffaellig	97.0	83.6
1	auffaellig	3.0	2.6
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.14 t2zr_ma1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_ma1

Label: t2AGTB Ziffernschritte rückwärts AUFFAELLIGER RW, ggf. fehlendes
Instruktionsverständnis: Mittelwert aller relevanten Serien = 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *nicht auffällig*; 1 = *auffällig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_ma1	263	0.05	0.21

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	nicht auffällig	95.4	82.3
1	auffällig	4.6	3.9
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

II AGTB

3 AGTB TESTZEITPUNKT 2

3.15 t2AG_age1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2AG_age1

Label: Alter bei AGTB Testung in Monaten (abgerundet)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2AG_age1	276	76.36	3.78	68.0	87.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

II AGTB

3 AGTB TESTZEITPUNKT 2

3.16 t2AG_age2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2AG_age2

Label: Alter bei AGTB Testung in Monaten (abgerundet) bei Nachholtermin1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2AG_age2	58	77.03	3.78	69.0	87.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

II AGTB

3 AGTB TESTZEITPUNKT 2

3.17 t2AG_age3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2AG_age3

Label: Alter bei AGTB Testung in Monaten (abgerundet) bei Nachholtermin2

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2AG_age3	3	78.00	5.57	72.0	83.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.18 t2agtbage1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2agtbage1

Label: AGTB-Altersgruppe anhand des richtigen Geburtstages

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 1 = 5;0 - 5;5; 2 = 5;6 - 5;11; 3 = 6;0 - 6;5; 4 = 6;6 - 6;11; 5 = 7;0 - 7;5;
 6 = 7;6 - 7;11; 7 = 8;0 - 8;11; 8 = 9;0 - 9;11; 9 = 10;0 - 10;11; 10 = 11;0 -
 11;11; 11 = 12;0 - 12;11

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
t2agtbage1	276	3.31	0.69

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	5;0 - 5;5	0.0	0.0
2	5;6 - 5;11	11.2	10.2
3	6;0 - 6;5	48.9	44.3
4	6;6 - 6;11	37.7	34.1
5	7;0 - 7;5	2.2	2.0
6	7;6 - 7;11	0.0	0.0
7	8;0 - 8;11	0.0	0.0
8	9;0 - 9;11	0.0	0.0
9	10;0 - 10;11	0.0	0.0
10	11;0 - 11;11	0.0	0.0
11	12;0 - 12;11	0.0	0.0

Fortsetzung auf der nächsten Seite

II AGTB

3 AGTB TESTZEITPUNKT 2

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	9.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 276$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.19 t2agtbage2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2agtbage2

Label: AGTB-Altersgruppe nachholtestung 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 1 = 5;0 - 5;5; 2 = 5;6 - 5;11; 3 = 6;0 - 6;5; 4 = 6;6 - 6;11; 5 = 7;0 - 7;5;
 6 = 7;6 - 7;11; 7 = 8;0 - 8;11; 8 = 9;0 - 9;11; 9 = 10;0 - 10;11; 10 = 11;0 -
 11;11; 11 = 12;0 - 12;11

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
t2agtbage2	54	3.48	0.67

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	5;0 - 5;5	0.0	0.0
2	5;6 - 5;11	5.6	1.0
3	6;0 - 6;5	44.4	7.9
4	6;6 - 6;11	46.3	8.2
5	7;0 - 7;5	3.7	0.7
6	7;6 - 7;11	0.0	0.0
7	8;0 - 8;11	0.0	0.0
8	9;0 - 9;11	0.0	0.0
9	10;0 - 10;11	0.0	0.0
10	11;0 - 11;11	0.0	0.0
11	12;0 - 12;11	0.0	0.0

Fortsetzung auf der nächsten Seite

II AGTB

3 AGTB TESTZEITPUNKT 2

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	82.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 54$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

II AGTB

3 AGTB TESTZEITPUNKT 2

3.20 t2agtbage3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2agtbage3

Label: AGTB-Altersgruppe Nachholtestung 2

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 1 = 5;0 - 5;5; 2 = 5;6 - 5;11; 3 = 6;0 - 6;5; 4 = 6;6 - 6;11; 5 = 7;0 - 7;5;
6 = 7;6 - 7;11; 7 = 8;0 - 8;11; 8 = 9;0 - 9;11; 9 = 10;0 - 10;11; 10 = 11;0 -
11;11; 11 = 12;0 - 12;11

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
t2agtbage3	3	3.67	0.58

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	5;0 - 5;5	0.0	0.0
2	5;6 - 5;11	0.0	0.0
3	6;0 - 6;5	33.3	0.3
4	6;6 - 6;11	66.7	0.7
5	7;0 - 7;5	0.0	0.0
6	7;6 - 7;11	0.0	0.0
7	8;0 - 8;11	0.0	0.0
8	9;0 - 9;11	0.0	0.0
9	10;0 - 10;11	0.0	0.0
10	11;0 - 11;11	0.0	0.0
11	12;0 - 12;11	0.0	0.0

Fortsetzung auf der nächsten Seite

II AGTB

3 AGTB TESTZEITPUNKT 2

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	99.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 3$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.21 t2agtbagekn

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2agtbagekn

Label: AGTB-Altersgruppe fuer Kunstwoerter Normen (7-Jaehrige bekommen Normen fuer 6;6 bis 6;11)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 1 = 5;0 - 5;5; 2 = 5;6 - 5;11; 3 = 6;0 - 6;5; 4 = 6;6 - 6;11; 5 = 7;0 - 7;5; 6 = 7;6 - 7;11; 7 = 8;0 - 8;11; 8 = 9;0 - 9;11; 9 = 10;0 - 10;11; 10 = 11;0 - 11;11; 11 = 12;0 - 12;11

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
t2agtbagekn	275	3.29	0.67

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	5;0 - 5;5	0.0	0.0
2	5;6 - 5;11	11.3	10.2
3	6;0 - 6;5	49.1	44.3
4	6;6 - 6;11	38.9	35.1
5	7;0 - 7;5	0.7	0.7
6	7;6 - 7;11	0.0	0.0
7	8;0 - 8;11	0.0	0.0
8	9;0 - 9;11	0.0	0.0
9	10;0 - 10;11	0.0	0.0
10	11;0 - 11;11	0.0	0.0
11	12;0 - 12;11	0.0	0.0

Fortsetzung auf der nächsten Seite

II AGTB

3 AGTB TESTZEITPUNKT 2

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.22 t2ar_mat

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar_mat

Label: t2 Artikulationsrate: Mittlerer Zeitdurchschnitt vier kuerzeste Klickzeiten, alle Serien (ms)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ar_mat	273	1218.64	313.19	693.0	3533.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.23 t2ar_mt1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar_mt1

Label: t2 Artikulationsrate: Zeitdurchschnitt vier kuerzeste Klickzeiten, Serie 1 (ms)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ar_mt1	273	1177.30	428.73	627.0	5802.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.24 t2ar_mt2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar_mt2

Label: t2 Artikulationsrate: Zeitdurchschnitt vier kuerzeste Klickzeiten, Serie 2 (ms)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ar_mt2	273	1260.47	335.71	702.0	2807.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.25 t2ar_mt

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar_mt

Label: t2 Artikulationsrate: Mittlere Gesamtzeit Serie 1 und 2 (ms)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ar_mt	273	13921.95	5035.34	7055.0	49020.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.26 t2ar

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar

Label: t2 Artikulationsrate: Silben pro Sekunde Serie 1 und 2

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t2ar	273	2.64	0.54	1.4	4.3

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

3.27 t2ar_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar_1

Label: t2 Artikulationsrate: Silben pro Sekunde Serie 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ar_1	273	2.74	0.66	0.5	4.8

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.28 t2ar_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar_2

Label: t2 Artikulationsrate: Silben pro Sekunde Serie 2

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ar_2	273	2.53	0.58	1.1	4.3

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.29 t2kn_lis

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_lis

Label: t2 Kunstwoerterliste, die Kind bekommen hat

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 1 = *richtige KN-Liste (5-6 Jahre)*; 2 = *falsche KN-Liste (7-9 Jahre)*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_lis	275	1.01	0.09

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	richtige KN-Liste (5-6 Jahre)	99.3	89.5
2	falsche KN-Liste (7-9 Jahre)	0.7	0.7
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.30 t2kn_ca

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_ca

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Anzahl richtiger Items gesamt

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kn_ca	275	16.96	4.13	3.0	24.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.31 t2kn_cla

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_cla

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Anzahl richtig Antworten bei langen Items

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kn_cla	275	4.44	2.03	0.0	8.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.32 t2kn_clm

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_clm

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Anzahl richtig Antworten bei langen modulierten Items

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t2kn_clm	275	1.79	1.19	0.0	4.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

3.33 t2kn_cln

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_cln

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Anzahl richtig Antworten bei langen
nicht-modulierten Items

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kn_cln	275	2.65	1.20	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.34 t2kn_cma

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_cma

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Anzahl richtig Antworten bei mittleren Items

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kn_cma	275	6.05	1.71	1.0	8.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.35 t2kn_cmm

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_cmm

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Anzahl richtig Antworten bei mittleren
modulierten Items

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kn_cmm	275	2.94	1.00	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.36 t2kn_cmn

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_cmn

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Anzahl richtig Antworten bei mittleren
nicht-modulierten Items

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kn_cmn	275	3.11	1.00	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.37 t2kn_csa

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_csa

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Anzahl richtig Antworten bei kurzen Items

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kn_csa	275	6.47	1.27	1.0	8.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.38 t2kn_csm

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_csm

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Anzahl richtig Antworten bei kurzen modulierten Items

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kn_csm	275	3.13	0.87	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.39 t2kn_csn

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_csn

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Anzahl richtig Antworten bei kurzen
nicht-modulierten Items

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t2kn_csn	275	3.33	0.78	0.0	4.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

3.40 t2wr_ca

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_ca

Label: t2 Wortspanne einsilbig ruckwaerts: Anzahl richtiger relevanter
Rekonstruktionen (d.h. aus Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t2wr_ca	263	3.49	1.41	0.0	6.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

3.41 t2wr_ls

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_ls

Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: laengste relevante Serie (d.h. aus Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2wr_ls	263	2.69	0.61	1.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.42 t2wr_l2s

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_l2s

Label: t2 Wortspanne einsilbig ruckwaerts: Mittelwert der beiden laengsten relevanten Serien (d.h. aus Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2wr_l2s	263	2.58	0.57	1.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.43 t2wr_ma

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_ma

Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Mittelwert aller relevanten Serien (d.h. Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2wr_ma	263	2.11	0.43	1.0	3.5

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.44 t2wr_m4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_m4

Label: t2 Wortspanne einsilbig ruckwaerts: Mittelwert der letzten vier relevanten Serien
(d.h. Item 7-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2wr_m4	263	2.01	0.49	1.0	3.2

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.45 t2wv_ca

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_ca

Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Anzahl richtiger relevanter Rekonstruktionen
(d.h. aus Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2wv_ca	272	3.85	1.06	2.0	7.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.46 t2wv_ls

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_ls

Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: laengste relevante Serie (d.h. aus Items 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2wv_ls	272	3.63	0.59	2.0	6.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.47 t2wv_l2s

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_l2s

Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Mittelwert der beiden laengsten relevanten Serien (d.h. aus Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2wv_l2s	272	3.51	0.56	2.0	5.5

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.48 t2wv_ma

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_ma

Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Mittelwert aller relevanten Serien (d.h. Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2wv_ma	272	3.01	0.55	1.5	4.8

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.49 t2wv_m4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_m4

Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Mittelwert der letzten vier relevanten Serien
(d.h. Item 7-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2wv_m4	272	2.90	0.63	1.5	5.2

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.50 t2zr_ca

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_ca

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Anzahl richtiger relevanter Rekonstruktionen (d.h. aus Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t2zr_ca	263	3.70	1.38	0.0	6.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

3.51 t2zr_ls

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_ls

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: laengste relevante Serie (d.h. aus Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2zr_ls	263	2.58	0.68	1.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.52 t2zr_l2s

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_l2s

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Mittelwert der beiden laengsten relevanten Serien
(d.h. aus Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t2zr_l2s	263	2.46	0.61	1.0	4.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

3.53 t2zr_ma

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_ma

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Mittelwert aller relevanten Serien (d.h. Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2zr_ma	263	2.06	0.47	1.0	3.8

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.54 t2zr_m4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_m4

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Mittelwert der letzten vier relevanten Serien (d.h. Item 7-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2zr_m4	263	2.02	0.51	1.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.55 t2zv_ca

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_ca

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Anzahl richtiger relevanter Rekonstruktionen (d.h. aus Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2zv_ca	270	3.94	1.07	2.0	7.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.56 t2zv_ls

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_ls

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: laengste relevante Serie (d.h. aus Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2zv_ls	270	3.71	0.69	2.0	7.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.57 t2zv_12s

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_12s

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Mittelwert der beiden laengsten relevanten Serien
(d.h. aus Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2zv_12s	270	3.62	0.66	2.0	6.5

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.58 t2zv_ma

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_ma

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Mittelwert aller relevanten Serien (d.h. Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2zv_ma	270	3.13	0.63	1.6	5.4

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.59 t2zv_m4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_m4

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Mittelwert der letzten vier relevanten Serien (d.h. Item 7-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2zv_m4	270	3.06	0.74	1.5	6.2

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.60 t2ar_s1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar_s1

Label: t2 Artikulationsrate: Serie (Itemnummer) 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ar_s1	273	1.00	0.00	1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.61 t2ar_s2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar_s2
 Label: t2 Artikulationsrate: Serie (Itemnummer) 2
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ar_s2	273	2.00	0.00	2.0	2.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.62 t2ar_i1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar_i1

Label: t2 Artikulationsrate: praesentierete Items Serie 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2ar_i1	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.5	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.63 t2ar_i2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar_i2

Label: t2 Artikulationsrate: praesentierete Items Serie 2

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2ar_i2	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.5	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.64 t2ar_rt1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar_rt1

Label: t2 Artikulationsrate: Gesamtzeit Serie 1 (ms)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ar_rt1	273	13164.35	6172.47	6590.0	66470.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.65 t2ar_rt2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar_rt2

Label: t2 Artikulationsrate: Gesamtzeit Serie 1 (ms)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ar_rt2	273	14679.56	5997.13	6920.0	46880.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.66 t2ar1_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar1_1

Label: t2 Artikulationsrate: Klickzeit 1 bei Serie 1 (ms)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ar1_1	272	2011.47	3491.23	125.0	35661.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.67 t2ar1_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar1_2

Label: t2 Artikulationsrate: Klickzeit 1 bei Serie 2 (ms)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ar1_2	273	1904.28	2070.71	250.0	16278.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.68 t2ar2_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar2_1

Label: t2 Artikulationsrate: Klickzeit 2 bei Serie 1 (ms)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ar2_1	273	1630.32	1388.31	280.0	13660.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.69 t2ar2_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar2_2

Label: t2 Artikulationsrate: Klickzeit 2 bei Serie 2 (ms)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ar2_2	273	1835.53	1773.66	610.0	16030.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.70 t2ar3_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar3_1

Label: t2 Artikulationsrate: Klickzeit 3 bei Serie 1 (ms)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ar3_1	273	1595.82	1199.41	500.0	10740.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.71 t2ar3_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar3_2

Label: t2 Artikulationsrate: Klickzeit 3 bei Serie 2 (ms)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ar3_2	273	1765.27	1555.11	470.0	14680.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.72 t2ar4_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar4_1

Label: t2 Artikulationsrate: Klickzeit 4 bei Serie 1 (ms)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ar4_1	273	1653.15	1716.79	360.0	20100.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.73 t2ar4_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar4_2

Label: t2 Artikulationsrate: Klickzeit 4 bei Serie 2 (ms)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ar4_2	273	1758.94	1113.63	700.0	9980.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.74 t2ar5_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar5_1

Label: t2 Artikulationsrate: Klickzeit 5 bei Serie 1 (ms)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ar5_1	273	1568.90	1028.77	470.0	10910.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.75 t2ar5_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar5_2

Label: t2 Artikulationsrate: Klickzeit 5 bei Serie 2 (ms)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ar5_2	273	1752.71	1303.79	620.0	12410.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.76 t2ar6_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar6_1

Label: t2 Artikulationsrate: Klickzeit 6 bei Serie 1 (ms)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ar6_1	273	1700.99	2089.49	620.0	32940.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.77 t2ar6_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar6_2

Label: t2 Artikulationsrate: Klickzeit 6 bei Serie 2 (ms)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ar6_2	273	1815.02	1487.35	290.0	14060.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.78 t2ar7_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar7_1

Label: t2 Artikulationsrate: Klickzeit 7 bei Serie 1 (ms)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ar7_1	273	1646.08	1191.13	470.0	13020.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.79 t2ar7_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar7_2

Label: t2 Artikulationsrate: Klickzeit 7 bei Serie 2 (ms)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ar7_2	273	1768.17	1484.74	670.0	13840.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.80 t2ar8_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar8_1

Label: t2 Artikulationsrate: Klickzeit 8 bei Serie 1 (ms)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ar8_1	273	1681.83	1220.31	540.0	10900.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.81 t2ar8_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar8_2

Label: t2 Artikulationsrate: Klickzeit 8 bei Serie 2 (ms)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ar8_2	273	1897.51	1659.74	780.0	17110.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.82 t2ar9_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar9_1

Label: t2 Artikulationsrate: Klickzeit 9 bei Serie 1 (ms)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ar9_1	273	1687.25	1200.79	160.0	9380.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.83 t2ar9_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar9_2

Label: t2 Artikulationsrate: Klickzeit 9 bei Serie 2 (ms)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ar9_2	273	2086.41	1594.14	750.0	13510.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.84 t2ar10_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar10_1

Label: t2 Artikulationsrate: Klickzeit 10 bei Serie 1 (ms)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ar10_1	273	1740.84	1284.62	690.0	16160.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.85 t2ar10_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ar10_2

Label: t2 Artikulationsrate: Klickzeit 10 bei Serie 2 (ms)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ar10_2	273	2014.95	1703.06	210.0	13590.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.86 t2kn_s1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_s1

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Serie (Itemnummer) 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t2kn_s1	275	1.00	0.00	1.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

3.87 t2kn_s2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_s2

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Serie (Itemnummer) 2

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kn_s2	275	2.00	0.00	2.0	2.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.88 t2kn_s3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_s3

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Serie (Itemnummer) 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kn_s3	275	3.00	0.00	3.0	3.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.89 t2kn_s4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_s4

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Serie (Itemnummer) 4

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kn_s4	275	4.00	0.00	4.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.90 t2kn_s5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_s5

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Serie (Itemnummer) 5

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kn_s5	275	5.00	0.00	5.0	5.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.91 t2kn_s6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_s6

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Serie (Itemnummer) 6

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kn_s6	275	6.00	0.00	6.0	6.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.92 t2kn_s7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_s7

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Serie (Itemnummer) 7

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kn_s7	275	7.00	0.00	7.0	7.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.93 t2kn_s8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_s8

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Serie (Itemnummer) 8

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kn_s8	275	8.00	0.00	8.0	8.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.94 t2kn_s9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_s9

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Serie (Itemnummer) 9

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kn_s9	275	9.00	0.00	9.0	9.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.95 t2kn_s10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_s10

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Serie (Itemnummer) 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t2kn_s10	275	10.00	0.00	10.0	10.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

3.96 t2kn_s11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_s11

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Serie (Itemnummer) 11

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kn_s11	275	11.00	0.00	11.0	11.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.97 t2kn_s12

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_s12

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Serie (Itemnummer) 12

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kn_s12	275	12.00	0.00	12.0	12.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.98 t2kn_s13

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_s13

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Serie (Itemnummer) 13

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kn_s13	275	13.00	0.00	13.0	13.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.99 t2kn_s14

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_s14

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Serie (Itemnummer) 14

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t2kn_s14	275	14.00	0.00	14.0	14.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

3.100 t2kn_s15

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_s15

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Serie (Itemnummer) 15

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kn_s15	275	15.00	0.00	15.0	15.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.101 t2kn_s16

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_s16

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Serie (Itemnummer) 16

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t2kn_s16	275	16.00	0.00	16.0	16.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

3.102 t2kn_s17

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_s17

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Serie (Itemnummer) 17

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kn_s17	275	17.00	0.00	17.0	17.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.103 t2kn_s18

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_s18

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Serie (Itemnummer) 18

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kn_s18	275	18.00	0.00	18.0	18.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.104 t2kn_s19

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_s19

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Serie (Itemnummer) 19

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kn_s19	275	19.00	0.00	19.0	19.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.105 t2kn_s20

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_s20

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Serie (Itemnummer) 20

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t2kn_s20	275	20.00	0.00	20.0	20.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

3.106 t2kn_s21

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_s21

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Serie (Itemnummer) 21

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t2kn_s21	275	21.00	0.00	21.0	21.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

3.107 t2kn_s22

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_s22

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Serie (Itemnummer) 22

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kn_s22	275	22.00	0.00	22.0	22.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.108 t2kn_s23

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_s23

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Serie (Itemnummer) 23

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kn_s23	275	23.00	0.00	23.0	23.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.109 t2kn_s24

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_s24

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Serie (Itemnummer) 24

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kn_s24	275	24.00	0.00	24.0	24.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.110 t2kn_i1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_i1

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: praesentiertes Item Serie 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_i1	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		9.8	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.111 t2kn_i2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_i2

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: praesentiertes Item Serie 2

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_i2	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		9.8	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.112 t2kn_i3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_i3

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: praesentiertes Item Serie 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_i3	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		9.8	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.113 t2kn_i4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_i4

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: praesentiertes Item Serie 4

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_i4	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		9.8	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.114 t2kn_i5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_i5

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: praesentiertes Item Serie 5

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_i5	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		9.8	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.115 t2kn_i6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_i6

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: praesentiertes Item Serie 6

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_i6	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		9.8	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.116 t2kn_i7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_i7

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: praesentiertes Item Serie 7

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_i7	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		9.8	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.117 t2kn_i8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_i8

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: praesentiertes Item Serie 8

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_i8	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		9.8	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.118 t2kn_i9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_i9

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: praesentiertes Item Serie 9

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_i9	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		9.8	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.119 t2kn_i10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_i10

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: praesentiertes Item Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_i10	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		9.8	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.120 t2kn_i11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_i11

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: praesentiertes Item Serie 11

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_i11	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		9.8	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.121 t2kn_i12

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_i12

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: praesentiertes Item Serie 12

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_i12	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		9.8	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.122 t2kn_i13

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_i13

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: praesentiertes Item Serie 13

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_i13	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		9.8	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.123 t2kn_i14

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_i14

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: praesentiertes Item Serie 14

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_i14	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		9.8	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.124 t2kn_i15

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_i15

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: praesentiertes Item Serie 15

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_i15	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		9.8	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.125 t2kn_i16

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_i16

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: praesentiertes Item Serie 16

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_i16	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		9.8	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.126 t2kn_i17

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_i17

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: praesentiertes Item Serie 17

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_i17	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		9.8	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.127 t2kn_i18

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_i18

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: praesentiertes Item Serie 18

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_i18	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		9.8	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.128 t2kn_i19

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_i19

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: praesentiertes Item Serie 19

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_i19	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		9.8	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.129 t2kn_i20

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_i20

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: praesentiertes Item Serie 20

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_i20	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		9.8	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.130 t2kn_i21

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_i21

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: praesentiertes Item Serie 21

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_i21	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		9.8	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.131 t2kn_i22

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_i22

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: praesentiertes Item Serie 22

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_i22	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		9.8	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.132 t2kn_i23

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_i23

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: praesentiertes Item Serie 23

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_i23	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		9.8	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.133 t2kn_i24

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_i24

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: praesentiertes Item Serie 24

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_i24	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		9.8	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.134 t2kn_y1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_y1
 Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Silbenanzahl Serie 1
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_y1	275	2.01	0.10

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.135 t2kn_y2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_y2
 Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Silbenanzahl Serie 2
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_y2	275	3.01	0.12

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.136 t2kn_y3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_y3
 Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Silbenanzahl Serie 3
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_y3	275	4.01	0.09

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.137 t2kn_y4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_y4
 Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Silbenanzahl Serie 4
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_y4	275	3.96	0.25

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.138 t2kn_y5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_y5
 Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Silbenanzahl Serie 5
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_y5	275	2.04	0.28

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.139 t2kn_y6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_y6
 Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Silbenanzahl Serie 6
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_y6	275	3.02	0.15

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.140 t2kn_y7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_y7
 Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Silbenanzahl Serie 7
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_y7	275	3.99	0.16

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.141 t2kn_y8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_y8
 Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Silbenanzahl Serie 8
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_y8	275	2.97	0.16

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.142 t2kn_y9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_y9
 Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Silbenanzahl Serie 9
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_y9	275	2.07	0.39

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.143 t2kn_y10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_y10

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Silbenanzahl Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_y10	275	3.93	0.37

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.144 t2kn_y11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_y11

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Silbenanzahl Serie 11

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_y11	275	2.09	0.44

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.145 t2kn_y12

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_y12

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Silbenanzahl Serie 12

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_y12	275	3.92	0.38

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.146 t2kn_y13

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_y13

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Silbenanzahl Serie 13

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_y13	275	2.06	0.28

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.147 t2kn_y14

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_y14

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Silbenanzahl Serie 14

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_y14	275	3.05	0.27

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.148 t2kn_y15

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_y15

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Silbenanzahl Serie 15

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_y15	275	3.90	0.43

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.149 t2kn_y16

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_y16

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Silbenanzahl Serie 16

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_y16	275	2.08	0.30

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.150 t2kn_y17

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_y17

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Silbenanzahl Serie 17

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_y17	275	3.07	0.25

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.151 t2kn_y18

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_y18

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Silbenanzahl Serie 18

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_y18	275	3.92	0.28

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.152 t2kn_y19

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_y19

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Silbenanzahl Serie 19

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_y19	275	2.92	0.27

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.153 t2kn_y20

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_y20

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Silbenanzahl Serie 20

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_y20	275	2.12	0.39

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.154 t2kn_y21

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_y21

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Silbenanzahl Serie 21

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_y21	275	3.08	0.29

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.155 t2kn_y22

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_y22

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Silbenanzahl Serie 22

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_y22	275	3.81	0.58

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.156 t2kn_y23

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_y23

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Silbenanzahl Serie 23

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_y23	275	2.12	0.40

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.157 t2kn_y24

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_y24

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Silbenanzahl Serie 24

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_y24	275	3.01	0.26

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.158 t2kn_m1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_m1

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Modulationsart Serie 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *unmoduliert*; 1 = *moduliert*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_m1	275	0.00	0.06

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unmoduliert	99.6	89.8
1	moduliert	0.4	0.3
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.159 t2kn_m2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_m2

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Modulationsart Serie 2

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *unmoduliert*; 1 = *moduliert*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_m2	275	0.99	0.09

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unmoduliert	0.7	0.7
1	moduliert	99.3	89.5
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.160 t2kn_m3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_m3

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Modulationsart Serie 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *unmoduliert*; 1 = *moduliert*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_m3	275	0.01	0.10

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unmoduliert	98.9	89.2
1	moduliert	1.1	1.0
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.161 t2kn_m4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_m4

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Modulationsart Serie 4

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *unmoduliert*; 1 = *moduliert*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_m4	275	0.99	0.12

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unmoduliert	1.5	1.3
1	moduliert	98.5	88.9
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.162 t2kn_m5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_m5

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Modulationsart Serie 5

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *unmoduliert*; 1 = *moduliert*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_m5	275	0.02	0.15

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unmoduliert	97.8	88.2
1	moduliert	2.2	2.0
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.163 t2kn_m6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_m6

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Modulationsart Serie 6

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *unmoduliert*; 1 = *moduliert*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_m6	275	0.98	0.15

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unmoduliert	2.2	2.0
1	moduliert	97.8	88.2
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.164 t2kn_m7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_m7

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Modulationsart Serie 7

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *unmoduliert*; 1 = *moduliert*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_m7	275	0.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unmoduliert	100.0	90.2
1	moduliert	0.0	0.0
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.165 t2kn_m8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_m8

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Modulationsart Serie 8

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *unmoduliert*; 1 = *moduliert*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_m8	275	0.03	0.18

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unmoduliert	96.7	87.2
1	moduliert	3.3	3.0
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.166 t2kn_m9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_m9

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Modulationsart Serie 9

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *unmoduliert*; 1 = *moduliert*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_m9	275	0.99	0.10

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unmoduliert	1.1	1.0
1	moduliert	98.9	89.2
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.167 t2kn_m10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_m10

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Modulationsart Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *unmoduliert*; 1 = *moduliert*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_m10	275	0.96	0.20

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unmoduliert	4.4	3.9
1	moduliert	95.6	86.2
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.168 t2kn_m11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_m11

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Modulationsart Serie 11

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *unmoduliert*; 1 = *moduliert*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_m11	275	0.01	0.10

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unmoduliert	98.9	89.2
1	moduliert	1.1	1.0
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.169 t2kn_m12

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_m12

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Modulationsart Serie 12

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *unmoduliert*; 1 = *moduliert*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_m12	275	0.04	0.19

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unmoduliert	96.4	86.9
1	moduliert	3.6	3.3
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.170 t2kn_m13

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_m13

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Modulationsart Serie 13

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *unmoduliert*; 1 = *moduliert*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_m13	275	0.96	0.20

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unmoduliert	4.0	3.6
1	moduliert	96.0	86.6
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.171 t2kn_m14

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_m14

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Modulationsart Serie 14

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *unmoduliert*; 1 = *moduliert*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_m14	275	0.05	0.21

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unmoduliert	95.3	85.9
1	moduliert	4.7	4.3
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.172 t2kn_m15

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_m15

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Modulationsart Serie 15

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *unmoduliert*; 1 = *moduliert*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_m15	275	0.95	0.23

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unmoduliert	5.5	4.9
1	moduliert	94.5	85.2
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.173 t2kn_m16

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_m16

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Modulationsart Serie 16

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *unmoduliert*; 1 = *moduliert*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_m16	275	0.06	0.24

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unmoduliert	93.8	84.6
1	moduliert	6.2	5.6
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.174 t2kn_m17

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_m17

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Modulationsart Serie 17

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *unmoduliert*; 1 = *moduliert*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_m17	275	0.93	0.26

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unmoduliert	7.3	6.6
1	moduliert	92.7	83.6
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.175 t2kn_m18

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_m18

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Modulationsart Serie 18

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *unmoduliert*; 1 = *moduliert*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_m18	275	0.08	0.27

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unmoduliert	92.0	83.0
1	moduliert	8.0	7.2
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.176 t2kn_m19

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_m19

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Modulationsart Serie 19

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *unmoduliert*; 1 = *moduliert*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_m19	275	1.00	0.06

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unmoduliert	0.4	0.3
1	moduliert	99.6	89.8
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.177 t2kn_m20

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_m20

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Modulationsart Serie 20

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *unmoduliert*; 1 = *moduliert*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_m20	275	0.91	0.29

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unmoduliert	9.5	8.5
1	moduliert	90.5	81.6
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.178 t2kn_m21

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_m21

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Modulationsart Serie 21

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *unmoduliert*; 1 = *moduliert*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_m21	275	0.10	0.30

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unmoduliert	90.2	81.3
1	moduliert	9.8	8.9
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.179 t2kn_m22

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_m22

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Modulationsart Serie 22

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *unmoduliert*; 1 = *moduliert*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_m22	275	0.99	0.10

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unmoduliert	1.1	1.0
1	moduliert	98.9	89.2
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.180 t2kn_m23

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_m23

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Modulationsart Serie 23

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *unmoduliert*; 1 = *moduliert*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_m23	275	0.91	0.29

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unmoduliert	9.5	8.5
1	moduliert	90.5	81.6
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.181 t2kn_m24

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_m24

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Modulationsart Serie 24

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *unmoduliert*; 1 = *moduliert*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_m24	275	0.07	0.25

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unmoduliert	93.5	84.3
1	moduliert	6.5	5.9
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.182 t2kn_r1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_r1
 Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Reaktion des Kindes Serie 1
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_r1	275	0.94	0.23

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	5.8	5.2
1	richtig	94.2	84.9
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.183 t2kn_r2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_r2

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Reaktion des Kindes Serie 2

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_r2	275	0.51	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	48.7	43.9
1	richtig	51.3	46.2
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.184 t2kn_r3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_r3

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Reaktion des Kindes Serie 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_r3	275	0.80	0.40

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	20.0	18.0
1	richtig	80.0	72.1
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.185 t2kn_r4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_r4

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Reaktion des Kindes Serie 4

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_r4	275	0.55	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	44.7	40.3
1	richtig	55.3	49.8
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.186 t2kn_r5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_r5

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Reaktion des Kindes Serie 5

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_r5	275	0.70	0.46

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	29.8	26.9
1	richtig	70.2	63.3
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.187 t2kn_r6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_r6

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Reaktion des Kindes Serie 6

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_r6	275	0.78	0.41

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	21.8	19.7
1	richtig	78.2	70.5
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.188 t2kn_r7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_r7
 Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Reaktion des Kindes Serie 7
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_r7	275	0.62	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	38.2	34.4
1	richtig	61.8	55.7
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.189 t2kn_r8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_r8

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Reaktion des Kindes Serie 8

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_r8	275	0.87	0.34

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	13.5	12.1
1	richtig	86.5	78.0
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.190 t2kn_r9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_r9
 Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Reaktion des Kindes Serie 9
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_r9	275	0.88	0.32

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	11.6	10.5
1	richtig	88.4	79.7
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.191 t2kn_r10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_r10

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Reaktion des Kindes Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_r10	275	0.24	0.43

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	75.6	68.2
1	richtig	24.4	22.0
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.192 t2kn_r11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_r11

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Reaktion des Kindes Serie 11

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_r11	275	0.88	0.32

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	11.6	10.5
1	richtig	88.4	79.7
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.193 t2kn_r12

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_r12

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Reaktion des Kindes Serie 12

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_r12	275	0.66	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	34.2	30.8
1	richtig	65.8	59.3
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.194 t2kn_r13

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_r13

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Reaktion des Kindes Serie 13

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_r13	275	0.73	0.44

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	26.5	23.9
1	richtig	73.5	66.2
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.195 t2kn_r14

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_r14

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Reaktion des Kindes Serie 14

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_r14	275	0.62	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	38.2	34.4
1	richtig	61.8	55.7
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.196 t2kn_r15

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_r15

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Reaktion des Kindes Serie 15

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_r15	275	0.48	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	52.0	46.9
1	richtig	48.0	43.3
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.197 t2kn_r16

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_r16

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Reaktion des Kindes Serie 16

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_r16	275	0.81	0.40

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	19.3	17.4
1	richtig	80.7	72.8
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.198 t2kn_r17

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_r17

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Reaktion des Kindes Serie 17

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = falsch; 1 = richtig

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_r17	275	0.83	0.37

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	16.7	15.1
1	richtig	83.3	75.1
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.199 t2kn_r18

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_r18

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Reaktion des Kindes Serie 18

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_r18	275	0.59	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	40.7	36.7
1	richtig	59.3	53.4
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.200 t2kn_r19

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_r19

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Reaktion des Kindes Serie 19

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_r19	275	0.79	0.41

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	21.5	19.3
1	richtig	78.5	70.8
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.201 t2kn_r20

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_r20

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Reaktion des Kindes Serie 20

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_r20	275	0.62	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	38.2	34.4
1	richtig	61.8	55.7
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.202 t2kn_r21

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_r21

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Reaktion des Kindes Serie 21

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_r21	275	0.80	0.40

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	20.4	18.4
1	richtig	79.6	71.8
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.203 t2kn_r22

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_r22

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Reaktion des Kindes Serie 22

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_r22	275	0.58	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	42.2	38.0
1	richtig	57.8	52.1
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.204 t2kn_r23

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_r23

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Reaktion des Kindes Serie 23

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_r23	275	0.90	0.30

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	10.2	9.2
1	richtig	89.8	81.0
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.205 t2kn_r24

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_r24

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Reaktion des Kindes Serie 24

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kn_r24	275	0.80	0.40

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	20.0	18.0
1	richtig	80.0	72.1
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.206 t2wv_s1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_s1
 Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Serie (Itemnummer) 1
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_s1	272	1.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 272$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.207 t2wv_s2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_s2
 Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Serie (Itemnummer) 2
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_s2	272	2.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 272$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.208 t2wv_s3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_s3
 Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Serie (Itemnummer) 3
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_s3	272	3.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 272$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.209 t2wv_s4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_s4
 Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Serie (Itemnummer) 4
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_s4	272	4.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 272$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.210 t2wv_s5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_s5
 Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Serie (Itemnummer) 5
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_s5	272	5.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 272$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.211 t2wv_s6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_s6
 Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Serie (Itemnummer) 6
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_s6	272	6.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 272$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.212 t2wv_s7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_s7
 Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Serie (Itemnummer) 7
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_s7	272	7.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 272$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.213 t2wv_s8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_s8
 Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Serie (Itemnummer) 8
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_s8	272	8.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 272$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.214 t2wv_s9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_s9
 Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Serie (Itemnummer) 9
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_s9	272	9.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 272$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.215 t2wv_s10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_s10

Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Serie (Itemnummer) 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_s10	272	10.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 272$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.216 t2wv_l1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_l1
 Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 1
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_l1	272	2.01	0.10

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 272$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.217 t2wv_l2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_l2
 Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 2
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_l2	272	2.97	0.20

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 272$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.218 t2wv_l3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_l3
 Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 3
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_l3	272	3.53	0.82

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 272$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.219 t2wv_l4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_l4
 Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 4
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_l4	272	3.53	0.82

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 272$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.220 t2wv_15

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_15
 Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 5
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_15	272	3.76	0.83

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 272$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.221 t2wv_l6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_l6
 Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 6
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_l6	272	3.76	0.83

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 272$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.222 t2wv_l7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_l7
 Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 7
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_l7	272	3.43	0.73

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 272$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.223 t2wv_l8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_l8
 Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 8
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_l8	272	3.43	0.73

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 272$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.224 t2wv_l9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_l9

Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 9

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_l9	272	3.40	0.78

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 272$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.225 t2wv_l10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_l10

Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_l10	272	3.40	0.78

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 272$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.226 t2wv_i1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_i1

Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_i1	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.8	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.227 t2wv_i2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_i2

Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 2

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_i2	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.8	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.228 t2wv_i3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_i3

Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_i3	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.8	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.229 t2wv_i4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_i4

Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 4

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_i4	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.8	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.230 t2wv_i5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_i5

Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 5

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_i5	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.8	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.231 t2wv_i6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_i6

Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 6

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_i6	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.8	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.232 t2wv_i7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_i7

Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 7

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_i7	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.8	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.233 t2wv_i8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_i8

Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 8

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_i8	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.8	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.234 t2wv_i9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_i9

Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 9

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_i9	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.8	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.235 t2wv_i10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_i10

Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_i10	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.8	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.236 t2wv_r1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_r1
 Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 1
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_r1	272	0.96	0.19

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	3.7	3.3
1	richtig	96.3	85.9
-999	missing	–	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 272$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.237 t2wv_r2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_r2
 Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 2
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_r2	272	0.78	0.41

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	21.7	19.3
1	richtig	78.3	69.8
-999	missing	–	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 272$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.238 t2wv_r3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_r3
 Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 3
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_r3	272	0.61	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	38.6	34.4
1	richtig	61.4	54.8
-999	missing	–	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 272$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.239 t2wv_r4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_r4
 Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 4
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_r4	272	0.61	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	38.6	34.4
1	richtig	61.4	54.8
-999	missing	–	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 272$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.240 t2wv_r5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_r5
 Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 5
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_r5	272	0.38	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	62.5	55.7
1	richtig	37.5	33.4
-999	missing	–	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 272$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.241 t2wv_r6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_r6
 Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 6
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_r6	272	0.28	0.45

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	72.1	64.3
1	richtig	27.9	24.9
-999	missing	–	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 272$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.242 t2wv_r7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_r7
 Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 7
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_r7	272	0.51	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	48.9	43.6
1	richtig	51.1	45.6
-999	missing	–	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 272$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.243 t2wv_r8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_r8
 Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 8
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_r8	272	0.45	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	54.8	48.9
1	richtig	45.2	40.3
-999	missing	–	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 272$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.244 t2wv_r9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_r9
 Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 9
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_r9	272	0.53	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	46.7	41.6
1	richtig	53.3	47.5
-999	missing	–	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 272$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.245 t2wv_r10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_r10

Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wv_r10	272	0.47	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	52.9	47.2
1	richtig	47.1	42.0
-999	missing	–	10.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 272$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.246 t2zv_s1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_s1
 Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Serie (Itemnummer) 1
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_s1	270	1.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.247 t2zv_s2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_s2
 Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Serie (Itemnummer) 2
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_s2	270	2.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.248 t2zv_s3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_s3
 Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Serie (Itemnummer) 3
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_s3	270	3.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.249 t2zv_s4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_s4
 Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Serie (Itemnummer) 4
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_s4	270	4.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.250 t2zv_s5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_s5
 Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Serie (Itemnummer) 5
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_s5	270	5.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.251 t2zv_s6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_s6
 Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Serie (Itemnummer) 6
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_s6	270	6.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.252 t2zv_s7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_s7
 Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Serie (Itemnummer) 7
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_s7	270	7.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.253 t2zv_s8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_s8
 Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Serie (Itemnummer) 8
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_s8	270	8.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.254 t2zv_s9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_s9
 Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Serie (Itemnummer) 9
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_s9	270	9.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.255 t2zv_s10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_s10
 Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Serie (Itemnummer) 10
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_s10	270	10.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.256 t2zv_11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_11

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_11	270	2.01	0.11

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.257 t2zv_l2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_l2
 Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 2
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_l2	270	2.97	0.18

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.258 t2zv_13

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_13

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_13	270	3.60	0.78

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.259 t2zv_l4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_l4
 Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 4
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_l4	270	3.60	0.78

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.260 t2zv_15

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_15
 Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 5
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_15	270	3.76	0.83

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.261 t2zv_l6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_l6
 Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 6
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_l6	270	3.76	0.83

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.262 t2zv_17

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_17

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 7

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_17	270	3.64	0.79

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.263 t2zv_18

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_18

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 8

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_18	270	3.64	0.79

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.264 t2zv_l9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_l9

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 9

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_l9	270	3.53	0.89

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.265 t2zv_110

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_110

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_110	270	3.53	0.89

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.266 t2zv_i1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_i1

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_i1	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		11.5	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.267 t2zv_i2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_i2

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 2

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_i2	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		11.5	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.268 t2zv_i3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_i3

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_i3	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		11.5	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.269 t2zv_i4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_i4

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 4

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_i4	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		11.5	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.270 t2zv_i5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_i5

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 5

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_i5	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		11.5	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.271 t2zv_i6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_i6

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 6

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_i6	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		11.5	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.272 t2zv_i7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_i7

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 7

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_i7	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		11.5	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.273 t2zv_i8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_i8

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 8

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_i8	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		11.5	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.274 t2zv_i9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_i9

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 9

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_i9	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		11.5	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.275 t2zv_i10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_i10

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_i10	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		11.5	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.276 t2zv_r1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_r1

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = falsch; 1 = richtig

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_r1	270	0.97	0.17

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	3.0	2.6
1	richtig	97.0	85.9
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.277 t2zv_r2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_r2

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 2

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = falsch; 1 = richtig

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_r2	270	0.81	0.39

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	18.5	16.4
1	richtig	81.5	72.1
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.278 t2zv_r3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_r3
 Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 3
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_r3	270	0.58	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	42.2	37.4
1	richtig	57.8	51.1
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.279 t2zv_r4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_r4

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 4

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = falsch; 1 = richtig

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_r4	270	0.58	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	41.9	37.0
1	richtig	58.1	51.5
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.280 t2zv_r5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_r5

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 5

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_r5	270	0.43	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	56.7	50.2
1	richtig	43.3	38.4
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.281 t2zv_r6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_r6

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 6

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_r6	270	0.44	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	55.9	49.5
1	richtig	44.1	39.0
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.282 t2zv_r7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_r7

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 7

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = falsch; 1 = richtig

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_r7	270	0.46	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	54.4	48.2
1	richtig	45.6	40.3
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.283 t2zv_r8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_r8

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 8

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_r8	270	0.43	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	56.7	50.2
1	richtig	43.3	38.4
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.284 t2zv_r9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_r9

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 9

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_r9	270	0.55	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	45.2	40.0
1	richtig	54.8	48.5
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.285 t2zv_r10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_r10

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zv_r10	270	0.47	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	52.6	46.6
1	richtig	47.4	42.0
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.286 t2wr_s1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_s1
 Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 1
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_s1	263	1.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.287 t2wr_s2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_s2
 Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 2
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_s2	263	2.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.288 t2wr_s3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_s3

Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_s3	263	3.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.289 t2wr_s4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_s4

Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 4

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_s4	263	4.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.290 t2wr_s5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_s5
 Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 5
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_s5	263	5.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.291 t2wr_s6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_s6

Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 6

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_s6	263	6.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.292 t2wr_s7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_s7
 Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 7
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_s7	263	7.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.293 t2wr_s8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_s8

Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 8

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_s8	263	8.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.294 t2wr_s9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_s9

Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 9

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_s9	263	9.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.295 t2wr_s10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_s10

Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_s10	263	10.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.296 t2wr_l1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_l1
 Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 1
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_l1	263	2.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.297 t2wr_l2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_l2
 Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 2
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_l2	263	2.84	0.36

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.298 t2wr_l3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_l3
 Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 3
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_l3	263	2.73	0.92

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.299 t2wr_l4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_l4
 Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 4
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_l4	263	2.73	0.92

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.300 t2wr_l5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_l5
 Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 5
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_l5	263	2.86	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.301 t2wr_l6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_l6
 Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 6
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_l6	263	2.86	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.302 t2wr_l7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_l7
 Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 7
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_l7	263	2.51	0.63

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.303 t2wr_l8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_l8
 Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 8
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_l8	263	2.51	0.63

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.304 t2wr_l9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_l9
 Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 9
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_l9	263	2.60	0.54

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.305 t2wr_110

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_110

Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_110	263	2.60	0.54

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.306 t2wr_i1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_i1

Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_i1	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		13.8	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.307 t2wr_i2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_i2

Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 2

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_i2	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		13.8	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.308 t2wr_i3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_i3

Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_i3	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		13.8	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.309 t2wr_i4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_i4

Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 4

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_i4	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		13.8	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.310 t2wr_i5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_i5

Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 5

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_i5	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		13.8	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.311 t2wr_i6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_i6

Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 6

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_i6	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		13.8	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.312 t2wr_i7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_i7

Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 7

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_i7	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		13.8	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.313 t2wr_i8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_i8

Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 8

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_i8	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		13.8	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.314 t2wr_i9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_i9

Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 9

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_i9	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		13.8	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.315 t2wr_i10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_i10

Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_i10	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		13.8	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.316 t2wr_r1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_r1
 Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 1
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_r1	263	0.84	0.36

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	15.6	13.4
1	richtig	84.4	72.8
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.317 t2wr_r2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_r2
 Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 2
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_r2	263	0.41	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	59.3	51.1
1	richtig	40.7	35.1
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.318 t2wr_r3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_r3
 Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 3
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_r3	263	0.54	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	46.0	39.7
1	richtig	54.0	46.6
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.319 t2wr_r4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_r4
 Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 4
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_r4	263	0.53	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	47.1	40.7
1	richtig	52.9	45.6
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.320 t2wr_r5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_r5
 Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 5
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_r5	263	0.37	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	63.1	54.4
1	richtig	36.9	31.8
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.321 t2wr_r6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_r6
 Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 6
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_r6	263	0.22	0.42

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	77.6	66.9
1	richtig	22.4	19.3
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.322 t2wr_r7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_r7
 Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 7
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_r7	263	0.48	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	52.5	45.2
1	richtig	47.5	41.0
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.323 t2wr_r8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_r8
 Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 8
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_r8	263	0.52	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	48.3	41.6
1	richtig	51.7	44.6
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.324 t2wr_r9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_r9
 Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 9
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_r9	263	0.41	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	58.9	50.8
1	richtig	41.1	35.4
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.325 t2wr_r10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wr_r10

Label: t2 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2wr_r10	263	0.42	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	57.8	49.8
1	richtig	42.2	36.4
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.326 t2zr_s1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_s1
 Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 1
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_s1	263	1.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.327 t2zr_s2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_s2
 Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 2
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_s2	263	2.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.328 t2zr_s3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_s3
 Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 3
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_s3	263	3.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.329 t2zr_s4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_s4
 Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 4
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_s4	263	4.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.330 t2zr_s5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_s5
 Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 5
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_s5	263	5.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.331 t2zr_s6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_s6
 Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 6
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_s6	263	6.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.332 t2zr_s7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_s7
 Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 7
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_s7	263	7.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.333 t2zr_s8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_s8
 Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 8
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_s8	263	8.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.334 t2zr_s9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_s9
 Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 9
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_s9	263	9.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.335 t2zr_s10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_s10

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_s10	263	10.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.336 t2zr_l1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_l1

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_l1	263	2.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.337 t2zr_l2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_l2

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 2

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_l2	263	2.88	0.33

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.338 t2zr_l3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_l3

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_l3	263	2.49	0.83

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.339 t2zr_l4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_l4
 Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 4
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_l4	263	2.49	0.83

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.340 t2zr_15

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_15

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 5

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_15	263	2.80	0.53

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.341 t2zr_l6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_l6
 Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 6
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_l6	263	2.80	0.53

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.342 t2zr_l7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_l7
 Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 7
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_l7	263	2.49	0.59

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.343 t2zr_l8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_l8

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 8

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_l8	263	2.49	0.59

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.344 t2zr_l9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_l9
 Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 9
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_l9	263	2.62	0.61

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.345 t2zr_l10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_l10

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_l10	263	2.62	0.61

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.346 t2zr_i1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_i1

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_i1	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		13.8	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.347 t2zr_i2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_i2

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 2

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_i2	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		13.8	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.348 t2zr_i3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_i3

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_i3	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		13.8	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.349 t2zr_i4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_i4

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 4

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_i4	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		13.8	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.350 t2zr_i5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_i5

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 5

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_i5	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		13.8	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.351 t2zr_i6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_i6

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 6

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_i6	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		13.8	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.352 t2zr_i7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_i7

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 7

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_i7	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		13.8	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.353 t2zr_i8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_i8

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 8

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_i8	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		13.8	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.354 t2zr_i9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_i9

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 9

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_i9	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		13.8	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.355 t2zr_i10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_i10

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_i10	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		13.8	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.356 t2zr_r1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_r1

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = falsch; 1 = richtig

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_r1	263	0.88	0.33

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	12.2	10.5
1	richtig	87.8	75.7
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.357 t2zr_r2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_r2

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 2

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = falsch; 1 = richtig

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_r2	263	0.27	0.44

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	73.0	63.0
1	richtig	27.0	23.3
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.358 t2zr_r3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_r3

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_r3	263	0.60	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	40.3	34.8
1	richtig	59.7	51.5
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.359 t2zr_r4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_r4

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 4

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_r4	263	0.63	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	37.3	32.1
1	richtig	62.7	54.1
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.360 t2zr_r5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_r5

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 5

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_r5	263	0.30	0.46

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	70.0	60.3
1	richtig	30.0	25.9
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.361 t2zr_r6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_r6

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 6

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_r6	263	0.31	0.46

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	69.2	59.7
1	richtig	30.8	26.6
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.362 t2zr_r7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_r7

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 7

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = falsch; 1 = richtig

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_r7	263	0.50	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	49.8	43.0
1	richtig	50.2	43.3
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.363 t2zr_r8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_r8

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 8

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_r8	263	0.52	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	47.5	41.0
1	richtig	52.5	45.2
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.364 t2zr_r9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_r9

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 9

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_r9	263	0.43	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	56.7	48.9
1	richtig	43.3	37.4
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.365 t2zr_r10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_r10

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2zr_r10	263	0.40	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	59.7	51.5
1	richtig	40.3	34.8
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.366 t2zr_l2t

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_l2t

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: T-Wert basierend auf l2-Rohwert, Normen aus
Manual

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2zr_l2t	263	45.59	7.79	29.0	69.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.367 t2wv_l2t

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_l2t

Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: T-Wert basierend auf l2-Rohwert, Normen aus Manual

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2wv_l2t	272	48.21	8.50	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.368 t2zv_l2t

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_l2t

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: T-Wert basierend auf l2-Rohwert, Normen aus
Manual

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2zv_l2t	270	46.63	8.59	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.369 t2zr_m4t

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_m4t

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: T-Wert basierend auf m4-Rohwert, Normen aus Manual

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t2zr_m4t	263	46.25	8.75	29.0	71.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

3.370 t2wv_m4t

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_m4t

Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: T-Wert basierend auf m4-Rohwert, Normen
aus Manual

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2wv_m4t	272	47.68	9.58	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.371 t2zv_m4t

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_m4t

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: T-Wert basierend auf m4-Rohwert, Normen aus
Manual

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2zv_m4t	270	45.83	9.45	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.372 t2zr_mat

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zr_mat

Label: t2 Zahlenspanne rueckwaerts: T-Wert basierend auf mat-Rohwert, Normen aus Manual

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t2zr_mat	263	45.38	8.54	29.0	71.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

3.373 t2wv_mat

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wv_mat

Label: t2 Wortspanne einsilbig vorwaerts: T-Wert basierend auf mat-Rohwert, Normen aus Manual

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2wv_mat	272	47.74	9.11	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.374 t2zv_mat

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2zv_mat

Label: t2 Zahlenspanne vorwaerts: T-Wert basierend auf mat-Rohwert, Normen aus
Manual

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2zv_mat	270	45.34	9.31	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.375 t2kn_cn

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_cn

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Summe korrekt nicht-moduliert

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kn_cn	275	9.10	2.32	0.0	12.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.376 t2kn_cm

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_cm

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: Summe korrekt moduliert

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kn_cm	275	7.86	2.28	1.0	12.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.377 t2kn_aT

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_aT

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: T-Wert gesamt

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kn_aT	271	54.09	9.20	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.378 t2kn_nT

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_nT

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: T-Wert nicht-moduliert

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kn_nT	271	54.65	9.57	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.379 t2kn_mT

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kn_mT

Label: t2 Kunstwoerter nachsprechen: T-Wert moduliert

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t2kn_mT	271	52.97	8.68	29.0	71.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 305$.

4 AGTB Testzeitpunkt 3

4.1 t3AGTBGebdat

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3AGTBGebdat

Label: t3AGTB Geburtsdatum vom TL eingegeben. ACHTUNG: NICHT zur
Altersberechnung verwenden weil evtl. FALSCH

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

II AGTB

4 AGTB TESTZEITPUNKT 3

4.2 t3AGTBGebdat_FDZ

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3AGTBGebdat_FDZ

Label: t3AGTB Geburtsdatum vom TL eingegeben. ACHTUNG: NICHT zur
Altersberechnung verwenden weil evtl. FALSCH (zur Anonymisierung aggregiert
(FDZ))

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

II AGTB

4 AGTB TESTZEITPUNKT 3

4.3 t3AGTBBemerk_allgemein

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3AGTBBemerk_allgemein
Label: t3AGTB Allgemeine Bemerkungen
Variablentyp: Zeichenfolge
Quelle: Hasselhorn et al., 2012

II AGTB

4 AGTB TESTZEITPUNKT 3

4.4 t3AGTBBemerk_speziell

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3AGTBBemerk_speziell
Label: t3AGTB Spezielle Bemerkungen
Variablentyp: Zeichenfolge
Quelle: Hasselhorn et al., 2012

II AGTB

4 AGTB TESTZEITPUNKT 3

4.5 t3AGTBTestdat

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3AGTBTestdat
Label: t3AGTB Testdatum
Variablentyp: Zeichenfolge
Quelle: Hasselhorn et al., 2012

II AGTB

4 AGTB TESTZEITPUNKT 3

4.6 t3AGTBTestdat3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3AGTBTestdat3
Label: t3AGTB Testdatum erster Nachholtermin
Variablentyp: Zeichenfolge
Quelle: Hasselhorn et al., 2012

4.7 t3AGTBDropout

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3AGTBDropout

Label: t3AGTB Daten vorhanden?

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = AGTB MZP3 vorhanden; 1 = AGTB MZP3 fehlt

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3AGTBDropout	305	0.10	0.30

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	AGTB MZP3 vorhanden	89.8	89.8
1	AGTB MZP3 fehlt	10.2	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.8 t3AGTBNachtestung

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3AGTBNachtestung
 Label: t3AGTB Nachtestung durchgeführt?
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *keine Nachtestung*; 1 = *Nachtestung*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3AGTBNachtestung	274	0.12	0.33

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	keine Nachtestung	87.6	78.7
1	Nachtestung	12.4	11.1
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.9 t3AGTBVoll

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3AGTBVoll
 Label: t3AGTB Daten vollstaendig?
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *AGTB unvollstaendig*; 1 = *AGTB vollstaendig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3AGTBVoll	275	0.96	0.19

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	AGTB unvollstaendig	3.6	3.3
1	AGTB vollstaendig	96.4	86.9
-999	missing	–	9.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 275$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.10 t3AGTBAbbruch

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3AGTBAbbruch

Label: t3AGTB Abbruch waehrend der AGTB-Testung?

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *kein Abbruch*; 1 = *Abbruch nach AR*; 2 = *Abbruch nach KN*; 3 = *Abbruch nach WV*; 4 = *Abbruch nach ZV*; 5 = *Abbruch nach WR*; 6 = *AGTB gar nicht gemacht*; 7 = *ZV fehlt*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3AGTBAbbruch	305	-101.39	302.42

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Abbruch	86.9	86.9
1	Abbruch nach AR	0.0	0.0
2	Abbruch nach KN	0.0	0.0
3	Abbruch nach WV	0.0	0.0
4	Abbruch nach ZV	1.0	1.0
5	Abbruch nach WR	1.6	1.6
6	AGTB gar nicht gemacht	0.0	0.0
7	ZV fehlt	0.3	0.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.11 t3wv_ma1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_ma1

Label: t3AGTB Wortspanne vorwaerts AUFFAELLIGER RW, ggf. fehlendes
Instruktionsverstaendnis: Mittelwert aller relevanten Serien = 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *nicht auffaellig*; 1 = 5;0 - 5;5; 2 = 5;6 - 5;11; 3 = 6;0 - 6;5; 4 = 6;6 -
6;11; 5 = 7;0 - 7;5; 6 = 7;6 - 7;11; 7 = 8;0 - 8;11; 8 = 9;0 - 9;11; 9 = 10;0 -
10;11; 10 = 11;0 - 11;11; 11 = 12;0 - 12;11Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_ma1	271	0.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	nicht auffaellig	100.0	88.9
1	5;0 - 5;5	0.0	0.0
2	5;6 - 5;11	0.0	0.0
3	6;0 - 6;5	0.0	0.0
4	6;6 - 6;11	0.0	0.0
5	7;0 - 7;5	0.0	0.0
6	7;6 - 7;11	0.0	0.0
7	8;0 - 8;11	0.0	0.0
8	9;0 - 9;11	0.0	0.0
9	10;0 - 10;11	0.0	0.0
10	11;0 - 11;11	0.0	0.0
11	12;0 - 12;11	0.0	0.0

Fortsetzung auf der nächsten Seite

II AGTB

4 AGTB TESTZEITPUNKT 3

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.12 t3zv_ma1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_ma1

Label: t3AGTB Ziffernsparre vorwaerts AUFFAELLIGER RW, ggf. fehlendes
Instruktionsverstaendnis: Mittelwert aller relevanten Serien = 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *nicht auffaellig*; 1 = 5;0 - 5;5; 2 = 5;6 - 5;11; 3 = 6;0 - 6;5; 4 = 6;6 -
6;11; 5 = 7;0 - 7;5; 6 = 7;6 - 7;11; 7 = 8;0 - 8;11; 8 = 9;0 - 9;11; 9 = 10;0 -
10;11; 10 = 11;0 - 11;11; 11 = 12;0 - 12;11

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_ma1	271	0.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	nicht auffaellig	100.0	88.9
1	5;0 - 5;5	0.0	0.0
2	5;6 - 5;11	0.0	0.0
3	6;0 - 6;5	0.0	0.0
4	6;6 - 6;11	0.0	0.0
5	7;0 - 7;5	0.0	0.0
6	7;6 - 7;11	0.0	0.0
7	8;0 - 8;11	0.0	0.0
8	9;0 - 9;11	0.0	0.0
9	10;0 - 10;11	0.0	0.0
10	11;0 - 11;11	0.0	0.0
11	12;0 - 12;11	0.0	0.0

Fortsetzung auf der nächsten Seite

II AGTB

4 AGTB TESTZEITPUNKT 3

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.13 t3wr_ma1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_ma1

Label: t3AGTB Wortspanne ruckwaerts AUFFAELLIGER RW, ggf. fehlendes
Instruktionsverstaendnis: Mittelwert aller relevanten Serien = 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_ma1	271	0.01	0.09

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	99.3	88.2
1	richtig	0.7	0.7
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.14 t3zr_ma1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_ma1

Label: t3AGTB Ziffernsparre rückwärts AUFFAELLIGER RW, ggf. fehlendes
Instruktionsverständnis: Mittelwert aller relevanten Serien = 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = falsch; 1 = richtig

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_ma1	271	0.00	0.06

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	99.6	88.5
1	richtig	0.4	0.3
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

II AGTB

4 AGTB TESTZEITPUNKT 3

4.15 t3AG_age

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3AG_age

Label: Alter bei AGTB Testung in Monaten (abgerundet)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3AG_age	274	82.89	3.75	71.0	94.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.16 t3AG_age2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3AG_age2

Label: Alter bei AGTB Testung in Monaten (abgerundet) bei Nachholtermin1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3AG_age2	34	83.12	3.98	76.0	94.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.17 t3AGTBageNorm

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3AGTBageNorm

Label: t3 AGTB Altersnormgruppe

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 1 = 5;0 - 5;5; 2 = 5;6 - 5;11; 3 = 6;0 - 6;5; 4 = 6;6 - 6;11; 5 = 7;0 - 7;5;
 6 = 7;6 - 7;11; 7 = 8;0 - 8;11; 8 = 9;0 - 9;11; 9 = 10;0 - 10;11; 10 = 11;0 -
 11;11; 11 = 12;0 - 12;11

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
t3AGTBageNorm	274	4.38	0.68

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	5;0 - 5;5	0.0	0.0
2	5;6 - 5;11	0.4	0.3
3	6;0 - 6;5	6.6	5.9
4	6;6 - 6;11	50.7	45.6
5	7;0 - 7;5	39.1	35.1
6	7;6 - 7;11	3.3	3.0
7	8;0 - 8;11	0.0	0.0
8	9;0 - 9;11	0.0	0.0
9	10;0 - 10;11	0.0	0.0
10	11;0 - 11;11	0.0	0.0
11	12;0 - 12;11	0.0	0.0

Fortsetzung auf der nächsten Seite

II AGTB

4 AGTB TESTZEITPUNKT 3

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.18 t3AGTBageNorm2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3AGTBageNorm2

Label: t3 AGTB Altersnormgruppe Nachtestung

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 1 = 5;0 - 5;5; 2 = 5;6 - 5;11; 3 = 6;0 - 6;5; 4 = 6;6 - 6;11; 5 = 7;0 - 7;5;
 6 = 7;6 - 7;11; 7 = 8;0 - 8;11; 8 = 9;0 - 9;11; 9 = 10;0 - 10;11; 10 = 11;0 -
 11;11; 11 = 12;0 - 12;11

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3AGTBageNorm2	34	4.41	0.78

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	5;0 - 5;5	0.0	0.0
2	5;6 - 5;11	0.0	0.0
3	6;0 - 6;5	8.8	1.0
4	6;6 - 6;11	50.0	5.6
5	7;0 - 7;5	32.4	3.6
6	7;6 - 7;11	8.8	1.0
7	8;0 - 8;11	0.0	0.0
8	9;0 - 9;11	0.0	0.0
9	10;0 - 10;11	0.0	0.0
10	11;0 - 11;11	0.0	0.0
11	12;0 - 12;11	0.0	0.0

Fortsetzung auf der nächsten Seite

II AGTB

4 AGTB TESTZEITPUNKT 3

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	88.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 34$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.19 t3wr_ca

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_ca

Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Anzahl richtiger relevanter
Rekonstruktionen (d.h. aus Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t3wr_ca	271	3.75	1.24	0.0	6.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.20 t3wr_ls

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_ls

Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: laengste relevante Serie (d.h. aus Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3wr_ls	271	2.90	0.56	1.0	6.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.21 t3wr_l2s

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_l2s

Label: t3 Wortspanne einsilbig ruckwaerts: Mittelwert der beiden laengsten relevanten Serien (d.h. aus Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3wr_l2s	271	2.77	0.52	1.0	6.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.22 t3wr_ma

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_ma

Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Mittelwert aller relevanten Serien (d.h. Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3wr_ma	271	2.31	0.41	1.0	5.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.23 t3wr_m4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_m4

Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Mittelwert der letzten vier relevanten Serien
(d.h. Item 7-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3wr_m4	271	2.25	0.47	1.0	5.5

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.24 t3wv_ca

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_ca

Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Anzahl richtiger relevanter Rekonstruktionen
(d.h. aus Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t3wv_ca	274	3.86	1.06	0.0	7.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.25 t3wv_ls

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_ls

Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: laengste relevante Serie (d.h. aus Items 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3wv_ls	274	3.82	0.53	3.0	5.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.26 t3wv_l2s

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_l2s

Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Mittelwert der beiden laengsten relevanten Serien (d.h. aus Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3wv_l2s	274	3.72	0.51	2.5	5.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.27 t3wv_ma

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_ma

Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Mittelwert aller relevanten Serien (d.h. Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3wv_ma	274	3.20	0.53	1.8	4.5

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.28 t3wv_m4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_m4

Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Mittelwert der letzten vier relevanten Serien
(d.h. Item 7-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3wv_m4	274	3.08	0.64	1.0	4.8

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.29 t3zr_ca

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_ca

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Anzahl richtiger relevanter Rekonstruktionen (d.h. aus Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3zr_ca	266	3.97	1.17	0.0	6.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.30 t3zr_ls

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_ls

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: laengste relevante Serie (d.h. aus Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3zr_ls	266	2.88	0.61	1.0	6.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.31 t3zr_l2s

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_l2s

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Mittelwert der beiden laengsten relevanten Serien
(d.h. aus Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3zr_l2s	266	2.74	0.57	1.0	6.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.32 t3zr_ma

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_ma

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Mittelwert aller relevanten Serien (d.h. Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3zr_ma	266	2.29	0.47	1.0	5.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.33 t3zr_m4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_m4

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Mittelwert der letzten vier relevanten Serien (d.h. Item 7-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3zr_m4	266	2.26	0.56	1.0	5.5

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.34 t3zv_ca

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_ca

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Anzahl richtiger relevanter Rekonstruktionen (d.h. aus Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3zv_ca	273	4.05	0.96	2.0	7.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.35 t3zv_ls

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_ls

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: laengste relevante Serie (d.h. aus Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3zv_ls	273	3.99	0.68	2.0	7.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.36 t3zv_l2s

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_l2s

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Mittelwert der beiden laengsten relevanten Serien
(d.h. aus Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3zv_l2s	273	3.88	0.62	2.0	6.5

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.37 t3zv_ma

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_ma

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Mittelwert aller relevanten Serien (d.h. Item 3-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3zv_ma	273	3.43	0.61	1.5	5.4

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.38 t3zv_m4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_m4

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Mittelwert der letzten vier relevanten Serien (d.h. Item 7-10)

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3zv_m4	273	3.39	0.70	1.2	6.2

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.39 t3wv_s1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_s1

Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Serie (Itemnummer) 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_s1	274	1.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.40 t3wv_s2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_s2
 Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Serie (Itemnummer) 2
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_s2	274	2.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.41 t3wv_s3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_s3

Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Serie (Itemnummer) 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_s3	274	3.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.42 t3wv_s4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_s4
 Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Serie (Itemnummer) 4
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_s4	274	4.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.43 t3wv_s5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_s5
 Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Serie (Itemnummer) 5
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_s5	274	5.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.44 t3wv_s6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_s6
 Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Serie (Itemnummer) 6
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_s6	274	6.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.45 t3wv_s7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_s7
 Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Serie (Itemnummer) 7
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_s7	274	7.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.46 t3wv_s8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_s8

Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Serie (Itemnummer) 8

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_s8	274	8.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.47 t3wv_s9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_s9
 Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Serie (Itemnummer) 9
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_s9	274	9.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.48 t3wv_s10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_s10

Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Serie (Itemnummer) 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_s10	274	10.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.49 t3wv_l1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_l1
 Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 1
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_l1	274	2.01	0.15

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.50 t3wv_l2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_l2
 Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 2
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_l2	274	3.00	0.18

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.51 t3wv_l3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_l3
 Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 3
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_l3	274	3.74	0.68

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.52 t3wv_l4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_l4
 Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 4
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_l4	274	3.74	0.68

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.53 t3wv_l5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_l5
 Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 5
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_l5	274	3.99	0.84

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.54 t3wv_l6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_l6
 Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 6
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_l6	274	3.99	0.84

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.55 t3wv_l7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_l7
 Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 7
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_l7	274	3.60	0.71

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.56 t3wv_l8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_l8
 Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 8
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_l8	274	3.60	0.71

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.57 t3wv_l9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_l9
 Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 9
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_l9	274	3.55	0.78

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.58 t3wv_l10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_l10

Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_l10	274	3.55	0.78

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.59 t3wv_i1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_i1

Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_i1	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.2	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.60 t3wv_i2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_i2

Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 2

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_i2	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.2	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.61 t3wv_i3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_i3

Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_i3	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.2	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.62 t3wv_i4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_i4

Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 4

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_i4	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.2	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.63 t3wv_i5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_i5

Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 5

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_i5	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.2	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.64 t3wv_i6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_i6

Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 6

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_i6	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.2	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.65 t3wv_i7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_i7

Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 7

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_i7	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.2	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.66 t3wv_i8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_i8

Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 8

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_i8	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.2	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.67 t3wv_i9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_i9

Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 9

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_i9	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.2	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.68 t3wv_i10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_i10

Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_i10	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.2	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.69 t3wv_r1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_r1
 Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 1
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_r1	274	0.99	0.10

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	1.1	1.0
1	richtig	98.9	88.9
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.70 t3wv_r2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_r2
 Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 2
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_r2	274	0.86	0.34

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	13.5	12.1
1	richtig	86.5	77.7
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.71 t3wv_r3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_r3

Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_r3	274	0.62	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	38.0	34.1
1	richtig	62.0	55.7
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.72 t3wv_r4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_r4
 Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 4
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_r4	274	0.63	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	36.9	33.1
1	richtig	63.1	56.7
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.73 t3wv_r5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_r5
 Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 5
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_r5	274	0.38	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	62.0	55.7
1	richtig	38.0	34.1
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.74 t3wv_r6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_r6
 Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 6
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_r6	274	0.23	0.42

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	77.0	69.2
1	richtig	23.0	20.7
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.75 t3wv_r7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_r7
 Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 7
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_r7	274	0.53	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	46.7	42.0
1	richtig	53.3	47.9
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.76 t3wv_r8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_r8
 Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 8
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_r8	274	0.42	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	58.0	52.1
1	richtig	42.0	37.7
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.77 t3wv_r9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_r9
 Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 9
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_r9	274	0.55	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	44.9	40.3
1	richtig	55.1	49.5
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.78 t3wv_r10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_r10

Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = falsch; 1 = richtig

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wv_r10	274	0.49	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	50.7	45.6
1	richtig	49.3	44.3
-999	missing	–	10.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 274$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.79 t3zv_s1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_s1
 Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Serie (Itemnummer) 1
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_s1	273	1.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 273$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.80 t3zv_s2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_s2
 Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Serie (Itemnummer) 2
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_s2	273	2.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 273$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.81 t3zv_s3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_s3
 Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Serie (Itemnummer) 3
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_s3	273	3.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 273$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.82 t3zv_s4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_s4
 Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Serie (Itemnummer) 4
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_s4	273	4.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 273$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.83 t3zv_s5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_s5
 Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Serie (Itemnummer) 5
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_s5	273	5.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 273$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.84 t3zv_s6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_s6
 Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Serie (Itemnummer) 6
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_s6	273	6.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 273$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.85 t3zv_s7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_s7
 Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Serie (Itemnummer) 7
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_s7	273	7.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 273$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.86 t3zv_s8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_s8
 Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Serie (Itemnummer) 8
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_s8	273	8.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 273$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.87 t3zv_s9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_s9
 Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Serie (Itemnummer) 9
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_s9	273	9.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 273$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.88 t3zv_s10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_s10
 Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Serie (Itemnummer) 10
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_s10	273	10.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 273$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.89 t3zv_11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_11
 Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 1
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_11	273	2.01	0.15

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 273$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.90 t3zv_l2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_l2

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 2

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_l2	273	3.00	0.18

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 273$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.91 t3zv_l3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_l3

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_l3	273	3.76	0.65

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 273$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.92 t3zv_l4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_l4

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 4

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_l4	273	3.76	0.65

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 273$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.93 t3zv_15

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_15
 Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 5
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_15	273	4.08	0.87

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 273$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.94 t3zv_l6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_l6

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 6

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_l6	273	4.08	0.87

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 273$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.95 t3zv_17

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_17
 Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 7
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_17	273	3.94	0.81

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 273$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.96 t3zv_l8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_l8

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 8

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_l8	273	3.94	0.81

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 273$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.97 t3zv_l9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_l9
 Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 9
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_l9	273	3.91	0.83

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 273$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.98 t3zv_110

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_110

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: (Spannen-)Level von Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_110	273	3.91	0.83

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 273$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.99 t3zv_i1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_i1

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_i1	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.5	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.100 t3zv_i2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_i2

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 2

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_i2	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.5	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.101 t3zv_i3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_i3

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_i3	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.5	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.102 t3zv_i4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_i4

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 4

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_i4	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.5	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.103 t3zv_i5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_i5

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 5

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_i5	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.5	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.104 t3zv_i6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_i6

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 6

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_i6	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.5	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.105 t3zv_i7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_i7

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 7

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_i7	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.5	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.106 t3zv_i8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_i8

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 8

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_i8	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.5	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.107 t3zv_i9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_i9

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 9

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_i9	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.5	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.108 t3zv_i10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_i10

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Item-Wortlaut Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_i10	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		10.5	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.109 t3zv_r1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_r1

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = falsch; 1 = richtig

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_r1	273	0.99	0.10

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	1.1	1.0
1	richtig	98.9	88.5
-999	missing	–	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 273$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.110 t3zv_r2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_r2

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 2

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_r2	273	0.88	0.33

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	12.1	10.8
1	richtig	87.9	78.7
-999	missing	–	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 273$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.111 t3zv_r3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_r3

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = falsch; 1 = richtig

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_r3	273	0.64	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	35.5	31.8
1	richtig	64.5	57.7
-999	missing	–	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 273$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.112 t3zv_r4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_r4

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 4

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_r4	273	0.67	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	33.0	29.5
1	richtig	67.0	60.0
-999	missing	–	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 273$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.113 t3zv_r5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_r5

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 5

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_r5	273	0.47	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	53.1	47.5
1	richtig	46.9	42.0
-999	missing	–	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 273$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.114 t3zv_r6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_r6

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 6

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_r6	273	0.40	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	60.4	54.1
1	richtig	39.6	35.4
-999	missing	–	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 273$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.115 t3zv_r7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_r7

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 7

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_r7	273	0.51	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	48.7	43.6
1	richtig	51.3	45.9
-999	missing	–	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 273$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.116 t3zv_r8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_r8

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 8

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_r8	273	0.46	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	54.2	48.5
1	richtig	45.8	41.0
-999	missing	–	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 273$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.117 t3zv_r9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_r9

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 9

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_r9	273	0.46	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	53.8	48.2
1	richtig	46.2	41.3
-999	missing	–	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 273$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.118 t3zv_r10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_r10

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: Reaktion des Kindes Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zv_r10	273	0.44	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	56.4	50.5
1	richtig	43.6	39.0
-999	missing	–	10.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 273$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.119 t3wr_s1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_s1

Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_s1	271	1.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.120 t3wr_s2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_s2

Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 2

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_s2	271	2.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.121 t3wr_s3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_s3

Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_s3	271	3.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.122 t3wr_s4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_s4

Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 4

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_s4	271	4.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.123 t3wr_s5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_s5

Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 5

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_s5	271	5.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.124 t3wr_s6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_s6

Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 6

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_s6	271	6.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.125 t3wr_s7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_s7

Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 7

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_s7	271	7.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.126 t3wr_s8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_s8

Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 8

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_s8	271	8.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.127 t3wr_s9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_s9

Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 9

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_s9	271	9.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.128 t3wr_s10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_s10

Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_s10	271	10.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.129 t3wr_l1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_l1
 Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 1
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_l1	271	2.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.130 t3wr_l2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_l2
 Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 2
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_l2	271	2.89	0.31

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.131 t3wr_l3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_l3
 Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 3
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_l3	271	2.86	0.94

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.132 t3wr_l4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_l4
 Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 4
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_l4	271	2.86	0.94

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.133 t3wr_l5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_l5
 Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 5
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_l5	271	2.93	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.134 t3wr_l6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_l6
 Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 6
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_l6	271	2.93	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.135 t3wr_l7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_l7
 Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 7
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_l7	271	2.77	0.64

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.136 t3wr_l8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_l8
 Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 8
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_l8	271	2.77	0.64

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.137 t3wr_l9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_l9
 Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 9
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_l9	271	2.78	0.62

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.138 t3wr_l10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_l10

Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_l10	271	2.78	0.62

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.139 t3wr_i1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_i1

Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_i1	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		11.1	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.140 t3wr_i2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_i2

Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 2

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_i2	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		11.1	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.141 t3wr_i3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_i3

Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_i3	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		11.1	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.142 t3wr_i4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_i4

Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 4

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_i4	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		11.1	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.143 t3wr_i5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_i5

Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 5

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_i5	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		11.1	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.144 t3wr_i6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_i6

Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 6

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_i6	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		11.1	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.145 t3wr_i7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_i7

Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 7

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_i7	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		11.1	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.146 t3wr_i8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_i8

Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 8

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_i8	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		11.1	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.147 t3wr_i9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_i9

Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 9

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_i9	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		11.1	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.148 t3wr_i10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_i10

Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_i10	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		11.1	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.149 t3wr_r1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_r1
 Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 1
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_r1	271	0.89	0.31

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	10.7	9.5
1	richtig	89.3	79.3
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.150 t3wr_r2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_r2
 Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 2
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_r2	271	0.48	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	52.4	46.6
1	richtig	47.6	42.3
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.151 t3wr_r3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_r3

Label: t3 Wortspanne einsilbig ruckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = falsch; 1 = richtig

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_r3	271	0.55	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	45.0	40.0
1	richtig	55.0	48.9
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.152 t3wr_r4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_r4
 Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 4
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_r4	271	0.50	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	50.2	44.6
1	richtig	49.8	44.3
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.153 t3wr_r5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_r5
 Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 5
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_r5	271	0.53	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	46.9	41.6
1	richtig	53.1	47.2
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.154 t3wr_r6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_r6
 Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 6
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_r6	271	0.28	0.45

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	71.6	63.6
1	richtig	28.4	25.2
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.155 t3wr_r7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_r7
 Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 7
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_r7	271	0.44	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	55.7	49.5
1	richtig	44.3	39.3
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.156 t3wr_r8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_r8
 Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 8
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_r8	271	0.54	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	45.8	40.7
1	richtig	54.2	48.2
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.157 t3wr_r9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_r9
 Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 9
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_r9	271	0.44	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	56.5	50.2
1	richtig	43.5	38.7
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.158 t3wr_r10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wr_r10

Label: t3 Wortspanne einsilbig rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3wr_r10	271	0.46	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	53.5	47.5
1	richtig	46.5	41.3
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.159 t3zr_s1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_s1
 Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 1
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_s1	266	1.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.160 t3zr_s2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_s2
 Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 2
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_s2	266	2.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.161 t3zr_s3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_s3
 Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 3
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_s3	266	3.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.162 t3zr_s4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_s4
 Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 4
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_s4	266	4.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.163 t3zr_s5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_s5
 Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 5
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_s5	266	5.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.164 t3zr_s6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_s6
 Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 6
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_s6	266	6.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.165 t3zr_s7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_s7
 Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 7
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_s7	266	7.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.166 t3zr_s8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_s8
 Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 8
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_s8	266	8.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.167 t3zr_s9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_s9
 Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 9
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_s9	266	9.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.168 t3zr_s10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_s10

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Serie (Itemnummer) 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_s10	266	10.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.169 t3zr_l1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_l1

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_l1	266	2.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.170 t3zr_l2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_l2
 Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 2
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_l2	266	2.96	0.20

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.171 t3zr_l3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_l3

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_l3	266	2.68	0.94

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.172 t3zr_l4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_l4

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 4

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_l4	266	2.68	0.94

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.173 t3zr_l5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_l5

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 5

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_l5	266	2.92	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.174 t3zr_l6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_l6

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 6

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_l6	266	2.92	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.175 t3zr_l7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_l7
 Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 7
 Quelle: Hasselhorn et al., 2012
 Kategorien: Inf—Inf
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_l7	266	2.78	0.71

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.176 t3zr_l8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_l8

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 8

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_l8	266	2.78	0.71

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.177 t3zr_l9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_l9

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 9

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_l9	266	2.79	0.67

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.178 t3zr_l10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_l10

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: (Spannen-)Level von Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: Inf—Inf

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_l10	266	2.79	0.67

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.179 t3zr_i1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_i1

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_i1	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		12.8	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.180 t3zr_i2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_i2

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 2

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_i2	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		12.8	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.181 t3zr_i3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_i3

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_i3	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		12.8	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.182 t3zr_i4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_i4

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 4

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_i4	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		12.8	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.183 t3zr_i5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_i5

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 5

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_i5	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		12.8	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.184 t3zr_i6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_i6

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 6

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_i6	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		12.8	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.185 t3zr_i7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_i7

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 7

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_i7	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		12.8	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.186 t3zr_i8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_i8

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 8

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_i8	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		12.8	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.187 t3zr_i9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_i9

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 9

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_i9	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		12.8	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.188 t3zr_i10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_i10

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Item-Wortlaut Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_i10	305	NA	NA

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
		12.8	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.189 t3zr_r1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_r1

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 1

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_r1	266	0.96	0.20

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	4.1	3.6
1	richtig	95.9	83.6
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.190 t3zr_r2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_r2

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 2

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_r2	266	0.35	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	65.0	56.7
1	richtig	35.0	30.5
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.191 t3zr_r3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_r3

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 3

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = falsch; 1 = richtig

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_r3	266	0.61	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	39.1	34.1
1	richtig	60.9	53.1
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.192 t3zr_r4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_r4

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 4

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_r4	266	0.61	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	38.7	33.8
1	richtig	61.3	53.4
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.193 t3zr_r5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_r5

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 5

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = falsch; 1 = richtig

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_r5	266	0.42	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	57.9	50.5
1	richtig	42.1	36.7
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.194 t3zr_r6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_r6

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 6

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_r6	266	0.41	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	58.6	51.1
1	richtig	41.4	36.1
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.195 t3zr_r7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_r7

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 7

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = falsch; 1 = richtig

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_r7	266	0.48	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	52.3	45.6
1	richtig	47.7	41.6
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.196 t3zr_r8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_r8

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 8

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_r8	266	0.49	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	51.1	44.6
1	richtig	48.9	42.6
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.197 t3zr_r9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_r9

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 9

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_r9	266	0.48	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	52.3	45.6
1	richtig	47.7	41.6
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.198 t3zr_r10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_r10

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: Reaktion des Kindes Serie 10

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3zr_r10	266	0.47	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	53.4	46.6
1	richtig	46.6	40.7
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.199 t3zr_l2t

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_l2t

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: T-Wert basierend auf l2-Rohwert, Normen aus
Manual

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3zr_l2t	266	46.46	7.21	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.200 t3zr_m4t

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_m4t

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: T-Wert basierend auf m4-Rohwert, Normen aus Manual

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3zr_m4t	266	46.63	8.34	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.201 t3zr_mat

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zr_mat

Label: t3 Zahlenspanne rueckwaerts: T-Wert basierend auf mat-Rohwert, Normen aus Manual

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t3zr_mat	266	45.71	7.81	29.0	71.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.202 t3wv_l2t

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_l2t

Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: T-Wert basierend auf l2-Rohwert, Normen aus Manual

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3wv_l2t	274	49.15	7.79	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.203 t3wv_m4t

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_m4t

Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: T-Wert basierend auf m4-Rohwert, Normen
aus Manual

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3wv_m4t	274	48.54	9.20	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.204 t3wv_mat

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wv_mat

Label: t3 Wortspanne einsilbig vorwaerts: T-Wert basierend auf mat-Rohwert, Normen aus Manual

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3wv_mat	274	49.05	8.65	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.205 t3zv_l2t

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_l2t

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: T-Wert basierend auf l2-Rohwert, Normen aus
Manual

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3zv_l2t	273	47.10	7.97	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.206 t3zv_m4t

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_m4t

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: T-Wert basierend auf m4-Rohwert, Normen aus
Manual

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3zv_m4t	273	48.03	8.68	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.207 t3zv_mat

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3zv_mat

Label: t3 Zahlenspanne vorwaerts: T-Wert basierend auf mat-Rohwert, Normen aus
Manual

Quelle: Hasselhorn et al., 2012

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3zv_mat	273	47.22	8.46	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

III HTKS

III HTKS

1 HTKS Testzeitpunkt 1

1.1 Code

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Code

Label: Versuchspersonencode

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.2 t1HTKSD

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKSD
Label: t1 HTKS Testdatum
Variablentyp: Zeichenfolge
Quelle: Ponitz et al., 2009

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.3 t1HTKSB

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKSB

Label: t1 (1. Messzeitpunkt) HTKS (HeadToesKneesShoulders Test) Bemerkungen

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Ponitz et al., 2009

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.4 t1HTKS_vorhanden

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKS_vorhanden

Label: t1HTKS Daten vorhanden

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *nicht durchgefuehrt*; 1 = *nicht-regelkonformer Abbruch nach Teil 1*;
2 = *nicht-regelkonformer Abbruch nach Teil 2*; 3 = *regelkonformer Abbruch nach Teil 1*; 4 = *regelkonformer Abbruch nach Teil 2*; 5 = *alle Teile durchgefuehrt (regelkonform)*; 6 = *Abbruch anderer Typ*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	nicht durchgefuehrt	6.2	6.2
1	nicht-regelkonformer Abbruch nach Teil 1	2.6	2.6
2	nicht-regelkonformer Abbruch nach Teil 2	1.0	1.0
3	regelkonformer Abbruch nach Teil 1	3.0	3.0
4	regelkonformer Abbruch nach Teil 2	0.7	0.7
5	alle Teile durchgefuehrt (regelkonform)	86.2	86.2
6	Abbruch anderer Typ	0.3	0.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.5 t1HTKSA1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKSA1
Label: t1 HTKS Uebungsitem A1 Teil 1 (Beruehre deinen Kopf)
Quelle: Ponitz et al., 2009
Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKSA1	282	1.76	0.65

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	11.7	10.8
1	Selbstkorrektur	0.7	0.7
2	Fuesse	87.6	81.0
-999	missing	–	7.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 282$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.6 t1HTKSA2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKSA2

Label: t1 HTKS Uebungsitem A2 Teil 1 (Beruehre deine Fuesse)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKSA2	281	1.79	0.61

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	10.0	9.2
1	Selbstkorrektur	1.4	1.3
2	Kopf	88.6	81.6
-999	missing	–	7.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 281$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.7 t1HTKSB1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKSB1
Label: t1 HTKS Uebungsitem B1 Teil 1 (Beruehre deinen Kopf)
Quelle: Ponitz et al., 2009
Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKSB1	284	1.62	0.73

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	14.8	13.8
1	Selbstkorrektur	8.1	7.5
2	Fuesse	77.1	71.8
-999	missing	–	6.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 284$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.8 t1HTKSB2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKSB2

Label: t1 HTKS Uebungsitem B2 Teil 1 (Beruehre deine Fuesse)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKSB2	284	1.76	0.62

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	10.2	9.5
1	Selbstkorrektur	3.5	3.3
2	Kopf	86.3	80.3
-999	missing	–	6.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 284$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.9 t1HTKSB3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKSB3
Label: t1 HTKS Uebungsitem B3 Teil 1 (Beruehre deinen Kopf)
Quelle: Ponitz et al., 2009
Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKSB3	284	1.75	0.61

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	9.5	8.9
1	Selbstkorrektur	5.6	5.2
2	Fuesse	84.9	79.0
-999	missing	–	6.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 284$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.10 t1HTKSB4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKSB4

Label: t1 HTKS Uebungsitem B4 Teil 1 (Beruehe deine Fuesse)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKSB4	283	1.78	0.58

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	8.1	7.5
1	Selbstkorrektur	5.7	5.2
2	Kopf	86.2	80.0
-999	missing	–	7.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 283$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.11 t1HTKSZ1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKSZ1
Label: t1 HTKS Uebungssitems: Anzahl benoetigter Zusatzerklaerungen Teil 1
Quelle: Ponitz et al., 2009
Kategorien: 0 = *keine Zusatzerklaerung*; 1 = *eine Zusatzerklaerung*; 2 = *zwei Zusatzerklaerungen*; 3 = *drei Zusatzerklaerungen*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKSZ1	284	0.49	0.97

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	keine Zusatzerklaerung	75.7	70.5
1	eine Zusatzerklaerung	8.8	8.2
2	zwei Zusatzerklaerungen	6.0	5.6
3	drei Zusatzerklaerungen	9.5	8.9
-999	missing	–	6.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 284$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.12 t1HTKS1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKS1
Label: t1 HTKS Testitem 1 Teil 1 (Beruehre deinen Kopf)
Quelle: Ponitz et al., 2009
Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKS1	285	1.61	0.72

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	14.0	13.1
1	Selbstkorrektur	10.5	9.8
2	Fuesse	75.4	70.5
-999	missing	–	6.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 285$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.13 t1HTKS2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKS2

Label: t1 HTKS Testitem 2 Teil 1 (Beruehre deine Fuesse)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKS2	286	1.69	0.70

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	14.0	13.1
1	Selbstkorrektur	3.1	3.0
2	Kopf	82.9	77.7
-999	missing	–	6.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 286$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.14 t1HTKS3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKS3

Label: t1 HTKS Testitem 3 Teil 1 (Beruehre deine Fuesse)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKS3	286	1.32	0.82

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	22.7	21.3
1	Selbstkorrektur	22.7	21.3
2	Kopf	54.5	51.1
-999	missing	–	6.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 286$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.15 t1HTKS4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKS4

Label: t1 HTKS Testitem 4 Teil 1 (Beruehre deinen Kopf)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKS4	286	1.59	0.79

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	19.2	18.0
1	Selbstkorrektur	2.1	2.0
2	Fuesse	78.7	73.8
-999	missing	–	6.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 286$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.16 t1HTKS5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKS5

Label: t1 HTKS Testitem 5 Teil 1 (Beruere deine Fuesse)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKS5	286	1.57	0.78

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	18.2	17.0
1	Selbstkorrektur	6.3	5.9
2	Kopf	75.5	70.8
-999	missing	–	6.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 286$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.17 t1HTKS6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKS6
Label: t1 HTKS Testitem 6 Teil 1 (Beruere deinen Kopf)
Quelle: Ponitz et al., 2009
Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKS6	286	1.57	0.77

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	17.1	16.1
1	Selbstkorrektur	9.1	8.5
2	Fuesse	73.8	69.2
-999	missing	–	6.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 286$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.18 t1HTKS7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKS7
 Label: t1 HTKS Testitem 7 Teil 1 (Beruehre deinen Kopf)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKS7	286	1.44	0.83

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	21.7	20.3
1	Selbstkorrektur	12.2	11.5
2	Fuesse	66.1	62.0
-999	missing	–	6.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 286$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.19 t1HTKS8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKS8

Label: t1 HTKS Testitem 8 Teil 1 (Beruehre deine Fuesse)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKS8	286	1.55	0.81

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	20.6	19.3
1	Selbstkorrektur	3.8	3.6
2	Kopf	75.5	70.8
-999	missing	–	6.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 286$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.20 t1HTKS9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKS9
Label: t1 HTKS Testitem 9 Teil 1 (Beruehre deinen Kopf)
Quelle: Ponitz et al., 2009
Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKS9	286	1.53	0.82

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	21.3	20.0
1	Selbstkorrektur	4.5	4.3
2	Fuesse	74.1	69.5
-999	missing	–	6.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 286$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.21 t1HTKS10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKS10

Label: t1 HTKS Testitem 10 Teil 1 (Beruehre deine Fuesse)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKS10	285	1.54	0.80

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	19.6	18.4
1	Selbstkorrektur	6.3	5.9
2	Kopf	74.0	69.2
-999	missing	–	6.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 285$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.22 t1HTKSC1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKSC1
Label: t1 HTKS Uebungsitem C1 Teil 2 (Beruehre deine Knie)
Quelle: Ponitz et al., 2009
Kategorien: 0 = *etwas anderes als Schultern*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Schultern*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKSC1	252	1.73	0.61

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Schultern	8.3	6.9
1	Selbstkorrektur	10.7	8.9
2	Schultern	81.0	66.9
-999	missing	–	17.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 252$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.23 t1HTKSD1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKSD1

Label: t1 HTKS Uebungsitem D1 Teil 2 (Beruehre deine Knie)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Schultern*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Schultern*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKSD1	254	1.53	0.76

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Schultern	16.1	13.4
1	Selbstkorrektur	14.6	12.1
2	Schultern	69.3	57.7
-999	missing	–	16.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 254$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.24 t1HTKSD2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKSD2
Label: t1 HTKS Uebungsitem D2 Teil 2 (Beruehre deine Schultern)
Quelle: Ponitz et al., 2009
Kategorien: 0 = *etwas anderes als Knie*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Knie*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKSD2	252	1.79	0.57

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Knie	7.9	6.6
1	Selbstkorrektur	5.6	4.6
2	Knie	86.5	71.5
-999	missing	–	17.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 252$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.25 t1HTKSD3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKSD3

Label: t1 HTKS Uebungsitem D3 Teil 2 (Beruehre deine Knie)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Schultern*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Schultern*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKSD3	254	1.72	0.59

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Schultern	7.1	5.9
1	Selbstkorrektur	13.8	11.5
2	Schultern	79.1	65.9
-999	missing	–	16.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 254$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.26 t1HTKSD4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKSD4
Label: t1 HTKS Uebungsitem D4 Teil 2 (Beruehre deine Schultern)
Quelle: Ponitz et al., 2009
Kategorien: 0 = *etwas anderes als Knie*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Knie*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKSD4	252	1.83	0.51

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Knie	6.0	4.9
1	Selbstkorrektur	4.8	3.9
2	Knie	89.3	73.8
-999	missing	–	17.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 252$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.27 t1HTKSZ2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKSZ2
 Label: t1 HTKS Uebungssitems: Anzahl benoetigter Zusatzerklaerungen Teil 2
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *keine Zusatzerklaerung*; 1 = *eine Zusatzerklaerung*; 2 = *zwei Zusatzerklaerungen*; 3 = *mehr als zwei Zusatzerklaerungen*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKSZ2	254	0.43	0.70

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	keine Zusatzerklaerung	68.5	57.0
1	eine Zusatzerklaerung	20.9	17.4
2	zwei Zusatzerklaerungen	9.8	8.2
3	mehr als zwei Zusatzerklaerungen	0.8	0.7
-999	missing	–	16.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 254$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.28 t1HTKS11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKS11
Label: t1 HTKS Testitem 11 Teil 2 (Beruehre deinen Kopf)
Quelle: Ponitz et al., 2009
Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKS11	253	1.43	0.80

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	19.4	16.1
1	Selbstkorrektur	18.6	15.4
2	Fuesse	62.1	51.5
-999	missing	–	17.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 253$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.29 t1HTKS12

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKS12

Label: t1 HTKS Testitem 12 Teil 2 (Beruehre deine Fuesse)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKS12	253	1.66	0.72

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	14.6	12.1
1	Selbstkorrektur	5.1	4.3
2	Kopf	80.2	66.6
-999	missing	–	17.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 253$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.30 t1HTKS13

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKS13
 Label: t1 HTKS Testitem 13 Teil 2 (Beruehre deine Knie)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Schultern*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Schultern*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKS13	253	1.47	0.79

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Schultern	19.0	15.7
1	Selbstkorrektur	15.0	12.5
2	Schultern	66.0	54.8
-999	missing	–	17.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 253$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.31 t1HTKS14

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKS14

Label: t1 HTKS Testitem 14 Teil 2 (Beruehre deine Fuesse)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKS14	253	1.20	0.87

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	29.6	24.6
1	Selbstkorrektur	20.6	17.0
2	Kopf	49.8	41.3
-999	missing	–	17.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 253$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.32 t1HTKS15

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKS15
 Label: t1 HTKS Testitem 15 Teil 2 (Beruehre deine Schultern)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Knie*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Knie*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKS15	253	1.43	0.84

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Knie	22.9	19.0
1	Selbstkorrektur	11.1	9.2
2	Knie	66.0	54.8
-999	missing	–	17.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 253$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.33 t1HTKS16

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKS16
Label: t1 HTKS Testitem 16 Teil 2 (Beruehre deinen Kopf)
Quelle: Ponitz et al., 2009
Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKS16	253	1.27	0.89

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	29.2	24.3
1	Selbstkorrektur	14.2	11.8
2	Fuesse	56.5	46.9
-999	missing	–	17.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 253$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.34 t1HTKS17

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKS17

Label: t1 HTKS Testitem 17 Teil 2 (Beruehre deine Knie)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Schultern*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Schultern*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKS17	253	1.30	0.90

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Schultern	30.0	24.9
1	Selbstkorrektur	9.9	8.2
2	Schultern	60.1	49.8
-999	missing	–	17.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 253$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.35 t1HTKS18

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKS18
Label: t1 HTKS Testitem 18 Teil 2 (Beruehre deine Knie)
Quelle: Ponitz et al., 2009
Kategorien: 0 = *etwas anderes als Schultern*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Schultern*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKS18	253	1.51	0.84

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Schultern	22.9	19.0
1	Selbstkorrektur	3.6	3.0
2	Schultern	73.5	61.0
-999	missing	–	17.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 253$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.36 t1HTKS19

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKS19
Label: t1 HTKS Testitem 19 Teil 2 (Beruehre deine Schultern)
Quelle: Ponitz et al., 2009
Kategorien: 0 = *etwas anderes als Knie*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Knie*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKS19	252	1.54	0.82

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Knie	21.0	17.4
1	Selbstkorrektur	3.6	3.0
2	Knie	75.4	62.3
-999	missing	–	17.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 252$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.37 t1HTKS20

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKS20

Label: t1 HTKS Testitem 20 Teil 2 (Beruehre deine Fuesse)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKS20	253	1.24	0.86

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	28.1	23.3
1	Selbstkorrektur	20.2	16.7
2	Kopf	51.8	43.0
-999	missing	–	17.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 253$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.38 t1HTKSE1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKSE1
 Label: t1 HTKS Uebungsitem E1 Teil 3 Regelaenderung (Beruehre deinen Kopf)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Knie*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Knie*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKSE1	227	1.41	0.89

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Knie	27.3	20.3
1	Selbstkorrektur	4.8	3.6
2	Knie	67.8	50.5
-999	missing	–	25.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 227$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.39 t1HTKSE2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKSE2
Label: t1 HTKS Uebungsitem E2 Teil 3 Regelaenderung (Beruehre deine Schultern)
Quelle: Ponitz et al., 2009
Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKSE2	227	1.43	0.89

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	26.9	20.0
1	Selbstkorrektur	3.1	2.3
2	Fuesse	70.0	52.1
-999	missing	–	25.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 227$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.40 t1HTKSF1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKSF1
Label: t1 HTKS Uebungsitem F1 Teil 3 Regelaenderung (Beruehre deinen Kopf)
Quelle: Ponitz et al., 2009
Kategorien: 0 = *etwas anderes als Knie*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Knie*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKSF1	227	1.37	0.89

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Knie	28.2	21.0
1	Selbstkorrektur	7.0	5.2
2	Knie	64.8	48.2
-999	missing	–	25.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 227$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.41 t1HTKSF2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKSF2
Label: t1 HTKS Uebungsitem F2 Teil 3 Regelaenderung (Beruehre deine Schultern)
Quelle: Ponitz et al., 2009
Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKSF2	226	1.42	0.88

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	26.1	19.3
1	Selbstkorrektur	5.3	3.9
2	Fuesse	68.6	50.8
-999	missing	–	25.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 226$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.42 t1HTKSF3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKSF3

Label: t1 HTKS Uebungsitem F3 Teil 3 Regelaenderung (Beruehre deine Fuesse)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Schultern*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Schultern*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKSF3	225	1.11	0.98

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Schultern	42.7	31.5
1	Selbstkorrektur	4.0	3.0
2	Schultern	53.3	39.3
-999	missing	–	26.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 225$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.43 t1HTKSF4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKSF4

Label: t1 HTKS Uebungsitem F4 Teil 3 Regelaenderung (Beruehre deine Knie)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKSF4	225	1.11	0.95

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	40.4	29.8
1	Selbstkorrektur	8.0	5.9
2	Kopf	51.6	38.0
-999	missing	–	26.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 225$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.44 t1HTKSZ3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKSZ3

Label: t1 HTKS Uebungssitems: Anzahl benoetigter Zusatzerklaerungen Teil 3

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *keine Zusatzerklaerung*; 1 = *eine Zusatzerklaerung*; 2 = *zwei Zusatzerklaerungen*; 3 = *mehr als zwei Zusatzerklaerungen*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKSZ3	226	1.27	0.81

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	keine Zusatzerklaerung	22.1	16.4
1	eine Zusatzerklaerung	29.2	21.6
2	zwei Zusatzerklaerungen	47.8	35.4
3	mehr als zwei Zusatzerklaerungen	0.9	0.7
-999	missing	–	25.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 226$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.45 t1HTKS21

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKS21

Label: t1 HTKS Testitem 21 Teil 3 (Beruehre deine Schultern)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKS21	229	1.00	0.96

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	46.3	34.8
1	Selbstkorrektur	7.4	5.6
2	Fuesse	46.3	34.8
-999	missing	–	24.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 229$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.46 t1HTKS22

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKS22

Label: t1 HTKS Testitem 22 Teil 3 (Beruehre deinen Kopf)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Knie*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Knie*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKS22	229	1.11	0.98

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Knie	42.4	31.8
1	Selbstkorrektur	3.9	3.0
2	Knie	53.7	40.3
-999	missing	–	24.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 229$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.47 t1HTKS23

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKS23

Label: t1 HTKS Testitem 23 Teil 3 (Beruehre deine Knie)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKS23	229	0.86	0.97

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	54.6	41.0
1	Selbstkorrektur	4.4	3.3
2	Kopf	41.0	30.8
-999	missing	–	24.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 229$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.48 t1HTKS24

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKS24
 Label: t1 HTKS Testitem 24 Teil 3 (Beruehre deine Fuesse)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Schultern*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Schultern*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKS24	229	0.96	0.97

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Schultern	48.9	36.7
1	Selbstkorrektur	6.1	4.6
2	Schultern	45.0	33.8
-999	missing	–	24.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 229$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.49 t1HTKS25

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKS25

Label: t1 HTKS Testitem 25 Teil 3 (Beruehre deine Fuesse)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Schultern*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Schultern*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKS25	229	0.97	0.98

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Schultern	48.9	36.7
1	Selbstkorrektur	4.8	3.6
2	Schultern	46.3	34.8
-999	missing	–	24.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 229$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.50 t1HTKS26

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKS26

Label: t1 HTKS Testitem 26 Teil 3 (Beruehre deine Knie)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKS26	229	0.78	0.95

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	59.0	44.3
1	Selbstkorrektur	4.4	3.3
2	Kopf	36.7	27.5
-999	missing	–	24.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 229$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.51 t1HTKS27

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKS27
Label: t1 HTKS Testitem 27 Teil 3 (Beruehre deine Schultern)
Quelle: Ponitz et al., 2009
Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKS27	229	0.83	0.97

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	56.8	42.6
1	Selbstkorrektur	3.9	3.0
2	Fuesse	39.3	29.5
-999	missing	–	24.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 229$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.52 t1HTKS28

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKS28

Label: t1 HTKS Testitem 28 Teil 3 (Beruehre deinen Kopf)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Knie*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Knie*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKS28	228	0.86	0.95

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Knie	53.5	40.0
1	Selbstkorrektur	7.5	5.6
2	Knie	39.0	29.2
-999	missing	–	25.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 228$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.53 t1HTKS29

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKS29

Label: t1 HTKS Testitem 29 Teil 3 (Beruehre deinen Kopf)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Knie*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Knie*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKS29	228	0.93	0.98

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Knie	52.2	39.0
1	Selbstkorrektur	3.1	2.3
2	Knie	44.7	33.4
-999	missing	–	25.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 228$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.54 t1HTKS30

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKS30

Label: t1 HTKS Testitem 30 Teil 3 (Beruehre deine Schultern)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1HTKS30	228	0.92	0.99

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	52.6	39.3
1	Selbstkorrektur	2.6	2.0
2	Fuesse	44.7	33.4
-999	missing	–	25.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 228$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.55 t1HTKSS1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKSS1

Label: t1 HTKS Rohwertsumme Teil 1 PC-Berechnung

Quelle: Ponitz et al., 2009

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t1HTKSS1	286	15.41	6.11	0.0	20.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.56 t1HTKSS2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKSS2

Label: t1 HTKS Rohwertsumme Teil 2 PC-Berechnung

Quelle: Ponitz et al., 2009

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t1HTKSS2	278	12.78	6.74	0.0	20.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.57 t1HTKSS3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKSS3

Label: t1 HTKS Rohwertsumme Teil 3 PC-Berechnung

Quelle: Ponitz et al., 2009

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t1HTKSS3	274	7.66	7.14	0.0	20.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.58 t1HTKSRW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKSRW

Label: t1 HTKS Summenscore gesamt PC-Berechnung (d.h. Teil 1-3)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t1HTKSRW	274	35.96	16.94	0.0	60.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.59 t1HTKSS1_miss

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKSS1_miss
Label: t1 HTKS Anzahl Missings Teil 1
Quelle: Ponitz et al., 2009
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1HTKSS1_miss	305	0.63	2.42	0.0	10.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.60 t1HTKSS2_miss

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKSS2_miss
Label: t1 HTKS Anzahl Missings Teil 2
Quelle: Ponitz et al., 2009
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1HTKSS2_miss	286	0.28	1.65	0.0	10.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

III HTKS

1 HTKS TESTZEITPUNKT 1

1.61 t1HTKSS3_miss

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1HTKSS3_miss
Label: t1 HTKS Anzahl Missings Teil 3
Quelle: Ponitz et al., 2009
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1HTKSS3_miss	278	0.12	1.05	0.0	10.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2 HTKS Testzeitpunkt 2

2.1 t2HTKS_Bemerk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS_Bemerk
Label: t2HTKS Bemerkungen
Variablentyp: Zeichenfolge
Quelle: Ponitz et al., 2009

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.2 t2HTKS_vorhanden

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS_vorhanden

Label: t2HTKS Daten vorhanden

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *nicht durchgefuehrt*; 1 = *nicht-regelkonformer Abbruch nach Teil 1*;
2 = *nicht-regelkonformer Abbruch nach Teil 2*; 3 = *regelkonformer Abbruch nach Teil 1*; 4 = *regelkonformer Abbruch nach Teil 2*; 5 = *alle Teile durchgefuehrt (regelkonform)*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	nicht durchgefuehrt	12.1	12.1
1	nicht-regelkonformer Abbruch nach Teil 1	1.3	1.3
2	nicht-regelkonformer Abbruch nach Teil 2	4.9	4.9
3	regelkonformer Abbruch nach Teil 1	2.0	2.0
4	regelkonformer Abbruch nach Teil 2	3.9	3.9
5	alle Teile durchgefuehrt (regelkonform)	75.7	75.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.3 t2HTKSD

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKSD
Label: t2 HTKS Testdatum
Variablentyp: Zeichenfolge
Quelle: Ponitz et al., 2009

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.4 t2HTKSA1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKSA1
Label: t2 HTKS Uebungsitem A1 Teil 1 (Beruehre deinen Kopf)
Quelle: Ponitz et al., 2009
Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKSA1	259	1.87	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	5.8	4.9
1	Selbstkorrektur	1.2	1.0
2	Fuesse	93.1	79.0
-999	missing	–	15.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 259$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.5 t2HTKSA2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKSA2

Label: t2 HTKS Uebungsitem A2 Teil 1 (Beruehre deine Fuesse)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKSA2	258	1.91	0.40

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	3.9	3.3
1	Selbstkorrektur	0.8	0.7
2	Kopf	95.3	80.7
-999	missing	–	15.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 258$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.6 t2HTKSB1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKSB1
Label: t2 HTKS Uebungsitem B1 Teil 1 (Beruehre deinen Kopf)
Quelle: Ponitz et al., 2009
Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKSB1	259	1.86	0.44

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	3.9	3.3
1	Selbstkorrektur	6.2	5.2
2	Fuesse	90.0	76.4
-999	missing	–	15.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 259$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.7 t2HTKSB2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKSB2
Label: t2 HTKS Uebungsitem B2 Teil 1 (Beruehre deine Fuesse)
Quelle: Ponitz et al., 2009
Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKSB2	259	1.93	0.30

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	1.5	1.3
1	Selbstkorrektur	3.5	3.0
2	Kopf	95.0	80.7
-999	missing	–	15.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 259$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.8 t2HTKSB3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKSB3
 Label: t2 HTKS Uebungsitem B3 Teil 1 (Beruehre deinen Kopf)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKSB3	259	1.94	0.31

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	1.9	1.6
1	Selbstkorrektur	1.9	1.6
2	Fuesse	96.1	81.6
-999	missing	–	15.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 259$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.9 t2HTKSB4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKSB4

Label: t2 HTKS Uebungsitem B4 Teil 1 (Beruehe deine Fuesse)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKSB4	258	1.95	0.30

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	1.9	1.6
1	Selbstkorrektur	1.6	1.3
2	Kopf	96.5	81.6
-999	missing	–	15.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 258$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.10 t2HTKSZ1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKSZ1
 Label: t2 HTKS Uebungsitems: Anzahl benoetigter Zusatzerklaerungen Teil 1
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *keine Zusatzerklaerung*; 1 = *eine Zusatzerklaerung*; 2 = *zwei Zusatzerklaerungen*; 3 = *drei Zusatzerklaerungen*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKSZ1	257	0.18	0.54

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	keine Zusatzerklaerung	88.3	74.4
1	eine Zusatzerklaerung	7.4	6.2
2	zwei Zusatzerklaerungen	2.7	2.3
3	drei Zusatzerklaerungen	1.6	1.3
-999	missing	–	15.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 257$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.11 t2HTKS1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS1
 Label: t2 HTKS Testitem 1 Teil 1 (Beruehre deinen Kopf)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKS1	268	1.82	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	5.2	4.6
1	Selbstkorrektur	7.5	6.6
2	Fuesse	87.3	76.7
-999	missing	–	12.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 268$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.12 t2HTKS2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS2

Label: t2 HTKS Testitem 2 Teil 1 (Beruehre deine Fuesse)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKS2	268	1.84	0.51

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	6.3	5.6
1	Selbstkorrektur	3.0	2.6
2	Kopf	90.7	79.7
-999	missing	–	12.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 268$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.13 t2HTKS3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS3

Label: t2 HTKS Testitem 3 Teil 1 (Beruehre deine Fuesse)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKS3	268	1.49	0.69

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	11.6	10.2
1	Selbstkorrektur	28.4	24.9
2	Kopf	60.1	52.8
-999	missing	–	12.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 268$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.14 t2HTKS4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS4

Label: t2 HTKS Testitem 4 Teil 1 (Beruehre deinen Kopf)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKS4	268	1.81	0.57

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	8.2	7.2
1	Selbstkorrektur	2.6	2.3
2	Fuesse	89.2	78.4
-999	missing	–	12.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 268$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.15 t2HTKS5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS5

Label: t2 HTKS Testitem 5 Teil 1 (Beruere deine Fuesse)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKS5	268	1.84	0.52

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	6.7	5.9
1	Selbstkorrektur	3.0	2.6
2	Kopf	90.3	79.3
-999	missing	–	12.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 268$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.16 t2HTKS6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS6

Label: t2 HTKS Testitem 6 Teil 1 (Beruere deinen Kopf)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKS6	268	1.83	0.53

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	6.7	5.9
1	Selbstkorrektur	3.7	3.3
2	Fuesse	89.6	78.7
-999	missing	–	12.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 268$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.17 t2HTKS7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS7
 Label: t2 HTKS Testitem 7 Teil 1 (Beruehre deinen Kopf)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKS7	268	1.67	0.62

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	8.2	7.2
1	Selbstkorrektur	16.8	14.8
2	Fuesse	75.0	65.9
-999	missing	–	12.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 268$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.18 t2HTKS8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS8

Label: t2 HTKS Testitem 8 Teil 1 (Beruehre deine Fuesse)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKS8	268	1.86	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	5.6	4.9
1	Selbstkorrektur	2.6	2.3
2	Kopf	91.8	80.7
-999	missing	–	12.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 268$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.19 t2HTKS9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS9
 Label: t2 HTKS Testitem 9 Teil 1 (Beruehre deinen Kopf)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKS9	268	1.84	0.51

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	6.3	5.6
1	Selbstkorrektur	3.7	3.3
2	Fuesse	89.9	79.0
-999	missing	–	12.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 268$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.20 t2HTKS10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS10

Label: t2 HTKS Testitem 10 Teil 1 (Beruehre deine Fuesse)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKS10	268	1.79	0.55

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	7.1	6.2
1	Selbstkorrektur	6.3	5.6
2	Kopf	86.6	76.1
-999	missing	–	12.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 268$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.21 t2HTKSC1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKSC1

Label: t2 HTKS Uebungsitem C1 Teil 2 (Beruehre deine Knie)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Schultern*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Schultern*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKSC1	256	1.85	0.44

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Schultern	3.1	2.6
1	Selbstkorrektur	9.0	7.5
2	Schultern	87.9	73.8
-999	missing	–	16.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 256$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.22 t2HTKSD1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKSD1

Label: t2 HTKS Uebungsitem D1 Teil 2 (Beruehre deine Knie)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Schultern*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Schultern*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKSD1	255	1.71	0.59

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Schultern	7.1	5.9
1	Selbstkorrektur	15.3	12.8
2	Schultern	77.6	64.9
-999	missing	–	16.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 255$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.23 t2HTKSD2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKSD2
 Label: t2 HTKS Uebungsitem D2 Teil 2 (Beruehre deine Schultern)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Knie*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Knie*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKSD2	256	1.92	0.35

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Knie	2.3	2.0
1	Selbstkorrektur	3.5	3.0
2	Knie	94.1	79.0
-999	missing	–	16.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 256$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.24 t2HTKSD3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKSD3
 Label: t2 HTKS Uebungsitem D3 Teil 2 (Beruehre deine Knie)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Schultern*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Schultern*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKSD3	256	1.91	0.32

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Schultern	1.2	1.0
1	Selbstkorrektur	6.6	5.6
2	Schultern	92.2	77.4
-999	missing	–	16.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 256$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.25 t2HTKSD4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKSD4
 Label: t2 HTKS Uebungsitem D4 Teil 2 (Beruehre deine Schultern)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Knie*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Knie*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKSD4	256	1.94	0.29

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Knie	1.2	1.0
1	Selbstkorrektur	3.9	3.3
2	Knie	94.9	79.7
-999	missing	–	16.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 256$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.26 t2HTKSZ2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKSZ2
Label: t2 HTKS Uebungsitems: Anzahl benoetigter Zusatzerklaerungen Teil 2
Quelle: Ponitz et al., 2009
Kategorien: 0 = *keine Zusatzerklaerung*; 1 = *eine Zusatzerklaerung*; 2 = *zwei Zusatzerklaerungen*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKSZ2	256	0.19	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	keine Zusatzerklaerung	84.8	71.1
1	eine Zusatzerklaerung	11.3	9.5
2	zwei Zusatzerklaerungen	3.9	3.3
-999	missing	–	16.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 256$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.27 t2HTKS11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS11
 Label: t2 HTKS Testitem 11 Teil 2 (Beruehre deinen Kopf)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKS11	258	1.64	0.66

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	10.1	8.5
1	Selbstkorrektur	15.9	13.4
2	Fuesse	74.0	62.6
-999	missing	–	15.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 258$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.28 t2HTKS12

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS12
 Label: t2 HTKS Testitem 12 Teil 2 (Beruehre deine Fuesse)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKS12	258	1.79	0.57

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	7.8	6.6
1	Selbstkorrektur	5.8	4.9
2	Kopf	86.4	73.1
-999	missing	–	15.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 258$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.29 t2HTKS13

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS13

Label: t2 HTKS Testitem 13 Teil 2 (Beruehre deine Knie)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Schultern*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Schultern*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKS13	258	1.60	0.71

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Schultern	13.2	11.1
1	Selbstkorrektur	13.6	11.5
2	Schultern	73.3	62.0
-999	missing	–	15.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 258$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.30 t2HTKS14

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS14

Label: t2 HTKS Testitem 14 Teil 2 (Beruehre deine Fuesse)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKS14	258	1.34	0.77

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	18.6	15.7
1	Selbstkorrektur	29.1	24.6
2	Kopf	52.3	44.3
-999	missing	–	15.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 258$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.31 t2HTKS15

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS15
 Label: t2 HTKS Testitem 15 Teil 2 (Beruehre deine Schultern)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Knie*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Knie*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKS15	258	1.57	0.74

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Knie	14.7	12.5
1	Selbstkorrektur	13.6	11.5
2	Knie	71.7	60.7
-999	missing	–	15.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 258$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.32 t2HTKS16

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS16
Label: t2 HTKS Testitem 16 Teil 2 (Beruehre deinen Kopf)
Quelle: Ponitz et al., 2009
Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKS16	258	1.44	0.80

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	19.4	16.4
1	Selbstkorrektur	17.4	14.8
2	Fuesse	63.2	53.4
-999	missing	–	15.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 258$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.33 t2HTKS17

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS17

Label: t2 HTKS Testitem 17 Teil 2 (Beruehre deine Knie)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Schultern*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Schultern*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKS17	258	1.55	0.74

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Schultern	15.1	12.8
1	Selbstkorrektur	14.7	12.5
2	Schultern	70.2	59.3
-999	missing	–	15.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 258$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.34 t2HTKS18

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS18

Label: t2 HTKS Testitem 18 Teil 2 (Beruehre deine Knie)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Schultern*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Schultern*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKS18	258	1.66	0.71

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Schultern	14.0	11.8
1	Selbstkorrektur	6.2	5.2
2	Schultern	79.8	67.5
-999	missing	–	15.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 258$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.35 t2HTKS19

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS19

Label: t2 HTKS Testitem 19 Teil 2 (Beruehre deine Schultern)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Knie*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Knie*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKS19	258	1.69	0.69

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Knie	12.8	10.8
1	Selbstkorrektur	5.8	4.9
2	Knie	81.4	68.9
-999	missing	–	15.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 258$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.36 t2HTKS20

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS20

Label: t2 HTKS Testitem 20 Teil 2 (Beruehre deine Fuesse)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKS20	258	1.51	0.74

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	14.7	12.5
1	Selbstkorrektur	19.4	16.4
2	Kopf	65.9	55.7
-999	missing	–	15.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 258$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.37 t2HTKSE1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKSE1
 Label: t2 HTKS Uebungsitem E1 Teil 3 Regelaenderung (Beruehre deinen Kopf)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Knie*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Knie*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKSE1	228	1.61	0.76

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Knie	16.7	12.5
1	Selbstkorrektur	5.7	4.3
2	Knie	77.6	58.0
-999	missing	–	25.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 228$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.38 t2HTKSE2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKSE2
 Label: t2 HTKS Uebungsitem E2 Teil 3 Regelaenderung (Beruehre deine Schultern)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKSE2	227	1.63	0.74

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	15.9	11.8
1	Selbstkorrektur	5.7	4.3
2	Fuesse	78.4	58.4
-999	missing	–	25.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 227$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.39 t2HTKSF1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKSF1

Label: t2 HTKS Uebungsitem F1 Teil 3 Regelaenderung (Beruehre deinen Kopf)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Knie*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Knie*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKSF1	227	1.51	0.79

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Knie	18.9	14.1
1	Selbstkorrektur	11.0	8.2
2	Knie	70.0	52.1
-999	missing	–	25.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 227$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.40 t2HTKSF2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKSF2
 Label: t2 HTKS Uebungsitem F2 Teil 3 Regelaenderung (Beruehre deine Schultern)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKSF2	225	1.53	0.79

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	18.7	13.8
1	Selbstkorrektur	9.8	7.2
2	Fuesse	71.6	52.8
-999	missing	–	26.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 225$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.41 t2HTKSF3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKSF3

Label: t2 HTKS Uebungsitem F3 Teil 3 Regelaenderung (Beruehre deine Fuesse)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Schultern*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Schultern*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKSF3	226	1.31	0.89

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Schultern	28.8	21.3
1	Selbstkorrektur	11.1	8.2
2	Schultern	60.2	44.6
-999	missing	–	25.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 226$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.42 t2HTKSF4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKSF4

Label: t2 HTKS Uebungsitem F4 Teil 3 Regelaenderung (Beruehre deine Knie)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKSF4	225	1.27	0.90

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	30.7	22.6
1	Selbstkorrektur	11.6	8.5
2	Kopf	57.8	42.6
-999	missing	–	26.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 225$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.43 t2HTKSZ3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKSZ3
 Label: t2 HTKS Uebungsitems: Anzahl benoetigter Zusatzerklaerungen Teil 3
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *keine Zusatzerklaerung*; 1 = *eine Zusatzerklaerung*; 2 = *zwei Zusatzerklaerungen*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKSZ3	226	0.96	0.84

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	keine Zusatzerklaerung	36.7	27.2
1	eine Zusatzerklaerung	31.0	23.0
2	zwei Zusatzerklaerungen	31.9	23.6
-999	missing	–	25.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 226$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.44 t2HTKS21

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS21

Label: t2 HTKS Testitem 21 Teil 3 (Beruehre deine Schultern)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKS21	231	1.29	0.91

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	30.7	23.3
1	Selbstkorrektur	10.0	7.5
2	Fuesse	59.3	44.9
-999	missing	–	24.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 231$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.45 t2HTKS22

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS22

Label: t2 HTKS Testitem 22 Teil 3 (Beruehre deinen Kopf)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Knie*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Knie*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKS22	231	1.39	0.89

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Knie	27.3	20.7
1	Selbstkorrektur	6.1	4.6
2	Knie	66.7	50.5
-999	missing	–	24.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 231$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.46 t2HTKS23

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS23
 Label: t2 HTKS Testitem 23 Teil 3 (Beruehre deine Knie)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKS23	231	1.15	0.95

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	39.0	29.5
1	Selbstkorrektur	7.4	5.6
2	Kopf	53.7	40.7
-999	missing	–	24.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 231$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.47 t2HTKS24

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS24
 Label: t2 HTKS Testitem 24 Teil 3 (Beruehre deine Fuesse)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Schultern*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Schultern*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKS24	231	1.17	0.95

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Schultern	37.7	28.5
1	Selbstkorrektur	7.4	5.6
2	Schultern	55.0	41.6
-999	missing	–	24.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 231$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.48 t2HTKS25

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS25
 Label: t2 HTKS Testitem 25 Teil 3 (Beruehre deine Fuesse)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Schultern*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Schultern*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKS25	231	1.29	0.94

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Schultern	33.3	25.2
1	Selbstkorrektur	4.3	3.3
2	Schultern	62.3	47.2
-999	missing	–	24.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 231$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.49 t2HTKS26

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS26

Label: t2 HTKS Testitem 26 Teil 3 (Beruehre deine Knie)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKS26	231	1.23	0.93

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	34.2	25.9
1	Selbstkorrektur	8.7	6.6
2	Kopf	57.1	43.3
-999	missing	–	24.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 231$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.50 t2HTKS27

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS27
 Label: t2 HTKS Testitem 27 Teil 3 (Beruehre deine Schultern)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKS27	231	1.14	0.95

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	38.5	29.2
1	Selbstkorrektur	8.7	6.6
2	Fuesse	52.8	40.0
-999	missing	–	24.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 231$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.51 t2HTKS28

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS28
 Label: t2 HTKS Testitem 28 Teil 3 (Beruehre deinen Kopf)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Knie*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Knie*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKS28	231	1.25	0.93

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Knie	33.3	25.2
1	Selbstkorrektur	8.2	6.2
2	Knie	58.4	44.3
-999	missing	–	24.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 231$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.52 t2HTKS29

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS29

Label: t2 HTKS Testitem 29 Teil 3 (Beruehre deinen Kopf)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Knie*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Knie*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKS29	231	1.33	0.92

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Knie	31.2	23.6
1	Selbstkorrektur	4.3	3.3
2	Knie	64.5	48.9
-999	missing	–	24.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 231$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.53 t2HTKS30

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKS30

Label: t2 HTKS Testitem 30 Teil 3 (Beruehre deine Schultern)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2HTKS30	231	1.28	0.92

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	31.6	23.9
1	Selbstkorrektur	8.7	6.6
2	Fuesse	59.7	45.2
-999	missing	–	24.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 231$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.54 t2HTKSS1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKSS1

Label: t2 HTKS Rohwertsumme Teil 1 PC-Berechnung

Quelle: Ponitz et al., 2009

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t2HTKSS1	268	17.78	3.74	0.0	20.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.55 t2HTKSS2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKSS2

Label: t2 HTKS Rohwertsumme Teil 2 PC-Berechnung

Quelle: Ponitz et al., 2009

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t2HTKSS2	264	15.42	5.30	0.0	20.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

2.56 t2HTKSS3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKSS3

Label: t2 HTKS Rohwertsumme Teil 3 PC-Berechnung

Quelle: Ponitz et al., 2009

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t2HTKSS3	249	11.62	6.92	0.0	20.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.57 t2HTKSRW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKSRW

Label: t2 HTKS Summenscore gesamt PC-Berechnung (d.h. Teil 1-3)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2HTKSRW	249	45.03	13.18	0.0	60.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.58 t2HTKSS1_miss

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKSS1_miss
Label: t2 HTKS Anzahl Missings Teil 1
Quelle: Ponitz et al., 2009
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2HTKSS1_miss	305	1.21	3.27	0.0	10.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.59 t2HTKSS2_miss

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKSS2_miss

Label: t2 HTKS Anzahl Missings Teil 2

Quelle: Ponitz et al., 2009

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2HTKSS2_miss	268	0.15	1.21	0.0	10.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

III HTKS

2 HTKS TESTZEITPUNKT 2

2.60 t2HTKSS3_miss

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2HTKSS3_miss
Label: t2 HTKS Anzahl Missings Teil 3
Quelle: Ponitz et al., 2009
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2HTKSS3_miss	264	0.57	2.32	0.0	10.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3 HTKS Testzeitpunkt 3

3.1 HTKS_Bemerk_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: HTKS_Bemerk_1
Label: t3 HTKS Bemerkungen
Variablentyp: Zeichenfolge
Quelle: Ponitz et al., 2009

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.2 t3HTKS_vorhanden

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKS_vorhanden
 Label: t3HTKS Daten vorhanden
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *nicht durchgefuehrt*; 1 = *nicht-regelkonformer Abbruch nach Teil 1*;
 2 = *nicht-regelkonformer Abbruch nach Teil 2*; 3 = *regelkonformer Abbruch nach Teil 1*; 4 = *regelkonformer Abbruch nach Teil 2*; 5 = *alle Teile durchgefuehrt (regelkonform)*; 6 = *Abbruch anderer Typ*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	nicht durchgefuehrt	11.1	11.1
1	nicht-regelkonformer Abbruch nach Teil 1	0.0	0.0
2	nicht-regelkonformer Abbruch nach Teil 2	0.7	0.7
3	regelkonformer Abbruch nach Teil 1	0.0	0.0
4	regelkonformer Abbruch nach Teil 2	1.0	1.0
5	alle Teile durchgefuehrt (regelkonform)	87.2	87.2
6	Abbruch anderer Typ	0.0	0.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.3 t3HTKSD

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKSD
Label: t3 HTKS Testdatum
Variablentyp: Zeichenfolge
Quelle: Ponitz et al., 2009

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.4 t3HTKSA1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKSA1
 Label: t3 HTKS Uebungsitem A1 Teil 1 (Beruehre deinen Kopf)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKSA1	267	1.93	0.37

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	3.4	3.0
1	Selbstkorrektur	0.4	0.3
2	Fuesse	96.3	84.3
-999	missing	–	12.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 267$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.5 t3HTKSA2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKSA2

Label: t3 HTKS Uebungsitem A2 Teil 1 (Beruehre deine Fuesse)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKSA2	267	1.97	0.23

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	1.1	1.0
1	Selbstkorrektur	0.7	0.7
2	Kopf	98.1	85.9
-999	missing	–	12.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 267$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.6 t3HTKSB1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKSB1
 Label: t3 HTKS Uebungsitem B1 Teil 1 (Beruehre deinen Kopf)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKSB1	270	1.93	0.32

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	1.9	1.6
1	Selbstkorrektur	3.3	3.0
2	Fuesse	94.8	83.9
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.7 t3HTKSB2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKSB2
 Label: t3 HTKS Uebungsitem B2 Teil 1 (Beruehre deine Fuesse)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKSB2	270	1.97	0.20

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	0.4	0.3
1	Selbstkorrektur	2.6	2.3
2	Kopf	97.0	85.9
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.8 t3HTKSB3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKSB3
Label: t3 HTKS Uebungsitem B3 Teil 1 (Beruehre deinen Kopf)
Quelle: Ponitz et al., 2009
Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKSB3	270	1.93	0.28

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	0.7	0.7
1	Selbstkorrektur	5.2	4.6
2	Fuesse	94.1	83.3
-999	missing	–	11.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 270$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.9 t3HTKSB4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKSB4

Label: t3 HTKS Uebungsitem B4 Teil 1 (Beruehe deine Fuesse)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKSB4	267	1.97	0.20

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	0.4	0.3
1	Selbstkorrektur	2.6	2.3
2	Kopf	97.0	84.9
-999	missing	–	12.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 267$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.10 t3HTKSZ1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKSZ1

Label: t3 HTKS Uebungssitems: Anzahl benoetigter Zusatzerklaerungen Teil 1

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *keine Zusatzerklaerung*; 1 = *eine Zusatzerklaerung*; 2 = *zwei Zusatzerklaerungen*; 3 = *drei Zusatzerklaerungen*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKSZ1	268	0.09	0.37

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	keine Zusatzerklaerung	93.3	82.0
1	eine Zusatzerklaerung	4.9	4.3
2	zwei Zusatzerklaerungen	1.5	1.3
3	drei Zusatzerklaerungen	0.4	0.3
-999	missing	–	12.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 268$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.11 t3HTKS1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKS1
 Label: t3 HTKS Testitem 1 Teil 1 (Beruehre deinen Kopf)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKS1	271	1.89	0.37

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	2.2	2.0
1	Selbstkorrektur	6.3	5.6
2	Fuesse	91.5	81.3
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.12 t3HTKS2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKS2

Label: t3 HTKS Testitem 2 Teil 1 (Beruehre deine Fuesse)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKS2	271	1.96	0.24

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	1.1	1.0
1	Selbstkorrektur	1.5	1.3
2	Kopf	97.4	86.6
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.13 t3HTKS3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKS3

Label: t3 HTKS Testitem 3 Teil 1 (Beruehre deine Fuesse)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKS3	271	1.54	0.64

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	8.1	7.2
1	Selbstkorrektur	29.9	26.6
2	Kopf	62.0	55.1
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.14 t3HTKS4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKS4

Label: t3 HTKS Testitem 4 Teil 1 (Beruehre deinen Kopf)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKS4	271	1.92	0.37

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	3.0	2.6
1	Selbstkorrektur	2.2	2.0
2	Fuesse	94.8	84.3
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.15 t3HTKS5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKS5
 Label: t3 HTKS Testitem 5 Teil 1 (Beruere deine Fuesse)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKS5	271	1.93	0.33

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	2.2	2.0
1	Selbstkorrektur	2.6	2.3
2	Kopf	95.2	84.6
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.16 t3HTKS6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKS6

Label: t3 HTKS Testitem 6 Teil 1 (Beruere deinen Kopf)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKS6	271	1.94	0.30

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	1.8	1.6
1	Selbstkorrektur	1.8	1.6
2	Fuesse	96.3	85.6
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.17 t3HTKS7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKS7

Label: t3 HTKS Testitem 7 Teil 1 (Beruehre deinen Kopf)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKS7	271	1.77	0.53

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	5.2	4.6
1	Selbstkorrektur	12.5	11.1
2	Fuesse	82.3	73.1
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.18 t3HTKS8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKS8
 Label: t3 HTKS Testitem 8 Teil 1 (Beruehre deine Fuesse)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKS8	271	1.88	0.40

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	3.0	2.6
1	Selbstkorrektur	5.9	5.2
2	Kopf	91.1	81.0
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.19 t3HTKS9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKS9
 Label: t3 HTKS Testitem 9 Teil 1 (Beruehre deinen Kopf)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKS9	271	1.94	0.32

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	2.2	2.0
1	Selbstkorrektur	1.8	1.6
2	Fuesse	95.9	85.2
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.20 t3HTKS10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKS10
 Label: t3 HTKS Testitem 10 Teil 1 (Beruehre deine Fuesse)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKS10	271	1.90	0.37

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	2.2	2.0
1	Selbstkorrektur	5.5	4.9
2	Kopf	92.3	82.0
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.21 t3HTKSC1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKSC1

Label: t3 HTKS Uebungsitem C1 Teil 2 (Beruehre deine Knie)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Schultern*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Schultern*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKSC1	269	1.84	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Schultern	4.8	4.3
1	Selbstkorrektur	6.3	5.6
2	Schultern	88.8	78.4
-999	missing	–	11.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 269$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.22 t3HTKSD1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKSD1
 Label: t3 HTKS Uebungsitem D1 Teil 2 (Beruehre deine Knie)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Schultern*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Schultern*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKSD1	269	1.74	0.55

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Schultern	5.6	4.9
1	Selbstkorrektur	15.2	13.4
2	Schultern	79.2	69.8
-999	missing	–	11.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 269$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.23 t3HTKSD2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKSD2

Label: t3 HTKS Uebungsitem D2 Teil 2 (Beruehre deine Schultern)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Knie*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Knie*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKSD2	269	1.96	0.26

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Knie	1.1	1.0
1	Selbstkorrektur	2.2	2.0
2	Knie	96.7	85.2
-999	missing	–	11.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 269$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.24 t3HTKSD3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKSD3
 Label: t3 HTKS Uebungsitem D3 Teil 2 (Beruehre deine Knie)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Schultern*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Schultern*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKSD3	269	1.94	0.29

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Schultern	1.5	1.3
1	Selbstkorrektur	2.6	2.3
2	Schultern	95.9	84.6
-999	missing	–	11.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 269$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.25 t3HTKSD4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKSD4
 Label: t3 HTKS Uebungsitem D4 Teil 2 (Beruehre deine Schultern)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Knie*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Knie*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKSD4	267	1.95	0.28

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Knie	1.5	1.3
1	Selbstkorrektur	1.9	1.6
2	Knie	96.6	84.6
-999	missing	–	12.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 267$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.26 t3HTKSZ2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKSZ2
 Label: t3 HTKS Uebungsitems: Anzahl benoetigter Zusatzerklaerungen Teil 2
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *keine Zusatzerklaerung*; 1 = *eine Zusatzerklaerung*; 2 = *zwei Zusatzerklaerungen*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKSZ2	271	0.17	0.43

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	keine Zusatzerklaerung	84.9	75.4
1	eine Zusatzerklaerung	12.9	11.5
2	zwei Zusatzerklaerungen	2.2	2.0
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.27 t3HTKS11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKS11

Label: t3 HTKS Testitem 11 Teil 2 (Beruehre deinen Kopf)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKS11	271	1.80	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	4.8	4.3
1	Selbstkorrektur	10.0	8.9
2	Fuesse	85.2	75.7
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.28 t3HTKS12

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKS12

Label: t3 HTKS Testitem 12 Teil 2 (Beruehre deine Fuesse)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKS12	271	1.85	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	5.2	4.6
1	Selbstkorrektur	4.8	4.3
2	Kopf	90.0	80.0
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.29 t3HTKS13

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKS13
 Label: t3 HTKS Testitem 13 Teil 2 (Beruehre deine Knie)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Schultern*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Schultern*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKS13	271	1.75	0.57

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Schultern	6.6	5.9
1	Selbstkorrektur	12.2	10.8
2	Schultern	81.2	72.1
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.30 t3HTKS14

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKS14

Label: t3 HTKS Testitem 14 Teil 2 (Beruehre deine Fuesse)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKS14	271	1.47	0.69

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	11.1	9.8
1	Selbstkorrektur	30.6	27.2
2	Kopf	58.3	51.8
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.31 t3HTKS15

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKS15

Label: t3 HTKS Testitem 15 Teil 2 (Beruehre deine Schultern)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Knie*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Knie*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKS15	271	1.73	0.58

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Knie	6.6	5.9
1	Selbstkorrektur	13.7	12.1
2	Knie	79.7	70.8
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.32 t3HTKS16

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKS16
 Label: t3 HTKS Testitem 16 Teil 2 (Beruehre deinen Kopf)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKS16	271	1.68	0.60

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	7.4	6.6
1	Selbstkorrektur	17.0	15.1
2	Fuesse	75.6	67.2
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.33 t3HTKS17

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKS17
 Label: t3 HTKS Testitem 17 Teil 2 (Beruehre deine Knie)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Schultern*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Schultern*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKS17	271	1.75	0.60

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Schultern	8.5	7.5
1	Selbstkorrektur	8.1	7.2
2	Schultern	83.4	74.1
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.34 t3HTKS18

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKS18
 Label: t3 HTKS Testitem 18 Teil 2 (Beruehre deine Knie)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Schultern*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Schultern*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKS18	271	1.80	0.56

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Schultern	7.7	6.9
1	Selbstkorrektur	4.8	4.3
2	Schultern	87.5	77.7
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.35 t3HTKS19

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKS19
 Label: t3 HTKS Testitem 19 Teil 2 (Beruehre deine Schultern)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Knie*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Knie*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKS19	271	1.83	0.53

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Knie	6.6	5.9
1	Selbstkorrektur	4.1	3.6
2	Knie	89.3	79.3
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.36 t3HTKS20

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKS20
 Label: t3 HTKS Testitem 20 Teil 2 (Beruehre deine Fuesse)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKS20	271	1.67	0.61

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	7.7	6.9
1	Selbstkorrektur	17.7	15.7
2	Kopf	74.5	66.2
-999	missing	–	11.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 271$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.37 t3HTKSE1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKSE1

Label: t3 HTKS Uebungsitem E1 Teil 3 Regelaenderung (Beruehre deinen Kopf)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Knie*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Knie*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKSE1	266	1.63	0.76

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Knie	16.9	14.8
1	Selbstkorrektur	3.0	2.6
2	Knie	80.1	69.8
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.38 t3HTKSE2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKSE2
 Label: t3 HTKS Uebungsitem E2 Teil 3 Regelaenderung (Beruehre deine Schultern)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKSE2	266	1.71	0.69

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	13.5	11.8
1	Selbstkorrektur	1.9	1.6
2	Fuesse	84.6	73.8
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.39 t3HTKSF1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKSF1

Label: t3 HTKS Übungsitem F1 Teil 3 Regelaenderung (Beruehre deinen Kopf)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Knie*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Knie*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKSF1	266	1.56	0.80

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Knie	19.9	17.4
1	Selbstkorrektur	4.1	3.6
2	Knie	75.9	66.2
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.40 t3HTKSF2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKSF2

Label: t3 HTKS Uebungsitem F2 Teil 3 Regelaenderung (Beruehre deine Schultern)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKSF2	266	1.69	0.68

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	12.4	10.8
1	Selbstkorrektur	6.0	5.2
2	Fuesse	81.6	71.1
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.41 t3HTKSF3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKSF3
 Label: t3 HTKS Uebungsitem F3 Teil 3 Regelaenderung (Beruehre deine Fuesse)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Schultern*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Schultern*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKSF3	266	1.48	0.82

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Schultern	20.7	18.0
1	Selbstkorrektur	10.2	8.9
2	Schultern	69.2	60.3
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.42 t3HTKSF4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKSF4

Label: t3 HTKS Uebungsitem F4 Teil 3 Regelaenderung (Beruehre deine Knie)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKSF4	264	1.45	0.83

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	22.0	19.0
1	Selbstkorrektur	10.6	9.2
2	Kopf	67.4	58.4
-999	missing	–	13.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 264$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.43 t3HTKSZ3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKSZ3

Label: t3 HTKS Übungsitems: Anzahl benötigter Zusatzerklärungen Teil 3

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *keine Zusatzerklärung*; 1 = *eine Zusatzerklärung*; 2 = *zwei Zusatzerklärungen*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKSZ3	267	0.87	0.84

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	keine Zusatzerklärung	41.9	36.7
1	eine Zusatzerklärung	29.6	25.9
2	zwei Zusatzerklärungen	28.1	24.6
-999	missing	–	12.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 267$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.44 t3HTKS21

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKS21
 Label: t3 HTKS Testitem 21 Teil 3 (Beruehre deine Schultern)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKS21	266	1.34	0.88

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	27.4	23.9
1	Selbstkorrektur	10.9	9.5
2	Fuesse	61.7	53.8
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.45 t3HTKS22

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKS22
 Label: t3 HTKS Testitem 22 Teil 3 (Beruehre deinen Kopf)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Knie*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Knie*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKS22	266	1.32	0.92

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Knie	31.6	27.5
1	Selbstkorrektur	4.9	4.3
2	Knie	63.5	55.4
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.46 t3HTKS23

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKS23
 Label: t3 HTKS Testitem 23 Teil 3 (Beruehre deine Knie)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKS23	266	1.23	0.92

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	33.5	29.2
1	Selbstkorrektur	10.2	8.9
2	Kopf	56.4	49.2
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.47 t3HTKS24

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKS24
 Label: t3 HTKS Testitem 24 Teil 3 (Beruehre deine Fuesse)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Schultern*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Schultern*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKS24	266	1.32	0.92

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Schultern	31.2	27.2
1	Selbstkorrektur	5.3	4.6
2	Schultern	63.5	55.4
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.48 t3HTKS25

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKS25

Label: t3 HTKS Testitem 25 Teil 3 (Beruehre deine Fuesse)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Schultern*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Schultern*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKS25	266	1.39	0.91

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Schultern	28.9	25.2
1	Selbstkorrektur	3.4	3.0
2	Schultern	67.7	59.0
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.49 t3HTKS26

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKS26
 Label: t3 HTKS Testitem 26 Teil 3 (Beruehre deine Knie)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Kopf*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Kopf*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKS26	266	1.18	0.94

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Kopf	36.8	32.1
1	Selbstkorrektur	7.9	6.9
2	Kopf	55.3	48.2
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.50 t3HTKS27

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKS27

Label: t3 HTKS Testitem 27 Teil 3 (Beruehre deine Schultern)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKS27	266	1.18	0.94

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	36.8	32.1
1	Selbstkorrektur	8.6	7.5
2	Fuesse	54.5	47.5
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.51 t3HTKS28

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKS28

Label: t3 HTKS Testitem 28 Teil 3 (Beruehre deinen Kopf)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Knie*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Knie*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKS28	266	1.15	0.95

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Knie	39.1	34.1
1	Selbstkorrektur	7.1	6.2
2	Knie	53.8	46.9
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.52 t3HTKS29

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKS29

Label: t3 HTKS Testitem 29 Teil 3 (Beruehre deinen Kopf)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Kategorien: 0 = *etwas anderes als Knie*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Knie*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKS29	266	1.30	0.94

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Knie	33.8	29.5
1	Selbstkorrektur	1.9	1.6
2	Knie	64.3	56.1
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.53 t3HTKS30

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKS30
 Label: t3 HTKS Testitem 30 Teil 3 (Beruehre deine Schultern)
 Quelle: Ponitz et al., 2009
 Kategorien: 0 = *etwas anderes als Fuesse*; 1 = *Selbstkorrektur*; 2 = *Fuesse*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3HTKS30	266	1.33	0.91

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	etwas anderes als Fuesse	30.5	26.6
1	Selbstkorrektur	5.6	4.9
2	Fuesse	63.9	55.7
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.54 t3HTKSS1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKSS1

Label: t3 HTKS Rohwertsumme Teil 1 PC-Berechnung

Quelle: Ponitz et al., 2009

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3HTKSS1	271	18.68	1.97	6.0	20.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.55 t3HTKSS2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKSS2

Label: t3 HTKS Rohwertsumme Teil 2 PC-Berechnung

Quelle: Ponitz et al., 2009

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t3HTKSS2	271	17.32	3.53	0.0	20.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.56 t3HTKSS3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKSS3

Label: t3 HTKS Rohwertsumme Teil 3 PC-Berechnung

Quelle: Ponitz et al., 2009

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t3HTKSS3	269	12.61	6.62	0.0	20.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.57 t3HTKSRW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKSRW

Label: t3 HTKS Summenscore gesamt PC-Berechnung (d.h. Teil 1-3)

Quelle: Ponitz et al., 2009

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t3HTKSRW	269	48.68	9.65	6.0	60.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.58 t3HTKSS1_miss

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKSS1_miss

Label: t3 HTKS Anzahl Missings Teil 1

Quelle: Ponitz et al., 2009

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3HTKSS1_miss	305	1.11	3.15	0.0	10.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.59 t3HTKSS2_miss

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKSS2_miss

Label: t3 HTKS Anzahl Missings Teil 2

Quelle: Ponitz et al., 2009

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3HTKSS2_miss	271	0.00	0.00	0.0	0.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

III HTKS

3 HTKS TESTZEITPUNKT 3

3.60 t3HTKSS3_miss

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3HTKSS3_miss

Label: t3 HTKS Anzahl Missings Teil 3

Quelle: Ponitz et al., 2009

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3HTKSS3_miss	305	-111.30	314.95	-999.0	10.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

IV LiSe

1 Allgemeine Infos

1.1 Code

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Code

Label: t1LiSe-DaZ Versuchspersonencode

1.2 Gebdat

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Gebdat

Label: Geburtsdatum des Kindes

Variablentyp: Zeichenfolge

1.3 Gebdat_FDZ

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Gebdat_FDZ

Label: Geburtsdatum des Kindes (zur Anonymisierung aggregiert (FDZ))

Variablentyp: Zeichenfolge

1.4 Kohorte

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Kohorte
 Label: Stichprobenkohorte
 Kategorien: 1 = *Studienbeginn 2016*; 2 = *Studienbeginn 2017*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Kohorte	305	1.20	0.40

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	Studienbeginn 2016	79.7	79.7
2	Studienbeginn 2017	20.3	20.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.5 LangDaZ

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: LangDaZ

Label: Erstsprachwerb, Bilingualitaet, Zweitspracherwerb (undifferenziert)

Kategorien: 0 = *monolingual*; 1 = *simultaneous bilingual*; 2 = *DaZ*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
LangDaZ	305	0.74	0.86

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	monolingual	53.1	53.1
1	simultaneous bilingual	19.7	19.7
2	DaZ	27.2	27.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.6 Lang

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Lang
 Label: Erstspracherwerb, Bilingualitaet, frueher vs. spaeter Zweitspracherwerb (>4 Jahre)
 Kategorien: 0 = *monolingual*; 1 = *simultaneous bilingual*; 2 = *sequential bilingual*;
 3 = *sequential bilingual late age of onset*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Lang	305	0.79	0.95

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	monolingual	53.1	53.1
1	simultaneous bilingual	19.7	19.7
2	sequential bilingual	22.3	22.3
3	sequential bilingual late age of onset	4.9	4.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.7 DeuAge

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: DeuAge

Label: In welchem Alter hat Ihr Kind angefangen Deutsch zu lernen in Monaten

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
DeuAge	83	38.93	9.28	24.0	64.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

1.8 sex

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: sex
 Label: Geschlecht des Kindes
 Kategorien: 0 = *girl*; 1 = *boy*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
sex	305	0.53	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	girl	46.6	46.6
1	boy	53.4	53.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.9 Bemerkung

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Bemerkung

Label: Bemerkungen allgemein

Variablentyp: Zeichenfolge

1.10 Kita_Gr

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Kita_Gr
 Label: Gruppenzugehörigkeit Kita 3fachgestuft
 Kategorien: 1 = *alltagsintegrierte Foerderung*; 2 = *additive Zusatzfoerderung*;
 3 = *Kontrollgruppe*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Kita_Gr	305	1.71	0.75

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	alltagsintegrierte Foerderung	46.6	46.6
2	additive Zusatzfoerderung	35.7	35.7
3	Kontrollgruppe	17.7	17.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.11 Kita_gr2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Kita_gr2
 Label: Gruppenzugehörigkeit Kita 2fachgestuft
 Kategorien: 0 = *KG*; 1 = *Foerderung*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
Kita_gr2	305	0.82	0.38

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	KG	17.7	17.7
1	Foerderung	82.3	82.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.12 KitaNr

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: KitaNr

Label: Code der Kita

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
KitaNr	305	13.29	7.24	1.0	28.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.

N_{total} = 305.

1.13 t1t2lise

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1t2lise

Label: Zeitintervall zwischen t1 und t2 LiSe Testung in Monaten (abgerundet)

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1t2lise	293	8.54	1.33	4.0	12.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.14 t2t3lise

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2t3lise

Label: Zeitintervall zwischen t2 und t3 LiSe Testung in Monaten (abgerundet)

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t2t3lise	275	5.87	0.90	2.0	9.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

1.15 t1t3lise

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1t3lise

Label: Zeitintervall zwischen t1 und t3 LiSe Testung in Monaten (abgerundet)

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t1t3lise	277	14.98	1.52	11.0	18.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

2 LiSe-DaZ Testzeitpunkt 1

2.1 t1LiSeD

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1LiSeD
Label: t1LiSe-DaZ Testdatum
Variablentyp: Zeichenfolge
Quelle: Schulz & Tracy, 2011

2.2 t1LiSeND

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1LiSeND

Label: t1LiSe-DaZ Testdatum Nachtestung

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

2.3 t1LiSeda

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1LiSeda
 Label: t1LiSe Daten vorhanden
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *t1LiSe Daten nicht vorhanden*; 1 = *t1LiSe Daten vorhanden*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1LiSeda	305	0.99	0.10

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	t1LiSe Daten nicht vorhanden	1.0	1.0
1	t1LiSe Daten vorhanden	99.0	99.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.4 t1Lise1_Bemerk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1Lise1_Bemerk

Label: t1LiSe-DaZ Bemerkungen Subtest 1

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

2.5 t1Lise2_Bemerk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1Lise2_Bemerk

Label: t1LiSe-DaZ Bemerkungen Subtest 2

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

2.6 t1Lise3_Bemerk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1Lise3_Bemerk

Label: t1LiSe-DaZ Bemerkungen Subtest 3

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

2.7 t1Lise4_Bemerk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1Lise4_Bemerk

Label: t1LiSe-DaZ Bemerkungen Subtest 4

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

2.8 t1_All

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1_All

Label: t1Testtag 1 Bemerkungen allgemein

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

2.9 t1v_01

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1v_01
 Label: t1LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Item 1
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1v_01	302	0.95	0.22

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	5.0	4.9
1	richtig	95.0	94.1
-999	missing	–	1.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 302$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.10 t1v_02

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1v_02
 Label: t1LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Item 2
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1v_02	302	0.82	0.38

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	17.9	17.7
1	richtig	82.1	81.3
-999	missing	–	1.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 302$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.11 t1v_03

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1v_03
 Label: t1LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Item 3
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1v_03	302	0.93	0.25

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	6.6	6.6
1	richtig	93.4	92.5
-999	missing	–	1.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 302$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.12 t1v_04

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1v_04
 Label: t1LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Item 4
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1v_04	301	0.82	0.39

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	18.3	18.0
1	richtig	81.7	80.7
-999	missing	–	1.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 301$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.13 t1v_05

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1v_05
 Label: t1LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Item 5
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1v_05	301	0.98	0.13

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	1.7	1.6
1	richtig	98.3	97.0
-999	missing	–	1.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 301$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.14 t1v_06

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1v_06
 Label: t1LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Item 6
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1v_06	301	0.99	0.11

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	1.3	1.3
1	richtig	98.7	97.4
-999	missing	–	1.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 301$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.15 t1v_07

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1v_07
 Label: t1LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Item 7
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1v_07	301	0.68	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	31.9	31.5
1	richtig	68.1	67.2
-999	missing	–	1.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 301$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.16 t1v_08

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1v_08
 Label: t1LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Item 8
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1v_08	301	0.96	0.19

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	3.7	3.6
1	richtig	96.3	95.1
-999	missing	–	1.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 301$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.17 t1v_09

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1v_09
 Label: t1LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Item 9
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1v_09	301	0.91	0.29

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	9.3	9.2
1	richtig	90.7	89.5
-999	missing	–	1.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 301$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.18 t1v_10

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1v_10
 Label: t1LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Item 10
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1v_10	301	0.94	0.24

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	6.3	6.2
1	richtig	93.7	92.5
-999	missing	–	1.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 301$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.19 t1v_11

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1v_11
 Label: t1LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Item 11
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1v_11	301	0.97	0.16

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	2.7	2.6
1	richtig	97.3	96.1
-999	missing	–	1.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 301$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.20 t1v_12

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1v_12
 Label: t1LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Item 12
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1v_12	301	0.85	0.36

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	15.0	14.8
1	richtig	85.0	83.9
-999	missing	–	1.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 301$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.21 t1v_u1

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1v_u1
 Label: t1LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Uebungsitem 1
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1v_u1	303	0.96	0.20

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	4.0	3.9
1	richtig	96.0	95.4
-999	missing	–	0.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 303$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.22 t1v_u2

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1v_u2
 Label: t1LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Uebungsitem 2
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1v_u2	303	0.95	0.22

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	5.3	5.2
1	richtig	94.7	94.1
-999	missing	–	0.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 303$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.23 t1v_u3

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1v_u3
 Label: t1LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Uebungsitem 3
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1v_u3	303	1.00	0.06

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	0.3	0.3
1	richtig	99.7	99.0
-999	missing	–	0.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 303$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.24 t1v_u4

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1v_u4
 Label: t1LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Uebungsitem 4
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1v_u4	302	0.96	0.20

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	4.0	3.9
1	richtig	96.0	95.1
-999	missing	–	1.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 302$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.25 t1v_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1v_RW

Label: t1LiSe-DaZ Verbbedeutung (max. 12) Rohwert

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1v_RW	301	10.81	1.58	2.0	12.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.26 t1w_01

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1w_01
 Label: t1LiSe-DaZ W-Fragen Hilfvariable Item 1
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1w_01	302	0.90	0.30

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	9.6	9.5
1	richtig	90.4	89.5
-999	missing	–	1.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 302$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.27 t1w_02

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1w_02
 Label: t1LiSe-DaZ W-Fragen Hilfvariable Item 2
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1w_02	301	0.65	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	34.6	34.1
1	richtig	65.4	64.6
-999	missing	–	1.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 301$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.28 t1w_03

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1w_03
 Label: t1LiSe-DaZ W-Fragen Hilfvariable Item 3
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1w_03	301	0.92	0.27

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	8.0	7.9
1	richtig	92.0	90.8
-999	missing	–	1.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 301$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.29 t1w_04

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1w_04
 Label: t1LiSe-DaZ W-Fragen Hilfvariable Item 4
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1w_04	301	0.52	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung]Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	47.5	46.9
1	richtig	52.5	51.8
-999	missing	–	1.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 301$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.30 t1w_05

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1w_05
 Label: t1LiSe-DaZ W-Fragen Hilfvariable Item 5
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1w_05	301	0.59	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	40.5	40.0
1	richtig	59.5	58.7
-999	missing	–	1.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 301$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.31 t1w_06

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1w_06
 Label: t1LiSe-DaZ W-Fragen Hilfvariable Item 6
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1w_06	301	0.81	0.40

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	19.3	19.0
1	richtig	80.7	79.7
-999	missing	–	1.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 301$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.32 t1w_07

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1w_07
Label: t1LiSe-DaZ W-Fragen Hilfvariable Item 7
Quelle: Schulz & Tracy, 2011
Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1w_07	301	0.94	0.23

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	5.6	5.6
1	richtig	94.4	93.1
-999	missing	–	1.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 301$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.33 t1w_08

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1w_08
Label: t1LiSe-DaZ W-Fragen Hilfvariable Item 8
Quelle: Schulz & Tracy, 2011
Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1w_08	301	0.26	0.44

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	74.1	73.1
1	richtig	25.9	25.6
-999	missing	–	1.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 301$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.34 t1w_09

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1w_09
 Label: t1LiSe-DaZ W-Fragen Hilfvariable Item 9
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1w_09	301	0.78	0.41

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	21.6	21.3
1	richtig	78.4	77.4
-999	missing	–	1.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 301$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.35 t1w_10

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1w_10
 Label: t1LiSe-DaZ W-Fragen Hilfvariable Item 10
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1w_10	301	0.79	0.41

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	21.3	21.0
1	richtig	78.7	77.7
-999	missing	–	1.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 301$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.36 t1w_u1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1w_u1
 Label: t1LiSe-DaZ W-Fragen Hilfvariable Uebungsitem 1
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1w_u1	302	0.96	0.19

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	3.6	3.6
1	richtig	96.4	95.4
-999	missing	–	1.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 302$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.37 t1w_u2

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1w_u2
 Label: t1LiSe-DaZ W-Fragen Hilfvariable Uebungsitem 2
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1w_u2	301	0.95	0.22

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	5.0	4.9
1	richtig	95.0	93.8
-999	missing	–	1.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 301$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.38 t1w_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1w_RW

Label: t1LiSe-DaZ W-Fragen (max 10) Rohwert

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1w_RW	301	7.18	2.19	0.0	10.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.39 t1ws_01

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1ws_01
 Label: t1LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Hilfsvariable Item 1
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1ws_01	302	0.90	0.30

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	9.6	9.5
1	richtig	90.4	89.5
-999	missing	–	1.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 302$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.40 t1ws_02

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1ws_02
 Label: t1LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Hilfsvariable Item 2
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1ws_02	301	0.66	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	34.2	33.8
1	richtig	65.8	64.9
-999	missing	–	1.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 301$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.41 t1ws_03

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1ws_03
 Label: t1LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Hilfvariable Item 3
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1ws_03	301	0.92	0.27

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	8.0	7.9
1	richtig	92.0	90.8
-999	missing	–	1.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 301$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.42 t1ws_04

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1ws_04
 Label: t1LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Hilfvariable Item 4
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1ws_04	301	0.76	0.43

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	23.6	23.3
1	richtig	76.4	75.4
-999	missing	–	1.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 301$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.43 t1ws_05

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1ws_05
 Label: t1LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Hilfsvariable Item 5
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1ws_05	301	0.59	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	40.5	40.0
1	richtig	59.5	58.7
-999	missing	–	1.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 301$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.44 t1ws_06

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1ws_06
 Label: t1LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Hilfsvariable Item 6
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1ws_06	301	0.81	0.40

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	19.3	19.0
1	richtig	80.7	79.7
-999	missing	–	1.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 301$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.45 t1ws_07

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1ws_07
 Label: t1LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Hilfvariable Item 7
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1ws_07	301	0.94	0.23

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	5.6	5.6
1	richtig	94.4	93.1
-999	missing	–	1.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 301$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.46 t1ws_08

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1ws_08
 Label: t1LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Hilfsvariable Item 8
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1ws_08	301	0.57	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	42.5	42.0
1	richtig	57.5	56.7
-999	missing	–	1.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 301$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.47 t1ws_09

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1ws_09
 Label: t1LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Hilfsvariable Item 9
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1ws_09	301	0.79	0.41

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	20.9	20.7
1	richtig	79.1	78.0
-999	missing	–	1.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 301$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.48 t1ws_10

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1ws_10
 Label: t1LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Hilfsvariable Item 10
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1ws_10	301	0.86	0.35

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	14.3	14.1
1	richtig	85.7	84.6
-999	missing	–	1.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 301$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.49 t1ws_u1

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1ws_u1
 Label: t1LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Hilfsvariable Uebungsitem 1
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1ws_u1	302	0.96	0.19

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	3.6	3.6
1	richtig	96.4	95.4
-999	missing	–	1.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 302$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.50 t1ws_u2

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1ws_u2
 Label: t1LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Hilfsvariable Uebungsitem 2
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1ws_u2	301	0.95	0.22

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	5.0	4.9
1	richtig	95.0	93.8
-999	missing	–	1.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 301$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.51 t1w_RWs

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1w_RWs

Label: t1LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) (max 10) Rohwert

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1w_RWs	301	7.82	2.15	0.0	10.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.52 t1n_01

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1n_01
 Label: t1LiSe-DaZ Negationen Hilfvariable Item 1
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1n_01	299	0.82	0.38

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	17.7	17.4
1	richtig	82.3	80.7
-999	missing	–	2.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 299$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.53 t1n_02

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1n_02
 Label: t1LiSe-DaZ Negationen Hilfvariable Item 2
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1n_02	300	0.54	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	46.3	45.6
1	richtig	53.7	52.8
-999	missing	–	1.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 300$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.54 t1n_03

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1n_03
 Label: t1LiSe-DaZ Negationen Hilfvariable Item 3
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1n_03	300	0.75	0.43

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	24.7	24.3
1	richtig	75.3	74.1
-999	missing	–	1.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 300$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.55 t1n_04

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1n_04
 Label: t1LiSe-DaZ Negationen Hilfvariable Item 4
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1n_04	299	0.74	0.44

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	26.4	25.9
1	richtig	73.6	72.1
-999	missing	–	2.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 299$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.56 t1n_05

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1n_05
Label: t1LiSe-DaZ Negationen Hilfvariable Item 5
Quelle: Schulz & Tracy, 2011
Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1n_05	299	0.86	0.35

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	14.4	14.1
1	richtig	85.6	83.9
-999	missing	–	2.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 299$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.57 t1n_06

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1n_06
 Label: t1LiSe-DaZ Negationen Hilfvariable Item 6
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1n_06	299	0.52	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	48.5	47.5
1	richtig	51.5	50.5
-999	missing	–	2.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 299$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.58 t1n_07

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1n_07
Label: t1LiSe-DaZ Negationen Hilfvariable Item 7
Quelle: Schulz & Tracy, 2011
Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1n_07	299	0.84	0.37

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	16.4	16.1
1	richtig	83.6	82.0
-999	missing	–	2.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 299$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.59 t1n_08

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1n_08
Label: t1LiSe-DaZ Negationen Hilfvariable Item 8
Quelle: Schulz & Tracy, 2011
Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1n_08	299	0.74	0.44

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	26.1	25.6
1	richtig	73.9	72.5
-999	missing	–	2.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 299$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.60 t1n_09

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1n_09
Label: t1LiSe-DaZ Negationen Hilfvariable Item 9
Quelle: Schulz & Tracy, 2011
Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1n_09	298	0.90	0.30

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	9.7	9.5
1	richtig	90.3	88.2
-999	missing	–	2.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 298$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.61 t1n_10

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1n_10
 Label: t1LiSe-DaZ Negationen Hilfvariable Item 10
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1n_10	299	0.79	0.41

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	21.1	20.7
1	richtig	78.9	77.4
-999	missing	–	2.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 299$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.62 t1n_11

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1n_11
 Label: t1LiSe-DaZ Negationen Hilfvariable Item 11
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1n_11	299	0.81	0.40

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	19.4	19.0
1	richtig	80.6	79.0
-999	missing	–	2.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 299$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.63 t1n_12

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1n_12
 Label: t1LiSe-DaZ Negationen Hilfvariable Item 12
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1n_12	299	0.73	0.44

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	26.8	26.2
1	richtig	73.2	71.8
-999	missing	–	2.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 299$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.64 t1n_u1

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1n_u1
 Label: t1LiSe-DaZ Negationen Hilfvariable Uebungsitem 1
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1n_u1	300	0.84	0.37

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	16.0	15.7
1	richtig	84.0	82.6
-999	missing	–	1.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 300$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.65 t1n_u2

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1n_u2
 Label: t1LiSe-DaZ Negationen Hilfvariable Uebungsitem 2
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1n_u2	300	0.88	0.33

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	12.0	11.8
1	richtig	88.0	86.6
-999	missing	–	1.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 300$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.66 t1n_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1n_RW

Label: t1LiSe-DaZ Negationen (max. 12) Rohwert

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1n_RW	300	9.00	2.24	1.0	12.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.67 t1sk_01

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sk_01

Label: t1LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 1

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t1sk_01	218	2.81	1.28	0.0	4.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 305$.

2.68 t1sk_02

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sk_02

Label: t1LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 3

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sk_02	263	3.47	0.96	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.69 t1sk_03

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sk_03

Label: t1LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 4

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sk_03	273	3.49	1.07	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.70 t1sk_04

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sk_04

Label: t1LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 5

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sk_04	279	2.73	0.60	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.71 t1sk_05

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sk_05

Label: t1LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 6

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sk_05	292	2.78	0.68	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.72 t1sk_06

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sk_06

Label: t1LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 7

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sk_06	292	3.06	1.26	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.73 t1sk_07

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sk_07

Label: t1LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 8.1

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sk_07	290	1.99	0.99	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.74 t1sk_08

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sk_08

Label: t1LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 8.2

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sk_08	279	3.71	0.78	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.75 t1sk_09

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sk_09

Label: t1LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 10.4

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sk_09	286	3.32	1.09	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.76 t1sk_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sk_10

Label: t1LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 10.5

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sk_10	255	2.97	0.86	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.77 t1sk_11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sk_11

Label: t1LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 11.1

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sk_11	286	2.96	0.83	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.78 t1sk_12

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sk_12

Label: t1LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 11.2

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sk_12	274	2.90	1.09	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.79 t1sk_13

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sk_13

Label: t1LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 12.1

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sk_13	293	2.63	0.78	0.0	3.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.80 t1sk_14

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sk_14

Label: t1LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 12.2

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sk_14	284	2.02	1.08	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.81 t1sk_15

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sk_15

Label: t1LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 12.3

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sk_15	269	2.33	1.25	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.82 t1sk_16

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sk_16

Label: t1LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 13.1

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sk_16	294	1.92	1.22	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.83 t1sk_17

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sk_17

Label: t1LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 13.3

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sk_17	289	3.26	0.98	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.84 t1sk_18

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sk_18

Label: t1LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 13.4

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sk_18	261	2.75	0.90	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.85 t1sk_19

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sk_19

Label: t1LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 14

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sk_19	289	2.47	0.85	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.86 t1sv_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sv_1

Label: t1LiSe-DaZ Subjekt-Verb-Kongruenz Gesamt

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sv_1	296	16.39	6.70	0.0	61.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.87 t1sv_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sv_2

Label: t1LiSe-DaZ Subjekt-Verb-Kongruenz Fehler

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sv_2	296	0.29	0.64	0.0	6.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.88 t1wk_P

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wk_P

Label: t1LiSe-DaZ Wortklassen Praepositionen Gesamt

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1wk_P	296	6.32	2.51	0.0	13.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.89 t1wk_F

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wk_F

Label: t1LiSe-DaZ Wortklassen Fokuspartikel Gesamt

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1wk_F	296	4.67	1.86	0.0	12.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.90 t1wk_V

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wk_V

Label: t1LiSe-DaZ Wortklassen Vollverben Gesamt

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1wk_V	296	14.93	5.46	1.0	60.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.91 t1wk_M

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wk_M

Label: t1LiSe-DaZ Wortklassen Modal- und Hilfsverben Gesamt

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1wk_M	296	6.88	3.38	0.0	24.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.92 t1wk_K

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wk_K

Label: t1LiSe-DaZ Wortklassen Konjunktionen Gesamt

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1wk_K	296	5.93	2.56	0.0	14.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.93 t1ka_1

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1ka_1
 Label: t1LiSe-DaZ Kasuszuweisung Akkusativ Aufgabe 5a
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1ka_1	284	0.68	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	32.4	30.2
1	richtig	67.6	63.0
-999	missing	–	6.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 284$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.94 t1ka_2

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1ka_2
 Label: t1LiSe-DaZ Kasuszuweisung Akkusativ Aufgabe 5b
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1ka_2	69	0.59	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	40.6	9.2
1	richtig	59.4	13.4
-999	missing	–	77.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 69$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.95 t1ka_3

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1ka_3
 Label: t1LiSe-DaZ Kasuszuweisung Akkusativ Aufgabe 10.2
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1ka_3	290	0.42	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	57.6	54.8
1	richtig	42.4	40.3
-999	missing	–	4.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 290$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.96 t1ka_4

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1ka_4
 Label: t1LiSe-DaZ Kasuszuweisung Akkusativ Aufgabe 13.2
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1ka_4	293	0.62	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	38.2	36.7
1	richtig	61.8	59.3
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.97 t1kd_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1kd_1
 Label: t1LiSe-DaZ Kasuszuweisung Dativ Aufgabe 9.1
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1kd_1	291	0.64	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung]Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	35.7	34.1
1	richtig	64.3	61.3
-999	missing	–	4.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 291$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.98 t1kd_2

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1kd_2
 Label: t1LiSe-DaZ Kasuszuweisung Dativ Aufgabe 9.2
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1kd_2	290	0.72	0.45

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	27.6	26.2
1	richtig	72.4	68.9
-999	missing	–	4.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 290$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.99 t1kd_3

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1kd_3
 Label: t1LiSe-DaZ Kasuszuweisung Dativ Aufgabe 9.3
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1kd_3	287	0.67	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	32.8	30.8
1	richtig	67.2	63.3
-999	missing	–	5.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 287$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.100 t1kd_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1kd_4
 Label: t1LiSe-DaZ Kasuszuweisung Dativ Aufgabe 10.1
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1kd_4	296	0.37	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	62.8	61.0
1	richtig	37.2	36.1
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.101 t1kd_5

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1kd_5
 Label: t1LiSe-DaZ Kasuszuweisung Dativ Aufgabe 10.3
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1kd_5	295	0.41	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	59.3	57.4
1	richtig	40.7	39.3
-999	missing	–	3.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 295$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.102 t1sk_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sk_4

Label: t1LiSe-DaZ Satzklammer Hilfvariable SummeESS 4

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sk_4	296	4.65	2.57	0.0	12.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.103 t1sk_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sk_3

Label: t1LiSe-DaZ Satzklammer Hilfvariable SummeESS 3

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sk_3	296	8.87	3.24	0.0	19.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.104 t1sk_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sk_2

Label: t1LiSe-DaZ Satzklammer Hilfvariable SummeESS 2

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sk_2	296	1.91	1.54	0.0	9.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.105 t1sk_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sk_1

Label: t1LiSe-DaZ Satzklammer Hilfvariable SummeESS 1

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sk_1	296	1.04	1.07	0.0	5.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.106 t1sk_0

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sk_0

Label: t1LiSe-DaZ Satzklammer Hilfvariable SummeESS 0

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sk_0	296	1.32	1.59	0.0	10.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.107 t1sk_ESS

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sk_ESS

Label: t1LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sk_ESS	295	3.77	0.54	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.108 t1sv_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sv_RW

Label: t1LiSe-DaZ Subjekt-Verb-Kongruenz Rohwert

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sv_RW	296	16.09	6.53	0.0	55.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.109 t1sv_RWQ

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sv_RWQ

Label: t1LiSe-DaZ Subjekt-Verb-Kongruenz Rohwert-Quotient

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sv_RWQ	296	0.97	0.12	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.110 t1ka_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1ka_RW

Label: t1LiSe-DaZ Kasuszuweisung Akkusativ Rohwert

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1ka_RW	294	1.83	1.13	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.111 t1kd_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1kd_RW

Label: t1LiSe-DaZ Kasuszuweisung Dativ Rohwert

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1kd_RW	296	2.77	1.53	0.0	5.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.112 t1k_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1k_RW

Label: t1LiSe-DaZ Kasuszuweisung Gesamt Rohwert

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1k_RW	296	4.58	2.28	0.0	9.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.113 t1sk_ESa

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sk_ESa

Label: t1LiSe-DaZ Entwicklungsstufe Gesamtpunktzahl (d.h. alle Entwicklungsstufen aufaddiert)

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sk_ESa	296	50.07	11.33	2.0	68.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.114 t1Liseagem

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1Liseagem
 Label: t1LiSe-DaZ Testalter
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t1Liseagem	302	67.04	3.93	58.0	80.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

2.115 t1LiseNagem

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1LiseNagem

Label: t1LiSe-DaZ Testalter Nachtestung

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t1LiseNagem	11	69.91	4.06	64.0	76.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

2.116 t1DeuKon

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1DeuKon
 Label: t1LiSe-DaZ Deutschkontakt
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t1DeuKon	81	28.54	9.47	9.0	50.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 305$.

2.117 t1DeuKonN

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1DeuKonN

Label: t1LiSe-DaZ Deutschkontakt Nachtestung

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t1DeuKonN	6	28.33	8.69	12.0	38.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

2.118 t1Lise_Ngr

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1Lise_Ngr

Label: LiSe-DaZ Normgruppen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 1 = *DaM 4 Jahre*; 2 = *DaM 5 Jahre*; 3 = *DaM 6 Jahre*; 4 = *DaZ 4 Jahre/0-12 Kontaktmonate*; 5 = *DaZ 4 Jahre/13-35 Kontaktmonate*; 6 = *DaZ 5 Jahre/13-47 Kontaktmonate*; 7 = *DaZ 6 Jahre/25-59 Kontaktmonate*; 666 = *zu lange Kontakt zu Deutsch*; 777 = *zu kurz Kontakt zu Deutsch*; 888 = *zu alt*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	DaM 4 Jahre	0.3	0.3
2	DaM 5 Jahre	64.9	64.3
3	DaM 6 Jahre	7.9	7.9
4	DaZ 4 Jahre/0-12 Kontaktmonate	0.0	0.0
5	DaZ 4 Jahre/13-35 Kontaktmonate	0.3	0.3
6	DaZ 5 Jahre/13-47 Kontaktmonate	20.2	20.0
7	DaZ 6 Jahre/25-59 Kontaktmonate	4.3	4.3
666	zu lange Kontakt zu Deutsch	0.0	0.0
777	zu kurz Kontakt zu Deutsch	2.0	2.0
888	zu alt	0.0	0.0
-999	missing	–	1.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{\text{valid}} = 302$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{\text{total}} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.119 t1Lise_NNgr

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1Lise_NNgr

Label: LiSe-DaZ Normgruppen Nachtestung

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 1 = *DaM 4 Jahre*; 2 = *DaM 5 Jahre*; 3 = *DaM 6 Jahre*; 4 = *DaZ 4 Jahre/0-12 Kontaktmonate*; 5 = *DaZ 4 Jahre/13-35 Kontaktmonate*; 6 = *DaZ 5 Jahre/13-47 Kontaktmonate*; 7 = *DaZ 6 Jahre/25-59 Kontaktmonate*; 666 = *zu lange Kontakt zu Deutsch*; 777 = *zu kurz Kontakt zu Deutsch*; 888 = *zu alt*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	DaM 4 Jahre	0.0	0.0
2	DaM 5 Jahre	27.3	1.0
3	DaM 6 Jahre	18.2	0.7
4	DaZ 4 Jahre/0-12 Kontaktmonate	0.0	0.0
5	DaZ 4 Jahre/13-35 Kontaktmonate	0.0	0.0
6	DaZ 5 Jahre/13-47 Kontaktmonate	27.3	1.0
7	DaZ 6 Jahre/25-59 Kontaktmonate	18.2	0.7
666	zu lange Kontakt zu Deutsch	0.0	0.0
777	zu kurz Kontakt zu Deutsch	9.1	0.3
888	zu alt	0.0	0.0
-999	missing	–	96.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{\text{valid}} = 11$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{\text{total}} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.120 t1Lise_NgrK

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1Lise_NgrK
 Label: LiSe-DaZ Normgruppen inkl. zu kurz Deutsch
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 1 = *DaM 4 Jahre*; 2 = *DaM 5 Jahre*; 3 = *DaM 6 Jahre*; 4 = *DaZ 4 Jahre/max. 12 Kontaktmonate*; 5 = *DaZ 4 Jahre/max. 35 Kontaktmonate*; 6 = *DaZ 5 Jahre/max. 47 Kontaktmonate*; 7 = *DaZ 6 Jahre/max. 59 Kontaktmonate*; 666 = *zu lange Kontakt zu Deutsch*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	DaM 4 Jahre	0.3	0.3
2	DaM 5 Jahre	64.9	64.3
3	DaM 6 Jahre	7.9	7.9
4	DaZ 4 Jahre/max. 12 Kontaktmonate	0.0	0.0
5	DaZ 4 Jahre/max. 35 Kontaktmonate	0.3	0.3
6	DaZ 5 Jahre/max. 47 Kontaktmonate	21.5	21.3
7	DaZ 6 Jahre/max. 59 Kontaktmonate	5.0	4.9
666	zu lange Kontakt zu Deutsch	0.0	0.0
-999	missing	–	1.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 302$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.121 t1Lise_NNgrK

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1Lise_NNgrK

Label: LiSe-DaZ Normgruppen Nachtestung inkl. zu kurz Deutsch

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 1 = *DaM 4 Jahre*; 2 = *DaM 5 Jahre*; 3 = *DaM 6 Jahre*; 4 = *DaZ 4 Jahre/max. 12 Kontaktmonate*; 5 = *DaZ 4 Jahre/max. 35 Kontaktmonate*; 6 = *DaZ 5 Jahre/max. 47 Kontaktmonate*; 7 = *DaZ 6 Jahre/max. 59 Kontaktmonate*; 666 = *zu lange Kontakt zu Deutsch*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	DaM 4 Jahre	0.0	0.0
2	DaM 5 Jahre	27.3	1.0
3	DaM 6 Jahre	18.2	0.7
4	DaZ 4 Jahre/max. 12 Kontaktmonate	0.0	0.0
5	DaZ 4 Jahre/max. 35 Kontaktmonate	0.0	0.0
6	DaZ 5 Jahre/max. 47 Kontaktmonate	27.3	1.0
7	DaZ 6 Jahre/max. 59 Kontaktmonate	27.3	1.0
666	zu lange Kontakt zu Deutsch	0.0	0.0
-999	missing	–	96.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 11$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.122 t1v_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1v_T
 Label: t1LiSe-DaZ T-Wert Verbbedeutung
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1v_T	301	45.91	9.14	29.0	58.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.123 t1v_Tb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1v_Tb

Label: t1LiSe-DaZ T-Wert Verbbedeutung - Simultan Bilingual als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1v_Tb	301	46.93	9.11	29.0	58.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.124 t1w_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1w_T
 Label: t1LiSe-DaZ T-Wert W-Fragen
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1w_T	301	42.44	8.94	29.0	64.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.125 t1w_Tb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1w_Tb

Label: t1LiSe-DaZ T-Wert W-Fragen - Simultan Bilingual als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1w_Tb	301	43.97	8.67	29.0	64.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.126 t1w_Ts

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1w_Ts

Label: t1LiSe-DaZ T-Wert W-Fragen mit s-Antworten

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1w_Ts	301	45.77	9.49	29.0	64.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.127 t1w_Tsb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1w_Tsb

Label: t1LiSe-DaZ T-Wert W-Fragen mit s-Antworten - Simultan Bilingual als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1w_Tsb	301	47.22	9.29	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.128 t1n_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1n_T
 Label: t1LiSe-DaZ T-Wert Negationen
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1n_T	300	44.14	7.78	29.0	64.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.129 t1n_Tb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1n_Tb

Label: t1LiSe-DaZ T-Wert Negationen - Simultan Bilingual als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1n_Tb	300	44.99	8.00	29.0	64.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.130 t1sk_P

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sk_P

Label: t1LiSe-DaZ kum.Prozentangaben Satzklammer

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sk_P	292	9.84	12.22	0.0	40.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.131 t1sk_Pb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sk_Pb

Label: t1LiSe-DaZ kum.Prozentangaben Satzklammer - Simultan Bilingual als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sk_Pb	292	15.12	16.15	0.0	74.8

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.132 t1sv_RWQ_Q

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sv_RWQ_Q

Label: t1LiSe-DaZ Subjekt-Verb-Kongruenz Quartil

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sv_RWQ_Q	295	3.43	1.08	1.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.133 t1sv_RWQ_Qb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sv_RWQ_Qb

Label: t1LiSe-DaZ Subjekt-Verb-Kongruenz Quartil - Simultan Bilingual als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sv_RWQ_Qb	296	3.48	1.01	1.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.134 t1wkP_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wkP_T

Label: t1LiSe-DaZ T-Wert Wortklassen Praeposition

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1wkP_T	296	49.62	10.30	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.135 t1wkP_Tb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wkP_Tb

Label: t1LiSe-DaZ T-Wert Wortklassen Praeposition - Simultan Bilingual als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1wkP_Tb	296	50.15	9.92	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.136 t1wkF_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wkF_T

Label: t1LiSe-DaZ T-Wert Wortklassen Fokuspartikel

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1wkF_T	296	51.41	10.17	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.137 t1wkF_Tb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wkF_Tb

Label: t1LiSe-DaZ T-Wert Wortklassen Fokuspartikel - Simultan Bilingual als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1wkF_Tb	296	51.35	9.60	30.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.138 t1wkV_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wkV_T

Label: t1LiSe-DaZ T-Wert Wortklassen Vollverben

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1wkV_T	295	50.75	10.60	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.139 t1wkV_Tb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wkV_Tb

Label: t1LiSe-DaZ T-Wert Wortklassen Vollverben - Simultan Bilingual als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1wkV_Tb	295	50.73	9.85	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.140 t1wkM_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wkM_T

Label: t1LiSe-DaZ T-Wert Wortklassen Modal- und Hilfsverben

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1wkM_T	296	52.13	9.55	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.141 t1wkM_Tb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wkM_Tb

Label: t1LiSe-DaZ T-Wert Wortklassen Modal- und Hilfsverben - Simultan Bilingual als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1wkM_Tb	296	51.82	9.40	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.142 t1wkK_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wkK_T

Label: t1LiSe-DaZ T-Wert Wortklassen Konjunktionen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1wkK_T	296	51.32	10.28	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.143 t1wkK_Tb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1wkK_Tb

Label: t1LiSe-DaZ T-Wert Wortklassen Konjunktionen - Simultan Bilingual als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1wkK_Tb	296	52.66	9.95	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.144 t1Kad_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1Kad_T

Label: t1LiSe-DaZ T-Wert Kasuszuweisung (Akkusativ & Dativ)

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1Kad_T	296	46.57	10.46	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.145 t1Kad_Tb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1Kad_Tb

Label: t1LiSe-DaZ T-Wert Kasuszuweisung (Akkusativ & Dativ) - Simultan Bilingual
als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1Kad_Tb	296	49.60	10.89	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.146 t1PVsum

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1PVsum

Label: t1LiSe-DaZ Verbedeutungen Summe Prozessverben

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1PVsum	302	5.48	0.92	1.0	6.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.147 t1EVsum

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1EVsum

Label: t1LiSe-DaZ Verbedeutungen Summe Endzustandsverben

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1EVsum	302	5.30	1.01	0.0	6.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.148 t1SFsum

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SFsum

Label: t1LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Summe Subjekt-Fragen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t1SFsum	301	1.86	0.41	0.0	2.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

2.149 t1OFsum

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1OFsum

Label: t1LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Summe Objekt-Fragen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t1OFsum	302	3.09	1.10	0.0	4.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

2.150 t1AFsum

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1AFsum

Label: t1LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Summe Adjunkt-Fragen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t1AFsum	301	2.85	1.13	0.0	4.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

2.151 t1ZNsum

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1ZNsum

Label: t1LiSe-DaZ Negationen Summe zutreffender Negationen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1ZNsum	300	4.07	1.91	0.0	6.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.152 t1nZNsum

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1nZNsum

Label: t1LiSe-DaZ Negationen Summe nicht-zutreffender Negationen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t1nZNsum	300	4.92	1.61	0.0	6.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

2.153 t1SSESHSV

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SSESHSV

Label: t1LiSe-DaZ Sprachverstaendnis Anzahl T<40

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t1SSESHSV	302	0.79	0.90	0.0	3.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

2.154 t1SSESHSV_b

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SSESHSV_b

Label: t1LiSe-DaZ Sprachverstaendnis Anzahl T<40 (bzw. 45) - Simultan Bilingual als
DaZ, DaM als DaM und DaZ als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1SSESHSV_b	300	0.68	0.85	0.0	3.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.155 t1SSESHSP

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SSESHSP

Label: t1LiSe-DaZ Sprachproduktion Anzahl T<40

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1SSESHSP	296	1.00	1.31	0.0	6.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.156 t1SSESHSP_b

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SSESHSP_b

Label: t1LiSe-DaZ Sprachproduktion Anzahl T<40 (bzw. 45) - Simultan Bilingual als
DaZ, DaM als DaM und DaZ als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1SSESHSP_b	296	0.79	1.23	0.0	6.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.157 t1SSESH

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SSESH

Label: t1LiSe-DaZ Gesamt Anzahl T<40

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t1SSESH	302	1.77	1.88	0.0	9.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

2.158 t1SSESH_b

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SSESH_b

Label: t1LiSe-DaZ Gesamt Anzahl T<40 - Simultan Bilingual als DaZ, DaM als DaM
und DaZ als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1SSESH_b	302	1.45	1.75	0.0	9.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.159 t1SSES

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SSES
 Label: t1LiSe-DaZ Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES) min. 2 T<40
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *no-SLI*; 1 = *SLI*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1SSES	302	0.44	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	no-SLI	56.0	55.4
1	SLI	44.0	43.6
-999	missing	–	1.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 302$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.160 t1SSES3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SSES3
 Label: t1LiSe-DaZ Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES) min. 3 T<40
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *no-SLI*; 1 = *SLI*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1SSES3	302	0.27	0.44

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	no-SLI	73.2	72.5
1	SLI	26.8	26.6
-999	missing	–	1.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 302$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.161 t1SSES_bm

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SSES_bm
 Label: t1LiSe-DaZ Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES) - Simultan
 Bilingual als DaZ, DaZ als DaZ und DaM als DaM min. 2 T<40
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *no-SLI*; 1 = *SLI*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1SSES_bm	302	0.36	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	no-SLI	63.9	63.3
1	SLI	36.1	35.7
-999	missing	–	1.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 302$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.162 t1SSES3_bm

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SSES3_bm
 Label: t1LiSe-DaZ Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES) - Simultan
 Bilingual als DaZ, DaZ als DaZ und DaM als DaM min. 3 T<40
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *no-SLI*; 1 = *SLI*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1SSES3_bm	302	0.22	0.41

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	no-SLI	78.5	77.7
1	SLI	21.5	21.3
-999	missing	–	1.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 302$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.163 t1kd_io

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1kd_io

Label: t1LiSe-DaZ Kasuszuweisung Dativ Summenscore indirekte Objekte

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1kd_io	296	0.78	0.79	0.0	2.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.164 t1kd_p

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1kd_p

Label: t1LiSe-DaZ Kasuszuweisung Dativ Summenscore Praepositionen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1kd_p	293	2.01	1.09	0.0	3.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.165 t1Foe_Sk

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1Foe_Sk
 Label: t1LiSe-DaZ Foerderbedarf Subjekt-Verb-Kongruenz
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1Foe_Sk	296	0.04	0.20

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	95.9	93.1
1	Foerderbedarf	4.1	3.9
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.166 t1Foe_P

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1Foe_P

Label: t1LiSe-DaZ Foerderbedarf Praepositionen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1Foe_P	296	0.04	0.19

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	96.3	93.4
1	Foerderbedarf	3.7	3.6
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.167 t1Foe_F

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1Foe_F
Label: t1LiSe-DaZ Foerderbedarf Fokuspartikel
Quelle: Schulz & Tracy, 2011
Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1Foe_F	296	0.03	0.16

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	97.3	94.4
1	Foerderbedarf	2.7	2.6
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.168 t1Foe_VV

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1Foe_VV
 Label: t1LiSe-DaZ Foerderbedarf Vollverben
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1Foe_VV	296	0.02	0.15

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	97.6	94.8
1	Foerderbedarf	2.4	2.3
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.169 t1Foe_MV

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1Foe_MV

Label: t1LiSe-DaZ Foerderbedarf Modalverben

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1Foe_MV	296	0.04	0.19

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	96.3	93.4
1	Foerderbedarf	3.7	3.6
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.170 t1Foe_K

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1Foe_K

Label: t1LiSe-DaZ Foerderbedarf Konjunktionen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1Foe_K	296	0.05	0.23

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	94.6	91.8
1	Foerderbedarf	5.4	5.2
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.171 t1Foe_A

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1Foe_A
 Label: t1LiSe-DaZ Foerderbedarf Akkusativ
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1Foe_A	294	0.40	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	59.9	57.7
1	Foerderbedarf	40.1	38.7
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.172 t1Foe_D

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1Foe_D
Label: t1LiSe-DaZ Foerderbedarf Dativ
Quelle: Schulz & Tracy, 2011
Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1Foe_D	296	0.22	0.42

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	77.7	75.4
1	Foerderbedarf	22.3	21.6
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.173 t1Foe_PV

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1Foe_PV
 Label: t1LiSe-DaZ Foerderbedarf Prozessverben
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1Foe_PV	302	0.14	0.35

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung]Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	86.1	85.2
1	Foerderbedarf	13.9	13.8
-999	missing	–	1.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 302$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.174 t1Foe_EV

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1Foe_EV
 Label: t1LiSe-DaZ Foerderbedarf Endzustandsverben
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1Foe_EV	302	0.16	0.37

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	83.8	83.0
1	Foerderbedarf	16.2	16.1
-999	missing	–	1.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 302$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.175 t1Foe_SF

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1Foe_SF
 Label: t1LiSe-DaZ Foerderbedarf Subjektfragen
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1Foe_SF	301	0.11	0.32

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung]Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	88.7	87.5
1	Foerderbedarf	11.3	11.1
-999	missing	–	1.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 301$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.176 t1Foe_OF

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1Foe_OF

Label: t1LiSe-DaZ Foerderbedarf Objektfragen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1Foe_OF	302	0.25	0.43

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	74.8	74.1
1	Foerderbedarf	25.2	24.9
-999	missing	–	1.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 302$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.177 t1Foe_AF

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1Foe_AF

Label: t1LiSe-DaZ Foerderbedarf Adjunktfragen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1Foe_AF	301	0.31	0.46

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	69.1	68.2
1	Foerderbedarf	30.9	30.5
-999	missing	–	1.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 301$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.178 t1Foe_ZN

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1Foe_ZN

Label: t1LiSe-DaZ Foerderbedarf Zutreffende Negationen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1Foe_ZN	300	0.47	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	53.0	52.1
1	Foerderbedarf	47.0	46.2
-999	missing	–	1.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 300$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.179 t1Foe_nZN

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1Foe_nZN

Label: t1LiSe-DaZ Foerderbedarf NICHT Zutreffende Negationen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1Foe_nZN	300	0.24	0.43

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	75.7	74.4
1	Foerderbedarf	24.3	23.9
-999	missing	–	1.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 300$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3 LiSe-DaZ Testzeitpunkt 2

3.1 t2Liseagem

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2Liseagem
 Label: t2LiSe-DaZ Testalter
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t2Liseagem	296	76.04	3.78	68.0	87.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

3.2 t2LiseNagem

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2LiseNagem

Label: t2LiSe-DaZ Testalter Nachtestung

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2LiseNagem	5	75.00	4.36	71.0	82.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.3 t2LiSeD

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2LiSeD
Label: t2LiSe-DaZ Testdatum
Variablentyp: Zeichenfolge
Quelle: Schulz & Tracy, 2011

3.4 t2LiSeND

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2LiSeND

Label: t2LiSe-DaZ Testdatum Nachtestung

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

3.5 t2LiSeda

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2LiSeda

Label: t2LiSe Daten vorhanden

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *t2LiSe Daten nicht vorhanden*; 1 = *t2LiSe Daten vorhanden*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2LiSeda	305	0.97	0.17

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	t2LiSe Daten nicht vorhanden	3.0	3.0
1	t2LiSe Daten vorhanden	97.0	97.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.6 t2Lise1_Bemerk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2Lise1_Bemerk

Label: t2LiSe-DaZ Bemerkungen Subtest 1

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

3.7 t2Lise2_Bemerk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2Lise2_Bemerk

Label: t2LiSe-DaZ Bemerkungen Subtest 2

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

3.8 t2Lise3_Bemerk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2Lise3_Bemerk

Label: t2LiSe-DaZ Bemerkungen Subtest 3

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

3.9 t2Lise4_Bemerk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2Lise4_Bemerk

Label: t2LiSe-DaZ Bemerkungen Subtest 4

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

3.10 t2_All

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2_All

Label: t2Testtag 1 Bemerkungen allgemein

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

3.11 t2v_01

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2v_01
 Label: t2LiSe-DaZ Verbbedeutung Item 1 Antwort
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2v_01	295	1.00	0.06

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	0.3	0.3
1	richtig	99.7	96.4
-999	missing	–	3.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 295$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.12 t2v_02

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2v_02
 Label: t2LiSe-DaZ Verbbedeutung Item 2 Antwort
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2v_02	296	0.95	0.23

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	5.4	5.2
1	richtig	94.6	91.8
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.13 t2v_03

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2v_03
 Label: t2LiSe-DaZ Verbbedeutung Item 3 Antwort
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2v_03	296	1.00	0.06

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	0.3	0.3
1	richtig	99.7	96.7
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.14 t2v_04

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2v_04
 Label: t2LiSe-DaZ Verbbedeutung Item 4 Antwort
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2v_04	296	0.94	0.23

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	5.7	5.6
1	richtig	94.3	91.5
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.15 t2v_05

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2v_05
 Label: t2LiSe-DaZ Verbbedeutung Item 5 Antwort
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2v_05	296	0.98	0.13

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	1.7	1.6
1	richtig	98.3	95.4
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.16 t2v_06

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2v_06
 Label: t2LiSe-DaZ Verbbedeutung Item 6 Antwort
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2v_06	296	1.00	0.06

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	0.3	0.3
1	richtig	99.7	96.7
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.17 t2v_07

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2v_07
 Label: t2LiSe-DaZ Verbbedeutung Item 7 Antwort
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2v_07	296	0.77	0.42

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	23.3	22.6
1	richtig	76.7	74.4
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.18 t2v_08

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2v_08
 Label: t2LiSe-DaZ Verbbedeutung Item 8 Antwort
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2v_08	296	0.98	0.13

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	1.7	1.6
1	richtig	98.3	95.4
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.19 t2v_09

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2v_09
Label: t2LiSe-DaZ Verbbedeutung Item 9 Antwort
Quelle: Schulz & Tracy, 2011
Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2v_09	296	0.98	0.13

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	1.7	1.6
1	richtig	98.3	95.4
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.20 t2v_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2v_10
 Label: t2LiSe-DaZ Verbbedeutung Item 10 Antwort
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2v_10	296	1.00	0.06

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	0.3	0.3
1	richtig	99.7	96.7
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.21 t2v_11

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2v_11
 Label: t2LiSe-DaZ Verbbedeutung Item 11 Antwort
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2v_11	296	0.99	0.08

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	0.7	0.7
1	richtig	99.3	96.4
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.22 t2v_12

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2v_12
 Label: t2LiSe-DaZ Verbbedeutung Item 12 Antwort
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2v_12	296	0.93	0.25

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	6.8	6.6
1	richtig	93.2	90.5
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.23 t2v_u1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2v_u1
 Label: t2LiSe-DaZ Verbbedeutung Uebungsitem 1 Antwort
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2v_u1	296	0.98	0.15

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	2.4	2.3
1	richtig	97.6	94.8
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.24 t2v_u2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2v_u2
 Label: t2LiSe-DaZ Verbbedeutung Uebungsitem 2 Antwort
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2v_u2	296	0.98	0.14

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	2.0	2.0
1	richtig	98.0	95.1
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.25 t2v_u3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2v_u3
 Label: t2LiSe-DaZ Verbbedeutung Uebungsitem 3 Antwort
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2v_u3	296	1.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	0.0	0.0
1	richtig	100.0	97.0
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.26 t2v_u4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2v_u4
 Label: t2LiSe-DaZ Verbbedeutung Uebungsitem 4 Antwort
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2v_u4	296	1.00	0.06

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	0.3	0.3
1	richtig	99.7	96.7
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.27 t2v_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2v_RW
 Label: t2LiSe-DaZ Verbbedeutung Rohwert
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2v_RW	296	11.51	0.73	8.0	12.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.28 t2w_01

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2w_01
 Label: t2LiSe-DaZ W-Fragen Item 1 Antwort
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2w_01	294	0.97	0.17

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	3.1	3.0
1	richtig	96.9	93.4
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.29 t2w_02

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2w_02
Label: t2LiSe-DaZ W-Fragen Item 2 Antwort
Quelle: Schulz & Tracy, 2011
Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2w_02	294	0.82	0.39

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	18.4	17.7
1	richtig	81.6	78.7
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.30 t2w_03

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2w_03
Label: t2LiSe-DaZ W-Fragen Item 3 Antwort
Quelle: Schulz & Tracy, 2011
Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2w_03	294	0.94	0.25

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	6.5	6.2
1	richtig	93.5	90.2
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.31 t2w_04

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2w_04
 Label: t2LiSe-DaZ W-Fragen Item 4 Antwort
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2w_04	294	0.65	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	35.4	34.1
1	richtig	64.6	62.3
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.32 t2w_05

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2w_05
 Label: t2LiSe-DaZ W-Fragen Item 5 Antwort
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2w_05	294	0.78	0.42

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	22.1	21.3
1	richtig	77.9	75.1
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.33 t2w_06

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2w_06
Label: t2LiSe-DaZ W-Fragen Item 6 Antwort
Quelle: Schulz & Tracy, 2011
Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2w_06	294	0.93	0.25

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	6.8	6.6
1	richtig	93.2	89.8
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.34 t2w_07

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2w_07
 Label: t2LiSe-DaZ W-Fragen Item 7 Antwort
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2w_07	294	0.97	0.16

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	2.7	2.6
1	richtig	97.3	93.8
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.35 t2w_08

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2w_08
 Label: t2LiSe-DaZ W-Fragen Item 8 Antwort
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2w_08	294	0.30	0.46

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	70.1	67.5
1	richtig	29.9	28.9
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.36 t2w_09

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2w_09
 Label: t2LiSe-DaZ W-Fragen Item 9 Antwort
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2w_09	294	0.88	0.32

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	11.6	11.1
1	richtig	88.4	85.2
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.37 t2w_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2w_10
 Label: t2LiSe-DaZ W-Fragen Item 10 Antwort
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2w_10	294	0.89	0.31

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	10.9	10.5
1	richtig	89.1	85.9
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.38 t2w_u1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2w_u1
 Label: t2LiSe-DaZ W-Fragen Uebungsitem 1 Antwort
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2w_u1	294	0.98	0.15

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	2.4	2.3
1	richtig	97.6	94.1
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.39 t2w_u2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2w_u2
 Label: t2LiSe-DaZ W-Fragen Uebungsitem 2 Antwort
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2w_u2	294	0.99	0.12

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	1.4	1.3
1	richtig	98.6	95.1
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.40 t2w_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2w_RW

Label: t2LiSe-DaZ W-Fragen Rohwert

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2w_RW	294	8.13	1.85	1.0	10.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.41 t2ws_01

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ws_01
 Label: t2LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Hilfsvariable Item 1
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2ws_01	294	0.97	0.17

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	3.1	3.0
1	richtig	96.9	93.4
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.42 t2ws_02

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ws_02

Label: t2LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Hilfsvariable Item 2

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2ws_02	294	0.82	0.39

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	18.4	17.7
1	richtig	81.6	78.7
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.43 t2ws_03

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ws_03

Label: t2LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Hilfsvariable Item 3

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2ws_03	294	0.94	0.25

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	6.5	6.2
1	richtig	93.5	90.2
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.44 t2ws_04

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ws_04

Label: t2LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Hilfsvariable Item 4

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2ws_04	294	0.85	0.35

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	14.6	14.1
1	richtig	85.4	82.3
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.45 t2ws_05

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ws_05
 Label: t2LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Hilfsvariable Item 5
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2ws_05	294	0.78	0.42

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	22.1	21.3
1	richtig	77.9	75.1
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.46 t2ws_06

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ws_06

Label: t2LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Hilfsvariable Item 6

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2ws_06	294	0.94	0.25

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	6.5	6.2
1	richtig	93.5	90.2
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.47 t2ws_07

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ws_07
 Label: t2LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Hilfsvariable Item 7
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2ws_07	294	0.97	0.16

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	2.7	2.6
1	richtig	97.3	93.8
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.48 t2ws_08

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ws_08
 Label: t2LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Hilfsvariable Item 8
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2ws_08	294	0.66	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	34.4	33.1
1	richtig	65.6	63.3
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.49 t2ws_09

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ws_09
 Label: t2LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Hilfsvariable Item 9
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2ws_09	294	0.88	0.32

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	11.6	11.1
1	richtig	88.4	85.2
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.50 t2ws_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ws_10
 Label: t2LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Hilfsvariable Item 10
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2ws_10	294	0.96	0.20

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	4.1	3.9
1	richtig	95.9	92.5
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.51 t2ws_u1

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ws_u1
 Label: t2LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Hilfsvariable Uebungsitem 1
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2ws_u1	294	0.98	0.15

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	2.4	2.3
1	richtig	97.6	94.1
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.52 t2ws_u2

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ws_u2
 Label: t2LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Hilfsvariable Uebungsitem 2
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2ws_u2	294	0.99	0.12

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	1.4	1.3
1	richtig	98.6	95.1
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.53 t2w_RWs

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2w_RWs

Label: t2LiSe-DaZ W-Fragen inklusive s-Antworten Rohwert

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2w_RWs	294	8.76	1.74	1.0	10.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.54 t2n_01

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2n_01
Label: t2LiSe-DaZ Negationen Item 1 Antwort
Quelle: Schulz & Tracy, 2011
Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2n_01	294	0.88	0.32

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	11.6	11.1
1	richtig	88.4	85.2
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.55 t2n_02

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2n_02
 Label: t2LiSe-DaZ Negationen Item 2 Antwort
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2n_02	294	0.57	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	43.2	41.6
1	richtig	56.8	54.8
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.56 t2n_03

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2n_03
 Label: t2LiSe-DaZ Negationen Item 3 Antwort
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2n_03	294	0.86	0.34

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	13.6	13.1
1	richtig	86.4	83.3
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.57 t2n_04

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2n_04
 Label: t2LiSe-DaZ Negationen Item 4 Antwort
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2n_04	294	0.86	0.34

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	13.6	13.1
1	richtig	86.4	83.3
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.58 t2n_05

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2n_05
Label: t2LiSe-DaZ Negationen Item 5 Antwort
Quelle: Schulz & Tracy, 2011
Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2n_05	294	0.96	0.21

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	4.4	4.3
1	richtig	95.6	92.1
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.59 t2n_06

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2n_06
Label: t2LiSe-DaZ Negationen Item 6 Antwort
Quelle: Schulz & Tracy, 2011
Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2n_06	294	0.68	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	32.0	30.8
1	richtig	68.0	65.6
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.60 t2n_07

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2n_07
 Label: t2LiSe-DaZ Negationen Item 7 Antwort
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2n_07	294	0.97	0.18

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	3.4	3.3
1	richtig	96.6	93.1
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.61 t2n_08

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2n_08
Label: t2LiSe-DaZ Negationen Item 8 Antwort
Quelle: Schulz & Tracy, 2011
Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2n_08	294	0.84	0.37

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	16.0	15.4
1	richtig	84.0	81.0
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.62 t2n_09

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2n_09
Label: t2LiSe-DaZ Negationen Item 9 Antwort
Quelle: Schulz & Tracy, 2011
Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2n_09	293	0.96	0.19

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	3.8	3.6
1	richtig	96.2	92.5
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.63 t2n_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2n_10
 Label: t2LiSe-DaZ Negationen Item 10 Antwort
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2n_10	294	0.91	0.28

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	8.8	8.5
1	richtig	91.2	87.9
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.64 t2n_11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2n_11
 Label: t2LiSe-DaZ Negationen Item 11 Antwort
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2n_11	294	0.90	0.30

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	10.2	9.8
1	richtig	89.8	86.6
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.65 t2n_12

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2n_12
Label: t2LiSe-DaZ Negationen Item 12 Antwort
Quelle: Schulz & Tracy, 2011
Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2n_12	293	0.87	0.34

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	13.3	12.8
1	richtig	86.7	83.3
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.66 t2n_u1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2n_u1
 Label: t2LiSe-DaZ Negationen Uebungsitem 1 Antwort
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2n_u1	294	0.93	0.25

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	6.8	6.6
1	richtig	93.2	89.8
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.67 t2n_u2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2n_u2

Label: t2LiSe-DaZ Negationen Uebungsitem 2 Antwort

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2n_u2	294	0.89	0.31

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	10.5	10.2
1	richtig	89.5	86.2
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.68 t2n_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2n_RW
 Label: t2LiSe-DaZ Negationen Rohwert
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2n_RW	294	10.26	1.79	2.0	12.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.69 t2sk_01

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sk_01

Label: t2LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 1

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sk_01	269	2.96	0.98	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.70 t2sk_02

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sk_02

Label: t2LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 3

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sk_02	277	3.65	0.68	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.71 t2sk_03

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sk_03

Label: t2LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 4

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sk_03	285	3.75	0.80	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.72 t2sk_04

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sk_04

Label: t2LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 5

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sk_04	289	2.81	0.57	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.73 t2sk_05

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sk_05

Label: t2LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 6

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sk_05	293	2.87	0.58	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.74 t2sk_06

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sk_06

Label: t2LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 7

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sk_06	292	3.10	1.15	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.75 t2sk_07

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sk_07

Label: t2LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 8.1

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sk_07	291	2.11	0.98	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.76 t2sk_08

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sk_08

Label: t2LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 8.2

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sk_08	292	3.73	0.79	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.77 t2sk_09

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sk_09

Label: t2LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 10.4

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sk_09	291	3.42	1.06	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.78 t2sk_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sk_10

Label: t2LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 10.5

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sk_10	275	2.96	0.72	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.79 t2sk_11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sk_11

Label: t2LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 11.1

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sk_11	291	2.96	0.70	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.80 t2sk_12

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sk_12

Label: t2LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 11.2

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sk_12	286	2.92	0.97	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.81 t2sk_13

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sk_13

Label: t2LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 12.1

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sk_13	293	2.74	0.70	0.0	3.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.82 t2sk_14

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sk_14

Label: t2LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 12.2

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sk_14	291	2.00	1.01	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.83 t2sk_15

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sk_15

Label: t2LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 12.3

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sk_15	289	2.59	1.03	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.84 t2sk_16

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sk_16

Label: t2LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 13.1

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sk_16	294	2.31	0.91	0.0	3.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.85 t2sk_17

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sk_17

Label: t2LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 13.3

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sk_17	291	3.39	0.89	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.86 t2sk_18

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sk_18

Label: t2LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 13.4

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sk_18	278	2.75	0.74	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.87 t2sk_19

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sk_19

Label: t2LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 14

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sk_19	293	2.57	0.76	0.0	3.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.88 t2sv_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sv_1

Label: t2LiSe-DaZ Subjekt-Verb-Kongruenz Gesamt

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sv_1	294	17.76	5.66	2.0	48.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.89 t2sv_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sv_2

Label: t2LiSe-DaZ Subjekt-Verb-Kongruenz Fehler

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sv_2	294	0.28	0.87	0.0	9.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.90 t2wk_P

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wk_P

Label: t2LiSe-DaZ Wortklassen Praepositionen Gesamt

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2wk_P	294	7.81	2.57	0.0	17.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.91 t2wk_F

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wk_F

Label: t2LiSe-DaZ Wortklassen Fokuspartikel Gesamt

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2wk_F	294	4.41	1.58	0.0	10.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.92 t2wk_V

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wk_V

Label: t2LiSe-DaZ Wortklassen Vollverben Gesamt

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2wk_V	294	15.78	4.36	4.0	41.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.93 t2wk_M

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wk_M

Label: t2LiSe-DaZ Wortklassen Modal- und Hilfsverben Gesamt

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2wk_M	294	7.13	2.95	0.0	25.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.94 t2wk_K

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wk_K

Label: t2LiSe-DaZ Wortklassen Konjunktionen Gesamt

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2wk_K	294	6.14	2.20	0.0	15.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.95 t2ka_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ka_1
 Label: t2LiSe-DaZ Kasuszuweisung Akkusativ Aufgabe 5a
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2ka_1	290	0.72	0.45

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	27.9	26.6
1	richtig	72.1	68.5
-999	missing	–	4.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 290$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.96 t2ka_2

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ka_2
Label: t2LiSe-DaZ Kasuszuweisung Akkusativ Aufgabe 5b
Quelle: Schulz & Tracy, 2011
Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2ka_2	103	0.47	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	53.4	18.0
1	richtig	46.6	15.7
-999	missing	–	66.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 103$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.97 t2ka_3

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ka_3
 Label: t2LiSe-DaZ Kasuszuweisung Akkusativ Aufgabe 10.2
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2ka_3	293	0.51	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	48.8	46.9
1	richtig	51.2	49.2
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.98 t2ka_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ka_4
 Label: t2LiSe-DaZ Kasuszuweisung Akkusativ Aufgabe 13.2
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2ka_4	294	0.73	0.44

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	26.5	25.6
1	richtig	73.5	70.8
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.99 t2kd_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kd_1

Label: t2LiSe-DaZ Kasuszuweisung Dativ Aufgabe 9.1

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kd_1	294	0.79	0.41

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	21.1	20.3
1	richtig	78.9	76.1
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.100 t2kd_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kd_2

Label: t2LiSe-DaZ Kasuszuweisung Dativ Aufgabe 9.2

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kd_2	294	0.72	0.45

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	28.2	27.2
1	richtig	71.8	69.2
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.101 t2kd_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kd_3

Label: t2LiSe-DaZ Kasuszuweisung Dativ Aufgabe 9.3

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kd_3	294	0.74	0.44

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	26.2	25.2
1	richtig	73.8	71.1
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.102 t2kd_4

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kd_4
 Label: t2LiSe-DaZ Kasuszuweisung Dativ Aufgabe 10.1
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kd_4	293	0.32	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	67.6	64.9
1	richtig	32.4	31.1
-999	missing	–	3.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 293$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.103 t2kd_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kd_5
 Label: t2LiSe-DaZ Kasuszuweisung Dativ Aufgabe 10.3
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2kd_5	294	0.50	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	50.0	48.2
1	richtig	50.0	48.2
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.104 t2sk_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sk_4

Label: t2LiSe-DaZ Satzklammer Hilfvariable ESS 4

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sk_4	294	4.82	2.18	0.0	10.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.105 t2sk_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sk_3

Label: t2LiSe-DaZ Satzklammer Hilfvariable ESS 3

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sk_3	294	10.21	2.76	2.0	18.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.106 t2sk_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sk_2

Label: t2LiSe-DaZ Satzklammer Hilfvariable ESS 2

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sk_2	294	1.70	1.42	0.0	8.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.107 t2sk_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sk_1

Label: t2LiSe-DaZ Satzklammer Hilfvariable ESS 1

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sk_1	294	0.96	1.02	0.0	5.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.108 t2sk_0

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sk_0

Label: t2LiSe-DaZ Satzklammer Hilfvariable ESS 0

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sk_0	294	0.88	1.29	0.0	8.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.109 t2sk_ESS

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sk_ESS

Label: t2LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sk_ESS	294	3.84	0.38	2.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.110 t2sv_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sv_RW

Label: t2LiSe-DaZ Subjekt-Verb-Kongruenz Rohwert

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sv_RW	294	17.47	5.57	2.0	43.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.111 t2sv_RWQ

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sv_RWQ

Label: t2LiSe-DaZ Subjekt-Verb-Kongruenz Rohwert-Quotient

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sv_RWQ	294	0.98	0.05	0.6	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.112 t2ka_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ka_RW

Label: t2LiSe-DaZ Kasuszuweisung Akkusativ Rohwert

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ka_RW	294	2.12	1.10	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.113 t2kd_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kd_RW

Label: t2LiSe-DaZ Kasuszuweisung Dativ Rohwert

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kd_RW	294	3.07	1.39	0.0	5.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.114 t2k_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2k_RW

Label: t2LiSe-DaZ Kasuszuweisung Gesamt Rohwert

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2k_RW	294	5.19	2.08	0.0	9.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.115 t2sk_ESa

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sk_ESa

Label: t2LiSe-DaZ Entwicklungsstufe Gesamtpunktzahl (d.h. alle Entwicklungsstufen aufaddiert)

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sk_ESa	294	54.29	8.09	10.0	66.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.116 t2DeuKon

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2DeuKon

Label: t2LiSe-DaZ Deutschkontakt

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t2DeuKon	79	36.82	9.42	9.0	58.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

3.117 t2DeuKonN

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2DeuKonN

Label: t2LiSe-DaZ Deutschkontakt Nachtestung

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t2DeuKonN	1	20.00	NA	20.0	20.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

3.118 t2Lise_Ngr

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2Lise_Ngr
 Label: t2LiSe-DaZ Normgruppen
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 1 = *DaM 4 Jahre*; 2 = *DaM 5 Jahre*; 3 = *DaM 6 Jahre*; 4 = *DaZ 4 Jahre/0-12 Kontaktmonate*; 5 = *DaZ 4 Jahre/13-35 Kontaktmonate*; 6 = *DaZ 5 Jahre/13-47 Kontaktmonate*; 7 = *DaZ 6 Jahre/25-59 Kontaktmonate*; 8 = *DaZ 7 Jahre/37-71 Kontaktmonate*; 666 = *zu lange Kontakt zu Deutsch*; 777 = *zu kurz Kontakt zu Deutsch*; 888 = *zu alt*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	DaM 4 Jahre	0.0	0.0
2	DaM 5 Jahre	9.5	9.2
3	DaM 6 Jahre	62.5	60.7
4	DaZ 4 Jahre/0-12 Kontaktmonate	0.0	0.0
5	DaZ 4 Jahre/13-35 Kontaktmonate	0.0	0.0
6	DaZ 5 Jahre/13-47 Kontaktmonate	5.4	5.2
7	DaZ 6 Jahre/25-59 Kontaktmonate	18.2	17.7
8	DaZ 7 Jahre/37-71 Kontaktmonate	0.3	0.3
666	zu lange Kontakt zu Deutsch	0.0	0.0
777	zu kurz Kontakt zu Deutsch	2.7	2.6
888	zu alt	1.4	1.3
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{\text{valid}} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{\text{total}} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.119 t2Lise_NNgr

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2Lise_NNgr

Label: t2LiSe-DaZ Normgruppen Nachtestung

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 1 = *DaM 4 Jahre*; 2 = *DaM 5 Jahre*; 3 = *DaM 6 Jahre*; 4 = *DaZ 4 Jahre/0-12 Kontaktmonate*; 5 = *DaZ 4 Jahre/13-35 Kontaktmonate*; 6 = *DaZ 5 Jahre/13-47 Kontaktmonate*; 7 = *DaZ 6 Jahre/25-59 Kontaktmonate*; 8 = *DaZ 7 Jahre/37-71 Kontaktmonate*; 666 = *zu lange Kontakt zu Deutsch*; 777 = *zu kurz Kontakt zu Deutsch*; 888 = *zu alt*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	DaM 4 Jahre	0.0	0.0
2	DaM 5 Jahre	0.0	0.0
3	DaM 6 Jahre	80.0	1.3
4	DaZ 4 Jahre/0-12 Kontaktmonate	0.0	0.0
5	DaZ 4 Jahre/13-35 Kontaktmonate	0.0	0.0
6	DaZ 5 Jahre/13-47 Kontaktmonate	20.0	0.3
7	DaZ 6 Jahre/25-59 Kontaktmonate	0.0	0.0
8	DaZ 7 Jahre/37-71 Kontaktmonate	0.0	0.0
666	zu lange Kontakt zu Deutsch	0.0	0.0
777	zu kurz Kontakt zu Deutsch	0.0	0.0
888	zu alt	0.0	0.0
-999	missing	–	98.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{\text{valid}} = 5$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{\text{total}} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.120 t2Lise_NgrK

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2Lise_NgrK

Label: t2LiSe-DaZ Normgruppen inkl. zu kurz Deutsch

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 1 = *DaM 4 Jahre*; 2 = *DaM 5 Jahre*; 3 = *DaM 6 Jahre*; 4 = *DaZ 4 Jahre/0-12 Kontaktmonate*; 5 = *DaZ 4 Jahre/13-35 Kontaktmonate*; 6 = *DaZ 5 Jahre/ max. 47 Kontaktmonate*; 7 = *DaZ 6 Jahre/ max. 59 Kontaktmonate*; 8 = *DaZ 7 Jahre/ max. 71 Kontaktmonate*; 666 = *zu lange Kontakt zu Deutsch*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	DaM 4 Jahre	0.0	0.0
2	DaM 5 Jahre	9.5	9.2
3	DaM 6 Jahre	63.9	62.0
4	DaZ 4 Jahre/0-12 Kontaktmonate	0.0	0.0
5	DaZ 4 Jahre/13-35 Kontaktmonate	0.0	0.0
6	DaZ 5 Jahre/ max. 47 Kontaktmonate	5.4	5.2
7	DaZ 6 Jahre/ max. 59 Kontaktmonate	20.3	19.7
8	DaZ 7 Jahre/ max. 71 Kontaktmonate	1.0	1.0
666	zu lange Kontakt zu Deutsch	0.0	0.0
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.121 t2Lise_NNgrK

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2Lise_NNgrK

Label: t2LiSe-DaZ Normgruppen Nachtestung inkl. zu kurz Deutsch

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 1 = *DaM 4 Jahre*; 2 = *DaM 5 Jahre*; 3 = *DaM 6 Jahre*; 4 = *DaZ 4 Jahre/0-12 Kontaktmonate*; 5 = *DaZ 4 Jahre/13-35 Kontaktmonate*; 6 = *DaZ 5 Jahre/ max. 47 Kontaktmonate*; 7 = *DaZ 6 Jahre/ max. 59 Kontaktmonate*; 8 = *DaZ 7 Jahre/ max. 71 Kontaktmonate*; 666 = *zu lange Kontakt zu Deutsch*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	DaM 4 Jahre	0.0	0.0
2	DaM 5 Jahre	0.0	0.0
3	DaM 6 Jahre	80.0	1.3
4	DaZ 4 Jahre/0-12 Kontaktmonate	0.0	0.0
5	DaZ 4 Jahre/13-35 Kontaktmonate	0.0	0.0
6	DaZ 5 Jahre/ max. 47 Kontaktmonate	20.0	0.3
7	DaZ 6 Jahre/ max. 59 Kontaktmonate	0.0	0.0
8	DaZ 7 Jahre/ max. 71 Kontaktmonate	0.0	0.0
666	zu lange Kontakt zu Deutsch	0.0	0.0
-999	missing	–	98.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 5$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.122 t2v_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2v_T
 Label: t2LiSe-DaZ T-Wert Verbbedeutung
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2v_T	296	48.62	7.56	29.0	58.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.123 t2v_Tb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2v_Tb

Label: t2LiSe-DaZ T-Wert Verbbedeutung - Simultan Bilingual als DaZ, DaM als DaM
und DaZ als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2v_Tb	296	49.77	7.19	29.0	58.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.124 t2w_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2w_T
 Label: t2LiSe-DaZ T-Wert W-Fragen
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2w_T	294	42.11	9.72	29.0	64.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.125 t2w_Tb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2w_Tb

Label: t2LiSe-DaZ T-Wert W-Fragen - Simultan Bilingual als DaZ, DaM als DaM und
DaZ als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2w_Tb	294	43.84	9.25	29.0	64.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.126 t2w_Ts

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2w_Ts

Label: t2LiSe-DaZ T-Wert W-Fragen mit s-Antworten

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2w_Ts	294	46.98	9.54	29.0	64.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.127 t2w_Tsb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2w_Tsb

Label: t2LiSe-DaZ T-Wert W-Fragen mit s-Antworten - Simultan Bilingual als DaZ,
DaM als DaM und DaZ als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2w_Tsb	294	48.31	9.23	29.0	64.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.128 t2n_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2n_T

Label: t2LiSe-DaZ T-Wert Negationen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2n_T	294	47.14	8.08	29.0	60.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.129 t2n_Tb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2n_Tb

Label: t2LiSe-DaZ T-Wert Negationen - Simultan Bilingual als DaZ, DaM als DaM und
DaZ als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2n_Tb	294	47.87	8.09	29.0	60.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.130 t2sk_P

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sk_P

Label: t2LiSe-DaZ kum.Prozentangaben Satzklammer

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sk_P	294	9.75	12.77	0.0	40.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.131 t2sk_Pb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sk_Pb

Label: t2LiSe-DaZ kum.Prozentangaben Satzklammer - Simultan Bilingual als DaZ,
DaM als DaM und DaZ als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sk_Pb	294	15.75	16.50	0.0	40.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.132 t2sv_RWQ_Q

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sv_RWQ_Q

Label: t2LiSe-DaZ Subjekt-Verb-Kongruenz Quartil

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sv_RWQ_Q	294	3.56	1.01	1.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.133 t2sv_RWQ_Qb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sv_RWQ_Qb

Label: t2LiSe-DaZ Subjekt-Verb-Kongruenz Quartil - Simultan Bilingual als DaZ, DaM
als DaM und DaZ als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sv_RWQ_Qb	294	3.61	0.94	1.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.134 t2wkP_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wkP_T

Label: t2LiSe-DaZ T-Wert Wortklassen Praeposition

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2wkP_T	294	54.28	9.85	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.135 t2wkP_Tb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wkP_Tb

Label: t2LiSe-DaZ T-Wert Wortklassen Praeposition - Simultan Bilingual als DaZ, DaM
als DaM und DaZ als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2wkP_Tb	294	54.22	9.43	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.136 t2wkF_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wkF_T

Label: t2LiSe-DaZ T-Wert Wortklassen Fokuspartikel

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2wkF_T	294	48.97	9.37	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.137 t2wkF_Tb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wkF_Tb

Label: t2LiSe-DaZ T-Wert Wortklassen Fokuspartikel - Simultan Bilingual als DaZ,
DaM als DaM und DaZ als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2wkF_Tb	294	48.78	8.77	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.138 t2wkV_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wkV_T

Label: t2LiSe-DaZ T-Wert Wortklassen Vollverben

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2wkV_T	293	51.29	8.77	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.139 t2wkV_Tb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wkV_Tb

Label: t2LiSe-DaZ T-Wert Wortklassen Vollverben - Simultan Bilingual als DaZ, DaM
als DaM und DaZ als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2wkV_Tb	293	50.81	8.16	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.140 t2wkM_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wkM_T

Label: t2LiSe-DaZ T-Wert Wortklassen Modal- und Hilfsverben

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2wkM_T	294	52.52	10.66	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.141 t2wkM_Tb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wkM_Tb

Label: t2LiSe-DaZ T-Wert Wortklassen Modal- und Hilfsverben - Simultan Bilingual als
DaZ, DaM als DaM und DaZ als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2wkM_Tb	294	52.08	9.91	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.142 t2wkK_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wkK_T

Label: t2LiSe-DaZ T-Wert Wortklassen Konjunktionen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2wkK_T	294	51.90	9.48	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.143 t2wkK_Tb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2wkK_Tb

Label: t2LiSe-DaZ T-Wert Wortklassen Konjunktionen - Simultan Bilingual als DaZ,
DaM als DaM und DaZ als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2wkK_Tb	294	53.14	9.14	31.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.144 t2Kad_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2Kad_T

Label: t2LiSe-DaZ T-Wert Kasuszuweisung (Akkusativ & Dativ)

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2Kad_T	294	48.52	9.75	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.145 t2Kad_Tb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2Kad_Tb

Label: t2LiSe-DaZ T-Wert Kasuszuweisung (Akkusativ & Dativ) - Simultan Bilingual
als DaZ, DaM als DaM und DaZ als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2Kad_Tb	294	51.40	9.60	30.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.146 t2PVsum

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2PVsum

Label: t2LiSe-DaZ Verbedeutungen Summe Prozessverben

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t2PVsum	296	5.84	0.45	3.0	6.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

3.147 t2EVsum

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2EVsum

Label: t2LiSe-DaZ Verbedeutungen Summe Endzustandsverben

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t2EVsum	296	5.67	0.54	3.0	6.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

3.148 t2SFsum

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SFsum

Label: t2LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Summe Subjekt-Fragen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t2SFsum	294	1.91	0.33	0.0	2.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

3.149 t2OFsum

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2OFsum

Label: t2LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Summe Objekt-Fragen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t2OFsum	294	3.57	0.81	0.0	4.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

3.150 t2AFsum

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2AFsum

Label: t2LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Summe Adjunkt-Fragen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t2AFsum	294	3.29	0.95	0.0	4.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

3.151 t2ZNsum

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2ZNsum

Label: t2LiSe-DaZ Negationen Summe zutreffender Negationen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2ZNsum	294	4.71	1.51	0.0	6.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.152 t2nZNsum

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2nZNsum

Label: t2LiSe-DaZ Negationen Summe nicht-zutreffender Negationen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t2nZNsum	294	5.54	0.98	0.0	6.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

3.153 t2SSESHSV

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SSESHSV

Label: t2LiSe-DaZ Sprachverstaendnis Anzahl T<40 (bzw. 45)

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t2SSESHSV	296	0.54	0.75	0.0	3.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

3.154 t2SSESHSV_b

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SSESHSV_b

Label: t2LiSe-DaZ Sprachverstaendnis Anzahl T<40 (bzw. 45)

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2SSESHSV_b	296	0.45	0.69	0.0	3.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.155 t2SSESHSP

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SSESHSP

Label: t2LiSe-DaZ Sprachproduktion Anzahl T<40 (bzw. 45)

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t2SSESHSP	294	0.72	1.02	0.0	5.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

3.156 t2SSESHSP_b

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SSESHSP_b

Label: t2LiSe-DaZ Sprachproduktion Anzahl T<40 (bzw. 45)

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2SSESHSP_b	294	0.55	0.94	0.0	5.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.157 t2SSESH

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SSESH

Label: t2LiSe-DaZ Gesamt Anzahl T<40

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t2SSESH	296	1.25	1.51	0.0	8.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

3.158 t2SSESH_b

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SSESH_b

Label: t2LiSe-DaZ Gesamt Anzahl T<40

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2SSESH_b	296	1.00	1.37	0.0	8.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.159 t2SSES

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SSES
 Label: t2LiSe-DaZ Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES) min. 2 T<40
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *no-SLI*; 1 = *SLI*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2SSES	296	0.29	0.45

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	no-SLI	71.3	69.2
1	SLI	28.7	27.9
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.160 t2SSES_b

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SSES_b
 Label: t2LiSe-DaZ Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES) - Simultan
 Bilingual als DaZ min. 2 T<40
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *no-SLI*; 1 = *SLI*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2SSES_b	296	0.22	0.41

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	no-SLI	78.0	75.7
1	SLI	22.0	21.3
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.161 t2SSES3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SSES3
 Label: t2LiSe-DaZ Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES) min. 3 T<40
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *no-SLI*; 1 = *SLI*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2SSES3	296	0.16	0.37

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	no-SLI	83.8	81.3
1	SLI	16.2	15.7
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.162 t2SSES3_b

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SSES3_b
 Label: t2LiSe-DaZ Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES) - Simultan
 Bilingual als DaZ min. 3 T<40
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *no-SLI*; 1 = *SLI*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2SSES3_b	296	0.10	0.30

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	no-SLI	89.9	87.2
1	SLI	10.1	9.8
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.163 t2SSES_bm

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SSES_bm
 Label: t2LiSe-DaZ Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES) - Simultan
 Bilingual als DaZ, DaZ als DaZ und DaM als DaM min. 2 T<40
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *no-SLI*; 1 = *SLI*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2SSES_bm	296	0.22	0.41

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	no-SLI	78.0	75.7
1	SLI	22.0	21.3
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.164 t2SSES3_bm

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SSES3_bm
 Label: t2LiSe-DaZ Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES) - Simultan
 Bilingual als DaZ, DaZ als DaZ und DaM als DaM min. 3 T<40
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *no-SLI*; 1 = *SLI*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2SSES3_bm	296	0.10	0.30

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	no-SLI	89.9	87.2
1	SLI	10.1	9.8
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.165 t2kd_io

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kd_io

Label: t2LiSe-DaZ Kasuszuweisung Dativ Summenscore indirekte Objekte

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kd_io	294	0.82	0.78	0.0	2.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.166 t2kd_p

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2kd_p

Label: t2LiSe-DaZ Kasuszuweisung Dativ Summenscore Praepositionen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2kd_p	294	2.24	0.96	0.0	3.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.167 t2Foe_Sk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2Foe_Sk
 Label: t2LiSe-DaZ Foerderbedarf Subjekt-Verb-Kongruenz
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2Foe_Sk	294	0.03	0.18

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	96.6	93.1
1	Foerderbedarf	3.4	3.3
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.168 t2Foe_P

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2Foe_P

Label: t2LiSe-DaZ Foerderbedarf Praepositionen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2Foe_P	294	0.02	0.14

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	98.0	94.4
1	Foerderbedarf	2.0	2.0
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.169 t2Foe_F

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2Foe_F
 Label: t2LiSe-DaZ Foerderbedarf Fokuspartikel
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2Foe_F	294	0.05	0.21

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	95.2	91.8
1	Foerderbedarf	4.8	4.6
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.170 t2Foe_VV

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2Foe_VV

Label: t2LiSe-DaZ Foerderbedarf Vollverben

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2Foe_VV	294	0.00	0.06

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	99.7	96.1
1	Foerderbedarf	0.3	0.3
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.171 t2Foe_MV

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2Foe_MV

Label: t2LiSe-DaZ Foerderbedarf Modalverben

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2Foe_MV	294	0.00	0.06

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	99.7	96.1
1	Foerderbedarf	0.3	0.3
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.172 t2Foe_K

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2Foe_K

Label: t2LiSe-DaZ Foerderbedarf Konjunktionen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2Foe_K	294	0.03	0.17

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	96.9	93.4
1	Foerderbedarf	3.1	3.0
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.173 t2Foe_A

[
Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2Foe_A
Label: t2LiSe-DaZ Foerderbedarf Akkusativ
Quelle: Schulz & Tracy, 2011
Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2Foe_A	294	0.28	0.45

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[
Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	71.8	69.2
1	Foerderbedarf	28.2	27.2
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.174 t2Foe_D

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2Foe_D
 Label: t2LiSe-DaZ Foerderbedarf Dativ
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2Foe_D	294	0.16	0.36

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	84.4	81.3
1	Foerderbedarf	15.6	15.1
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.175 t2Foe_PV

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2Foe_PV

Label: t2LiSe-DaZ Foerderbedarf Prozessverben

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2Foe_PV	296	0.03	0.16

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	97.3	94.4
1	Foerderbedarf	2.7	2.6
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.176 t2Foe_EV

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2Foe_EV

Label: t2LiSe-DaZ Foerderbedarf Endzustandsverben

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2Foe_EV	296	0.02	0.13

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	98.3	95.4
1	Foerderbedarf	1.7	1.6
-999	missing	–	3.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 296$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.177 t2Foe_SF

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2Foe_SF

Label: t2LiSe-DaZ Foerderbedarf Subjektfragen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2Foe_SF	294	0.08	0.27

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	92.2	88.9
1	Foerderbedarf	7.8	7.5
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.178 t2Foe_OF

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2Foe_OF
 Label: t2LiSe-DaZ Foerderbedarf Objektfragen
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2Foe_OF	294	0.09	0.29

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	90.8	87.5
1	Foerderbedarf	9.2	8.9
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.179 t2Foe_AF

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2Foe_AF

Label: t2LiSe-DaZ Foerderbedarf Adjunktfragen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2Foe_AF	294	0.15	0.36

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	85.0	82.0
1	Foerderbedarf	15.0	14.4
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.180 t2Foe_ZN

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2Foe_ZN

Label: t2LiSe-DaZ Foerderbedarf Zutreffende Negationen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2Foe_ZN	294	0.31	0.46

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	69.0	66.6
1	Foerderbedarf	31.0	29.8
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.181 t2Foe_nZN

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2Foe_nZN

Label: t2LiSe-DaZ Foerderbedarf NICHT Zutreffende Negationen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2Foe_nZN	294	0.10	0.30

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	89.8	86.6
1	Foerderbedarf	10.2	9.8
-999	missing	–	3.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 294$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4 LiSe-DaZ Testzeitpunkt 3

4.1 t3LiSeD

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3LiSeD
Label: t3LiSe-DaZ Testdatum
Variablentyp: Zeichenfolge
Quelle: Schulz & Tracy, 2011

4.2 t3LiSeda

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3LiSeda

Label: t3LiSe Daten vorhanden

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *t1LiSe Daten nicht vorhanden*; 1 = *t1LiSe Daten vorhanden*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3LiSeda	305	0.92	0.27

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	t1LiSe Daten nicht vorhanden	8.2	8.2
1	t1LiSe Daten vorhanden	91.8	91.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.3 t3LiSeND

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3LiSeND

Label: t3LiSe-DaZ Testdatum Nachtestung

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

4.4 t3Lise1_Bemerk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3Lise1_Bemerk

Label: t3LiSe-DaZ Bemerkungen Subtest 1

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

4.5 t3Lise2_Bemerk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3Lise2_Bemerk

Label: t3LiSe-DaZ Bemerkungen Subtest 2

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

4.6 t3Lise4_Bemerk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3Lise4_Bemerk

Label: t3LiSe-DaZ Bemerkungen Subtest 4

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

4.7 t3All

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3All

Label: t3Testtag 1_Bemerkungen allgemein

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

4.8 t3MZIP

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3MZIP
 Label: t3Messzeitpunkt Teilnahme
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *keine Teilnahme an MZIP3*; 1 = *Teilnahme an MZIP3*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3MZIP	305	0.92	0.27

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	keine Teilnahme an MZIP3	8.2	8.2
1	Teilnahme an MZIP3	91.8	91.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.9 t3v_01

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3v_01
 Label: t3LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Item 1
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3v_01	280	1.00	0.06

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	0.4	0.3
1	richtig	99.6	91.5
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.10 t3v_02

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3v_02

Label: t3LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Item 2

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3v_02	280	0.97	0.17

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	2.9	2.6
1	richtig	97.1	89.2
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.11 t3v_03

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3v_03

Label: t3LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Item 3

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3v_03	280	0.99	0.10

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	1.1	1.0
1	richtig	98.9	90.8
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.12 t3v_04

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3v_04
 Label: t3LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Item 4
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3v_04	280	0.98	0.15

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	2.1	2.0
1	richtig	97.9	89.8
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.13 t3v_05

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3v_05
 Label: t3LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Item 5
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3v_05	280	0.98	0.13

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	1.8	1.6
1	richtig	98.2	90.2
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.14 t3v_06

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3v_06

Label: t3LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Item 6

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3v_06	280	1.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	0.0	0.0
1	richtig	100.0	91.8
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.15 t3v_07

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3v_07

Label: t3LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Item 7

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3v_07	280	0.81	0.39

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	18.6	17.0
1	richtig	81.4	74.8
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.16 t3v_08

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3v_08
 Label: t3LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Item 8
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3v_08	280	0.95	0.21

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	4.6	4.3
1	richtig	95.4	87.5
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.17 t3v_09

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3v_09

Label: t3LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Item 9

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3v_09	280	1.00	0.06

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	0.4	0.3
1	richtig	99.6	91.5
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.18 t3v_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3v_10

Label: t3LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Item 10

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3v_10	280	1.00	0.06

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	0.4	0.3
1	richtig	99.6	91.5
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.19 t3v_11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3v_11

Label: t3LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Item 11

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3v_11	280	0.99	0.12

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	1.4	1.3
1	richtig	98.6	90.5
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.20 t3v_12

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3v_12

Label: t3LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Item 12

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3v_12	280	0.96	0.20

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	4.3	3.9
1	richtig	95.7	87.9
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.21 t3v_u1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3v_u1

Label: t3LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Uebungsitem 1

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3v_u1	280	0.99	0.10

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	1.1	1.0
1	richtig	98.9	90.8
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.22 t3v_u2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3v_u2

Label: t3LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Uebungsitem 2

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = falsch; 1 = richtig

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3v_u2	280	0.99	0.10

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	1.1	1.0
1	richtig	98.9	90.8
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.23 t3v_u3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3v_u3

Label: t3LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Uebungsitem 3

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3v_u3	280	1.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	0.0	0.0
1	richtig	100.0	91.8
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.24 t3v_u4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3v_u4

Label: t3LiSe-DaZ Verbbedeutung Hilfvariable Uebungsitem 4

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3v_u4	280	1.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	0.0	0.0
1	richtig	100.0	91.8
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.25 t3v_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3v_RW
 Label: t3LiSe-DaZ Verbbedeutung Rohwert
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3v_RW	280	11.62	0.73	6.0	12.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.26 t3w_01

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3w_01
 Label: t3LiSe-DaZ W-Fragen Hilfvariable Item 1
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3w_01	280	0.97	0.16

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	2.5	2.3
1	richtig	97.5	89.5
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.27 t3w_02

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3w_02
 Label: t3LiSe-DaZ W-Fragen Hilfvariable Item 2
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3w_02	280	0.88	0.32

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	11.8	10.8
1	richtig	88.2	81.0
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.28 t3w_03

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3w_03
 Label: t3LiSe-DaZ W-Fragen Hilfvariable Item 3
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3w_03	280	0.96	0.19

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	3.6	3.3
1	richtig	96.4	88.5
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.29 t3w_04

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3w_04
 Label: t3LiSe-DaZ W-Fragen Hilfvariable Item 4
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3w_04	280	0.74	0.44

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	25.7	23.6
1	richtig	74.3	68.2
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.30 t3w_05

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3w_05
 Label: t3LiSe-DaZ W-Fragen Hilfvariable Item 5
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3w_05	280	0.84	0.37

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	16.1	14.8
1	richtig	83.9	77.0
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.31 t3w_06

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3w_06
 Label: t3LiSe-DaZ W-Fragen Hilfvariable Item 6
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3w_06	280	0.96	0.20

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	4.3	3.9
1	richtig	95.7	87.9
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.32 t3w_07

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3w_07
 Label: t3LiSe-DaZ W-Fragen Hilfvariable Item 7
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3w_07	280	1.00	0.06

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	0.4	0.3
1	richtig	99.6	91.5
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.33 t3w_08

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3w_08
 Label: t3LiSe-DaZ W-Fragen Hilfvariable Item 8
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3w_08	280	0.47	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	53.2	48.9
1	richtig	46.8	43.0
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.34 t3w_09

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3w_09
 Label: t3LiSe-DaZ W-Fragen Hilfvariable Item 9
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3w_09	280	0.91	0.28

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	8.6	7.9
1	richtig	91.4	83.9
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.35 t3w_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3w_10
 Label: t3LiSe-DaZ W-Fragen Hilfvariable Item 10
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3w_10	280	0.91	0.29

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	8.9	8.2
1	richtig	91.1	83.6
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.36 t3w_u1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3w_u1

Label: t3LiSe-DaZ W-Fragen Hilfvariable Uebungsitem 1

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3w_u1	280	0.99	0.08

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	0.7	0.7
1	richtig	99.3	91.1
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.37 t3w_u2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3w_u2
 Label: t3LiSe-DaZ W-Fragen Hilfvariable Uebungsitem 2
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3w_u2	280	0.99	0.10

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	1.1	1.0
1	richtig	98.9	90.8
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.38 t3w_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3w_RW

Label: t3LiSe-DaZ W-Fragen Rohwert

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3w_RW	280	8.65	1.60	1.0	10.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.39 t3ws_01

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3ws_01
 Label: t3LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Item 1
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3ws_01	280	0.97	0.16

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	2.5	2.3
1	richtig	97.5	89.5
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.40 t3ws_02

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3ws_02
 Label: t3LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Item 2
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3ws_02	280	0.88	0.32

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	11.8	10.8
1	richtig	88.2	81.0
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.41 t3ws_03

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3ws_03
 Label: t3LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Item 3
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3ws_03	280	0.96	0.19

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	3.6	3.3
1	richtig	96.4	88.5
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.42 t3ws_04

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3ws_04
 Label: t3LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Item 4
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3ws_04	280	0.89	0.31

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	11.1	10.2
1	richtig	88.9	81.6
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.43 t3ws_05

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3ws_05
 Label: t3LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Item 5
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3ws_05	280	0.84	0.37

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	16.1	14.8
1	richtig	83.9	77.0
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.44 t3ws_06

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3ws_06
 Label: t3LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Item 6
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3ws_06	280	0.96	0.20

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	4.3	3.9
1	richtig	95.7	87.9
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.45 t3ws_07

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3ws_07
 Label: t3LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Item 7
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3ws_07	280	1.00	0.06

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	0.4	0.3
1	richtig	99.6	91.5
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.46 t3ws_08

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3ws_08
 Label: t3LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Item 8
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3ws_08	280	0.75	0.43

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	25.0	23.0
1	richtig	75.0	68.9
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.47 t3ws_09

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3ws_09
 Label: t3LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Item 9
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3ws_09	280	0.91	0.28

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	8.6	7.9
1	richtig	91.4	83.9
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.48 t3ws_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3ws_10
 Label: t3LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Item 10
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3ws_10	280	0.97	0.16

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	2.5	2.3
1	richtig	97.5	89.5
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.49 t3ws_u1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3ws_u1
 Label: t3LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Uebungsitem 1
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3ws_u1	280	0.99	0.08

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	0.7	0.7
1	richtig	99.3	91.1
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.50 t3ws_u2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3ws_u2

Label: t3LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Uebungsitem 2

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3ws_u2	280	0.99	0.10

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	1.1	1.0
1	richtig	98.9	90.8
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.51 t3w_RWs

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3w_RWs

Label: t3LiSe-DaZ W-Fragen inklusive s-Antworten Rohwert

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3w_RWs	280	9.14	1.35	2.0	10.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.52 t3n_01

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3n_01
 Label: t3LiSe-DaZ Negationen Hilfvariable Item 1
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3n_01	280	0.92	0.26

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	7.5	6.9
1	richtig	92.5	84.9
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.53 t3n_02

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3n_02
 Label: t3LiSe-DaZ Negationen Hilfvariable Item 2
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3n_02	280	0.75	0.44

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	25.4	23.3
1	richtig	74.6	68.5
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.54 t3n_03

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3n_03
 Label: t3LiSe-DaZ Negationen Hilfvariable Item 3
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3n_03	280	0.88	0.33

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	12.1	11.1
1	richtig	87.9	80.7
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.55 t3n_04

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3n_04
 Label: t3LiSe-DaZ Negationen Hilfvariable Item 4
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3n_04	280	0.91	0.29

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	8.9	8.2
1	richtig	91.1	83.6
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.56 t3n_05

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3n_05
 Label: t3LiSe-DaZ Negationen Hilfvariable Item 5
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3n_05	280	0.97	0.18

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	3.2	3.0
1	richtig	96.8	88.9
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.57 t3n_06

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3n_06
 Label: t3LiSe-DaZ Negationen Hilfvariable Item 6
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3n_06	280	0.75	0.43

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	25.0	23.0
1	richtig	75.0	68.9
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.58 t3n_07

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3n_07
 Label: t3LiSe-DaZ Negationen Hilfvariable Item 7
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3n_07	280	0.95	0.23

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	5.4	4.9
1	richtig	94.6	86.9
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.59 t3n_08

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3n_08
 Label: t3LiSe-DaZ Negationen Hilfvariable Item 8
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3n_08	280	0.89	0.32

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	11.4	10.5
1	richtig	88.6	81.3
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.60 t3n_09

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3n_09
 Label: t3LiSe-DaZ Negationen Hilfvariable Item 9
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3n_09	280	0.97	0.17

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	2.9	2.6
1	richtig	97.1	89.2
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.61 t3n_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3n_10

Label: t3LiSe-DaZ Negationen Hilfvariable Item 10

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3n_10	280	0.92	0.26

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	7.5	6.9
1	richtig	92.5	84.9
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.62 t3n_11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3n_11

Label: t3LiSe-DaZ Negationen Hilfvariable Item 11

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3n_11	280	0.93	0.25

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	6.8	6.2
1	richtig	93.2	85.6
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.63 t3n_12

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3n_12
 Label: t3LiSe-DaZ Negationen Hilfvariable Item 12
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3n_12	280	0.90	0.30

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	10.0	9.2
1	richtig	90.0	82.6
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.64 t3n_u1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3n_u1
 Label: t3LiSe-DaZ Negationen Hilfvariable Uebungsitem 1
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3n_u1	280	0.95	0.23

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	5.4	4.9
1	richtig	94.6	86.9
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.65 t3n_u2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3n_u2
 Label: t3LiSe-DaZ Negationen Hilfvariable Uebungsitem 2
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3n_u2	280	0.97	0.17

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	2.9	2.6
1	richtig	97.1	89.2
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.66 t3n_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3n_RW
 Label: t3LiSe-DaZ Negationen Rohwert
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3n_RW	280	10.74	1.72	1.0	12.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.67 t3sk_01

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sk_01

Label: t3LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 1

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sk_01	270	2.98	0.94	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.68 t3sk_02

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sk_02

Label: t3LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 3

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sk_02	273	3.81	0.48	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.69 t3sk_03

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sk_03

Label: t3LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 4

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sk_03	278	3.72	0.88	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.70 t3sk_04

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sk_04

Label: t3LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 5

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sk_04	280	2.87	0.44	0.0	3.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.71 t3sk_05

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sk_05

Label: t3LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 6

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sk_05	280	2.94	0.43	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.72 t3sk_06

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sk_06

Label: t3LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 7

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sk_06	279	3.18	1.23	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.73 t3sk_07

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sk_07

Label: t3LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 8.1

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sk_07	279	2.13	0.96	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.74 t3sk_08

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sk_08

Label: t3LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 8.2

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sk_08	279	3.85	0.63	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.75 t3sk_09

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sk_09

Label: t3LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 10.4

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sk_09	278	3.64	0.80	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.76 t3sk_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sk_10

Label: t3LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 10.5

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sk_10	274	2.96	0.67	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.77 t3sk_11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sk_11

Label: t3LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 11.1

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sk_11	280	3.06	0.50	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.78 t3sk_12

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sk_12

Label: t3LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 11.2

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sk_12	279	3.05	0.79	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.79 t3sk_13

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sk_13

Label: t3LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 12.1

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sk_13	280	2.81	0.60	0.0	3.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.80 t3sk_14

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sk_14

Label: t3LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 12.2

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sk_14	279	1.95	1.02	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.81 t3sk_15

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sk_15

Label: t3LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 12.3

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sk_15	279	2.57	1.04	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.82 t3sk_16

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sk_16

Label: t3LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 13.1

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sk_16	280	2.43	0.78	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.83 t3sk_17

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sk_17

Label: t3LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 13.3

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sk_17	279	3.46	0.82	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.84 t3sk_18

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sk_18

Label: t3LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 13.4

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sk_18	278	2.95	0.62	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.85 t3sk_19

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sk_19

Label: t3LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe Aufgabe 14

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sk_19	279	2.59	0.79	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.86 t3sv_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sv_1

Label: t3LiSe-DaZ Subjekt-Verb-Kongruenz Gesamt

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sv_1	280	18.42	4.59	6.0	35.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.87 t3sv_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sv_2

Label: t3LiSe-DaZ Subjekt-Verb-Kongruenz Fehler

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sv_2	280	0.17	0.50	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.88 t3wk_P

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wk_P

Label: t3LiSe-DaZ Wortklassen Praepositionen Gesamt

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3wk_P	280	8.22	2.34	0.0	18.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.89 t3wk_F

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wk_F

Label: t3LiSe-DaZ Wortklassen Fokuspartikel Gesamt

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3wk_F	280	4.64	1.59	1.0	9.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.90 t3wk_V

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wk_V

Label: t3LiSe-DaZ Wortklassen Vollverben Gesamt

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3wk_V	280	16.21	3.96	9.0	36.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.91 t3wk_M

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wk_M

Label: t3LiSe-DaZ Wortklassen Modal- und Hilfsverben Gesamt

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3wk_M	280	7.21	2.45	2.0	16.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.92 t3wk_K

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wk_K

Label: t3LiSe-DaZ Wortklassen Konjunktionen Gesamt

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3wk_K	280	6.49	1.95	0.0	15.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.93 t3ka_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3ka_1
 Label: t3LiSe-DaZ Kasuszuweisung Akkusativ Aufgabe 5a
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3ka_1	279	0.80	0.40

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	19.7	18.0
1	richtig	80.3	73.4
-999	missing	–	8.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 279$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.94 t3ka_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3ka_2
 Label: t3LiSe-DaZ Kasuszuweisung Akkusativ Aufgabe 5b
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3ka_2	105	0.60	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	40.0	13.8
1	richtig	60.0	20.7
-999	missing	–	65.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 105$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.95 t3ka_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3ka_3

Label: t3LiSe-DaZ Kasuszuweisung Akkusativ Aufgabe 10.2

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3ka_3	279	0.49	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	50.9	46.6
1	richtig	49.1	44.9
-999	missing	–	8.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 279$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.96 t3ka_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3ka_4

Label: t3LiSe-DaZ Kasuszuweisung Akkusativ Aufgabe 13.2

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3ka_4	280	0.78	0.42

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	22.5	20.7
1	richtig	77.5	71.1
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.97 t3kd_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3kd_1

Label: t3LiSe-DaZ Kasuszuweisung Dativ Aufgabe 9.1

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3kd_1	280	0.76	0.43

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	23.6	21.6
1	richtig	76.4	70.2
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.98 t3kd_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3kd_2

Label: t3LiSe-DaZ Kasuszuweisung Dativ Aufgabe 9.2

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3kd_2	280	0.75	0.44

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	25.4	23.3
1	richtig	74.6	68.5
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.99 t3kd_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3kd_3
 Label: t3LiSe-DaZ Kasuszuweisung Dativ Aufgabe 9.3
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3kd_3	279	0.78	0.42

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	22.2	20.3
1	richtig	77.8	71.1
-999	missing	–	8.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 279$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.100 t3kd_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3kd_4
 Label: t3LiSe-DaZ Kasuszuweisung Dativ Aufgabe 10.1
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3kd_4	280	0.35	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	64.6	59.3
1	richtig	35.4	32.5
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.101 t3kd_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3kd_5
 Label: t3LiSe-DaZ Kasuszuweisung Dativ Aufgabe 10.3
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3kd_5	280	0.54	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	45.7	42.0
1	richtig	54.3	49.8
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.102 t3sk_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sk_4

Label: t3LiSe-DaZ Satzklammer Hilfvariable ESS 4

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sk_4	280	5.35	2.01	0.0	11.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.103 t3sk_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sk_3

Label: t3LiSe-DaZ Satzklammer Hilfvariable ESS 3

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sk_3	280	10.42	2.38	2.0	16.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.104 t3sk_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sk_2

Label: t3LiSe-DaZ Satzklammer Hilfvariable ESS 2

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sk_2	280	1.46	1.26	0.0	7.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.105 t3sk_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sk_1

Label: t3LiSe-DaZ Satzklammer Hilfvariable ESS 1

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sk_1	280	0.95	0.97	0.0	5.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.106 t3sk_0

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sk_0

Label: t3LiSe-DaZ Satzklammer Hilfvariable ESS 0

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sk_0	280	0.69	1.09	0.0	7.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.107 t3sk_ESS

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sk_ESS

Label: t3LiSe-DaZ Satzklammer Entwicklungsstufe

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sk_ESS	280	3.92	0.27	3.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.108 t3sv_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sv_RW

Label: t3LiSe-DaZ Subjekt-Verb-Kongruenz Rohwert

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sv_RW	280	18.25	4.57	6.0	35.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.109 t3sv_RWQ

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sv_RWQ

Label: t3LiSe-DaZ Subjekt-Verb-Kongruenz Rohwert-Quotient

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sv_RWQ	280	0.99	0.03	0.8	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.110 t3ka_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3ka_RW

Label: t3LiSe-DaZ Kasuszuweisung Akkusativ Rohwert

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3ka_RW	280	2.29	1.05	0.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.111 t3kd_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3kd_RW

Label: t3LiSe-DaZ Kasuszuweisung Dativ Rohwert

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3kd_RW	280	3.18	1.40	0.0	5.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.112 t3k_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3k_RW

Label: t3LiSe-DaZ Kasuszuweisung Gesamt Rohwert

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3k_RW	280	5.47	1.99	0.0	9.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.113 t3sk_ESa

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sk_ESa

Label: t3LiSe-DaZ Entwicklungsstufe Gesamtpunktzahl (d.h. alle Entwicklungsstufen aufaddiert)

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sk_ESa	280	56.52	5.84	32.0	66.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.114 t3Liseagem

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3Liseagem
 Label: t3LiSe-DaZ Testalter
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3Liseagem	280	82.51	3.74	75.0	94.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.115 t3LiseNagem

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3LiseNagem

Label: t3LiSe-DaZ Testalter Nachtestung

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3LiseNagem	15	82.93	5.28	76.0	93.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.116 t3DeuKon

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3DeuKon

Label: t3LiSe-DaZ Deutschkontakt

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3DeuKon	70	42.94	9.70	15.0	63.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.117 t3DeuKonN

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3DeuKonN

Label: t3LiSe-DaZ Deutschkontakt Nachtestung

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t3DeuKonN	3	36.00	7.00	28.0	41.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.118 t3Lise_2J

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3Lise_2J

Label: t3LiSe-DaZ Schwellenalter von 2 Jahren erreicht?

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3Lise_2J	70	39.60	9.40	24.0	64.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.119 t3Lise_Ngr

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3Lise_Ngr
 Label: t3LiSe-DaZ Normgruppen
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 1 = *DaM 4 Jahre*; 2 = *DaM 5 Jahre*; 3 = *DaM 6 Jahre*; 4 = *DaZ 4 Jahre/0-12 Kontaktmonate*; 5 = *DaZ 4 Jahre/13-35 Kontaktmonate*; 6 = *DaZ 5 Jahre/13-47 Kontaktmonate*; 7 = *DaZ 6 Jahre/25-59 Kontaktmonate*; 8 = *DaZ 7 Jahre/37-71 Kontaktmonate*; 666 = *zu lange Kontakt zu Deutsch*; 777 = *zu kurz Kontakt zu Deutsch*; 888 = *zu alt*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	DaM 4 Jahre	0.0	0.0
2	DaM 5 Jahre	0.0	0.0
3	DaM 6 Jahre	46.8	43.0
4	DaZ 4 Jahre/0-12 Kontaktmonate	0.0	0.0
5	DaZ 4 Jahre/13-35 Kontaktmonate	0.0	0.0
6	DaZ 5 Jahre/13-47 Kontaktmonate	0.0	0.0
7	DaZ 6 Jahre/25-59 Kontaktmonate	14.6	13.4
8	DaZ 7 Jahre/37-71 Kontaktmonate	7.9	7.2
666	zu lange Kontakt zu Deutsch	0.0	0.0
777	zu kurz Kontakt zu Deutsch	2.5	2.3
888	zu alt	28.2	25.9
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{\text{valid}} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{\text{total}} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.120 t3Lise_NNgr

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3Lise_NNgr

Label: t3LiSe-DaZ Normgruppen Nachtestung

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 1 = *DaM 4 Jahre*; 2 = *DaM 5 Jahre*; 3 = *DaM 6 Jahre*; 4 = *DaZ 4 Jahre/0-12 Kontaktmonate*; 5 = *DaZ 4 Jahre/13-35 Kontaktmonate*; 6 = *DaZ 5 Jahre/13-47 Kontaktmonate*; 7 = *DaZ 6 Jahre/25-59 Kontaktmonate*; 8 = *DaZ 7 Jahre/37-71 Kontaktmonate*; 666 = *zu lange Kontakt zu Deutsch*; 777 = *zu kurz Kontakt zu Deutsch*; 888 = *zu alt*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	DaM 4 Jahre	0.0	0.0
2	DaM 5 Jahre	0.0	0.0
3	DaM 6 Jahre	46.7	2.3
4	DaZ 4 Jahre/0-12 Kontaktmonate	0.0	0.0
5	DaZ 4 Jahre/13-35 Kontaktmonate	0.0	0.0
6	DaZ 5 Jahre/13-47 Kontaktmonate	0.0	0.0
7	DaZ 6 Jahre/25-59 Kontaktmonate	6.7	0.3
8	DaZ 7 Jahre/37-71 Kontaktmonate	6.7	0.3
666	zu lange Kontakt zu Deutsch	0.0	0.0
777	zu kurz Kontakt zu Deutsch	6.7	0.3
888	zu alt	33.3	1.6
-999	missing	–	95.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{\text{valid}} = 15$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{\text{total}} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.121 t3Lise_NgrK

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3Lise_NgrK

Label: t3LiSe-DaZ Normgruppen inkl. zu kurz Deutsch

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 1 = *DaM 4 Jahre*; 2 = *DaM 5 Jahre*; 3 = *DaM 6 Jahre*; 4 = *DaZ 4 Jahre/0-12 Kontaktmonate*; 5 = *DaZ 4 Jahre/13-35 Kontaktmonate*; 6 = *DaZ 5 Jahre/ max. 47 Kontaktmonate*; 7 = *DaZ 6 Jahre/ max. 59 Kontaktmonate*; 8 = *DaZ 7 Jahre/ max. 71 Kontaktmonate*; 666 = *zu lange Kontakt zu Deutsch*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	DaM 4 Jahre	0.0	0.0
2	DaM 5 Jahre	0.0	0.0
3	DaM 6 Jahre	75.0	68.9
4	DaZ 4 Jahre/0-12 Kontaktmonate	0.0	0.0
5	DaZ 4 Jahre/13-35 Kontaktmonate	0.0	0.0
6	DaZ 5 Jahre/ max. 47 Kontaktmonate	0.0	0.0
7	DaZ 6 Jahre/ max. 59 Kontaktmonate	15.0	13.8
8	DaZ 7 Jahre/ max. 71 Kontaktmonate	10.0	9.2
666	zu lange Kontakt zu Deutsch	0.0	0.0
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.122 t3Lise_NNgrK

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3Lise_NNgrK

Label: t3LiSe-DaZ Normgruppen Nachtestung inkl. zu kurz Deutsch

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 1 = *DaM 4 Jahre*; 2 = *DaM 5 Jahre*; 3 = *DaM 6 Jahre*; 4 = *DaZ 4 Jahre/0-12 Kontaktmonate*; 5 = *DaZ 4 Jahre/13-35 Kontaktmonate*; 6 = *DaZ 5 Jahre/ max. 47 Kontaktmonate*; 7 = *DaZ 6 Jahre/ max. 59 Kontaktmonate*; 8 = *DaZ 7 Jahre/ max. 71 Kontaktmonate*; 666 = *zu lange Kontakt zu Deutsch*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	DaM 4 Jahre	0.0	0.0
2	DaM 5 Jahre	0.0	0.0
3	DaM 6 Jahre	80.0	3.9
4	DaZ 4 Jahre/0-12 Kontaktmonate	0.0	0.0
5	DaZ 4 Jahre/13-35 Kontaktmonate	0.0	0.0
6	DaZ 5 Jahre/ max. 47 Kontaktmonate	0.0	0.0
7	DaZ 6 Jahre/ max. 59 Kontaktmonate	6.7	0.3
8	DaZ 7 Jahre/ max. 71 Kontaktmonate	13.3	0.7
666	zu lange Kontakt zu Deutsch	0.0	0.0
-999	missing	–	95.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 15$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.123 t3v_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3v_T
 Label: t3LiSe-DaZ T-Wert Verbbedeutung
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3v_T	280	49.37	7.53	29.0	57.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.124 t3v_Tb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3v_Tb

Label: t3LiSe-DaZ T-Wert Verbbedeutung - Simultan Bilingual als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3v_Tb	280	50.44	6.85	29.0	57.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.125 t3w_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3w_T
 Label: t3LiSe-DaZ T-Wert W-Fragen
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3w_T	280	44.14	10.07	29.0	59.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.126 t3w_Tb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3w_Tb

Label: t3LiSe-DaZ T-Wert W-Fragen - Simultan Bilingual als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3w_Tb	280	45.29	9.78	29.0	59.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.127 t3w_Ts

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3w_Ts

Label: t3LiSe-DaZ T-Wert W-Fragen mit s-Antworten

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3w_Ts	280	48.08	9.29	29.0	59.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.128 t3w_Tsb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3w_Tsb

Label: t3LiSe-DaZ T-Wert W-Fragen mit s-Antworten - Simultan Bilingual als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3w_Tsb	280	49.10	8.91	29.0	59.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.129 t3n_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3n_T

Label: t3LiSe-DaZ T-Wert Negationen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3n_T	280	49.30	7.99	29.0	60.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.130 t3n_Tb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3n_Tb

Label: t3LiSe-DaZ T-Wert Negationen - Simultan Bilingual als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3n_Tb	280	49.94	8.13	29.0	60.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.131 t3sk_P

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sk_P

Label: t3LiSe-DaZ kum.Prozentangaben Satzklammer

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sk_P	280	8.71	10.88	0.0	39.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.132 t3sk_Pb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sk_Pb

Label: t3LiSe-DaZ kum.Prozentangaben Satzklammer - Simultan Bilingual als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sk_Pb	280	13.02	14.22	0.0	39.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.133 t3sv_RWQ_Q

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sv_RWQ_Q

Label: t3LiSe-DaZ Subjekt-Verb-Kongruenz Quartil

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sv_RWQ_Q	280	3.71	0.81	1.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.134 t3sv_RWQ_Qb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sv_RWQ_Qb

Label: t3LiSe-DaZ Subjekt-Verb-Kongruenz Quartil - Simultan Bilingual als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sv_RWQ_Qb	280	3.74	0.73	1.0	4.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.135 t3wkP_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wkP_T

Label: t3LiSe-DaZ T-Wert Wortklassen Praeposition

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3wkP_T	280	55.44	9.44	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.136 t3wkP_Tb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wkP_Tb

Label: t3LiSe-DaZ T-Wert Wortklassen Praeposition - Simultan Bilingual als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3wkP_Tb	280	55.27	9.22	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.137 t3wkF_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wkF_T

Label: t3LiSe-DaZ T-Wert Wortklassen Fokuspartikel

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3wkF_T	280	49.89	10.04	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.138 t3wkF_Tb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wkF_Tb

Label: t3LiSe-DaZ T-Wert Wortklassen Fokuspartikel - Simultan Bilingual als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3wkF_Tb	280	49.65	9.67	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.139 t3wkV_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wkV_T

Label: t3LiSe-DaZ T-Wert Wortklassen Vollverben

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3wkV_T	280	51.99	8.18	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.140 t3wkV_Tb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wkV_Tb

Label: t3LiSe-DaZ T-Wert Wortklassen Vollverben - Simultan Bilingual als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3wkV_Tb	280	51.27	7.87	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.141 t3wkM_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wkM_T

Label: t3LiSe-DaZ T-Wert Wortklassen Modal- und Hilfsverben

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3wkM_T	280	53.00	9.99	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.142 t3wkM_Tb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wkM_Tb

Label: t3LiSe-DaZ T-Wert Wortklassen Modal- und Hilfsverben - Simultan Bilingual als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3wkM_Tb	280	52.28	9.53	30.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.143 t3wkK_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wkK_T

Label: t3LiSe-DaZ T-Wert Wortklassen Konjunktionen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3wkK_T	280	53.31	9.15	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.144 t3wkK_Tb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3wkK_Tb

Label: t3LiSe-DaZ T-Wert Wortklassen Konjunktionen - Simultan Bilingual als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3wkK_Tb	280	54.13	9.04	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.145 t3Kad_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3Kad_T

Label: t3LiSe-DaZ T-Wert Kasuszuweisung (Akkusativ & Dativ)

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3Kad_T	280	49.28	10.08	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.146 t3Kad_Tb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3Kad_Tb

Label: t3LiSe-DaZ T-Wert Kasuszuweisung (Akkusativ & Dativ) - Simultan Bilingual
als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3Kad_Tb	280	51.80	9.98	29.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.147 t3PVsum

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3PVsum

Label: t3LiSe-DaZ Verbedeutungen Summe Prozessverben

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t3PVsum	280	5.87	0.49	3.0	6.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.148 t3EVsum

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3EVsum

Label: t3LiSe-DaZ Verbedeutungen Summe Endzustandsverben

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t3EVsum	280	5.75	0.49	3.0	6.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.149 t3SFsum

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SFsum

Label: t3LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Summe Subjekt-Fragen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t3SFsum	280	1.96	0.19	1.0	2.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.150 t3OFsum

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3OFsum

Label: t3LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Summe Objekt-Fragen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t3OFsum	280	3.69	0.69	0.0	4.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.151 t3AFsum

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3AFsum

Label: t3LiSe-DaZ W-Fragen (inkl. s-Antworten) Summe Adjunkt-Fragen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t3AFsum	280	3.50	0.82	1.0	4.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.152 t3ZNsum

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3ZNsum

Label: t3LiSe-DaZ Negationen Summe zutreffender Negationen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3ZNsum	280	5.09	1.38	0.0	6.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.153 t3nZNsum

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3nZNsum

Label: t3LiSe-DaZ Negationen Summe nicht-zutreffender Negationen

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t3nZNsum	280	5.65	0.82	0.0	6.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.154 t3SSESHSV

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SSESHSV

Label: t3LiSe-DaZ Sprachverstaendnis Anzahl T<40 (bzw. 45)

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t3SSESHSV	280	0.57	0.80	0.0	3.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.155 t3SSESHSV_b

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SSESHSV_b

Label: t3LiSe-DaZ Sprachverstaendnis Anzahl T<40 (bzw. 45) - Simultan Bilingual als
DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3SSESHSV_b	280	0.50	0.78	0.0	3.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.156 t3SSESHSP

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SSESHSP

Label: t3LiSe-DaZ Sprachproduktion Anzahl T<40 (bzw. 45)

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t3SSESHSP	280	0.81	1.01	0.0	5.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.157 t3SSESHSP_b

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SSESHSP_b

Label: t3LiSe-DaZ Sprachproduktion Anzahl T<40 (bzw. 45) - Simultan Bilingual als
DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3SSESHSP_b	280	0.71	0.99	0.0	5.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.158 t3SSESH

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SSESH
 Label: t3LiSe-DaZ Gesamt Anzahl T<40
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t3SSESH	280	1.38	1.49	0.0	8.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 305$.

4.159 t3SSESH_b

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SSESH_b

Label: t3LiSe-DaZ Gesamt Anzahl T<40 - Simultan Bilingual als DaZ

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3SSESH_b	280	1.21	1.45	0.0	8.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.160 t3SSES

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SSES

Label: t3LiSe-DaZ Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES) min. 2 T<40

Quelle: Schulz & Tracy, 2011

Kategorien: 0 = *no-SLI*; 1 = *SLI*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3SSES	280	0.38	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	no-SLI	62.5	57.4
1	SLI	37.5	34.4
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.161 t3SSES_bm

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SSES_bm
 Label: t3LiSe-DaZ Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES) - Simultan
 Bilingual als DaZ, DaZ als DaZ und DaM als DaM min. 2 T<40
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *no-SLI*; 1 = *SLI*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3SSES_bm	280	0.32	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	no-SLI	67.9	62.3
1	SLI	32.1	29.5
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.162 t3SSES3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SSES3
 Label: t3LiSe-DaZ Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES) min. 3 T<40
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *no-SLI*; 1 = *SLI*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3SSES3	280	0.19	0.39

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	no-SLI	81.4	74.8
1	SLI	18.6	17.0
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.163 t3SSES3_bm

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SSES3_bm
 Label: t3LiSe-DaZ Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES) - Simultan
 Bilingual als DaZ, DaZ als DaZ und DaM als DaM min. 3 T<40
 Quelle: Schulz & Tracy, 2011
 Kategorien: 0 = *no-SLI*; 1 = *SLI*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3SSES3_bm	280	0.14	0.35

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	no-SLI	85.7	78.7
1	SLI	14.3	13.1
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

V SET

1 SET Testzeitpunkt 1

1.1 Code

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Code

Label: t1 SET Versuchspersonencode

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.2 t1SETD

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SETD

Label: t1 SET Testdatum

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Petermann, 2016

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.3 t1SETND

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SETND

Label: t1 SET Testdatum Nachtestung

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Petermann, 2016

1.4 t1SETh_vorh

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SETh_vorh

Label: t1 SET Handlungssequenzen vorhanden?

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *nicht durchgefuehrt*; 1 = *Abbruch*; 2 = *vollstaendig vorhanden*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1SETh_vorh	305	1.90	0.45

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	nicht durchgefuehrt	5.2	5.2
1	Abbruch	0.0	0.0
2	vollstaendig vorhanden	94.8	94.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.5 t1SETh_Bemerk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SETh_Bemerk

Label: t1 SET Handlungssequenzen Bemerkung

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Petermann, 2016

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.6 t1SETb_vorh

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SETb_vorh

Label: t1 SET Bildergeschichte vorhanden?

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *nicht durchgefuehrt*; 1 = *Abbruch/aufgrund TL-Fehler nicht auswertbar*;
2 = *vollstaendig vorhanden*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1SETb_vorh	305	1.67	0.58

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	nicht durchgefuehrt	5.6	5.6
1	Abbruch/aufgrund TL-Fehler nicht auswertbar	22.0	22.0
2	vollstaendig vorhanden	72.5	72.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.7 t1SETb_Bemerk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SETb_Bemerk

Label: t1 SET Bildergeschichte Bemerkung

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Petermann, 2016

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.8 t1SETp_vorh

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SETp_vorh

Label: t1 SET Singular-Plural-Bildung vorhanden?

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *nicht durchgefuehrt*; 1 = *nur echte Woerter vorhanden*; 2 = *nur Pseudowoerter vorhanden*; 3 = *Echte und Pseudowoerter vorhanden*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1SETp_vorh	305	2.77	0.76

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	nicht durchgefuehrt	5.6	5.6
1	nur echte Woerter vorhanden	3.3	3.3
2	nur Pseudowoerter vorhanden	0.0	0.0
3	Echte und Pseudowoerter vorhanden	91.1	91.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.9 t1SETp_Bemerk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SETp_Bemerk

Label: t1 SET Singular-Plural Bemerkung

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Petermann, 2016

1.10 t1SETs_vorh

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SETs_vorh

Label: t1 SET Satzbildung vorhanden?

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *nicht durchgefuehrt*; 1 = *Abbruch*; 2 = *vollstaendig vorhanden*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1SETs_vorh	305	1.74	0.60

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	nicht durchgefuehrt	8.2	8.2
1	Abbruch	9.5	9.5
2	vollstaendig vorhanden	82.3	82.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.11 t1SETs_Bemerk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SETs_Bemerk

Label: t1 SET Satzbildung Bemerkung

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Petermann, 2016

1.12 t1SETs_Abbruch

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SETs_Abbruch
 Label: t1 SET Satzbildung Abbruch?
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *kein Abbruch*; 1 = *Abbruch*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1SETs_Abbruch	280	0.10	0.31

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Abbruch	89.6	82.3
1	Abbruch	10.4	9.5
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.13 t1s_01b

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1s_01b
Label: t1 SET Satzbildung Item 1 Bewertung
Quelle: Petermann, 2016
Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1s_01b	280	0.39	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	60.7	55.7
1	richtig	39.3	36.1
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.14 t1s_02b

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1s_02b
 Label: t1 SET Satzbildung Item 2 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1s_02b	280	0.38	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	62.1	57.0
1	richtig	37.9	34.8
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.15 t1s_03b

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1s_03b
 Label: t1 SET Satzbildung Item 3 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1s_03b	280	0.49	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	50.7	46.6
1	richtig	49.3	45.2
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.16 t1s_04b

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1s_04b
 Label: t1 SET Satzbildung Item 4 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1s_04b	280	0.31	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	68.6	63.0
1	richtig	31.4	28.9
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.17 t1s_05b

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1s_05b
 Label: t1 SET Satzbildung Item 5 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1s_05b	280	0.29	0.45

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	71.1	65.2
1	richtig	28.9	26.6
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.18 t1s_06b

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1s_06b
 Label: t1 SET Satzbildung Item 6 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1s_06b	280	0.30	0.46

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	70.0	64.3
1	richtig	30.0	27.5
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.19 t1s_07b

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1s_07b
 Label: t1 SET Satzbildung Item 7 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1s_07b	280	0.37	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	63.2	58.0
1	richtig	36.8	33.8
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.20 t1s_08b

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1s_08b
 Label: t1 SET Satzbildung Item 8 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1s_08b	280	0.23	0.42

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	76.8	70.5
1	richtig	23.2	21.3
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.21 t1s_09b

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1s_09b
 Label: t1 SET Satzbildung Item 9 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1s_09b	280	0.19	0.39

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	81.4	74.8
1	richtig	18.6	17.0
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.22 t1s_10b

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1s_10b
 Label: t1 SET Satzbildung Item 10 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1s_10b	280	0.24	0.43

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	76.1	69.8
1	richtig	23.9	22.0
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.23 t1s_11b

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1s_11b
 Label: t1 SET Satzbildung Item 11 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1s_11b	280	0.26	0.44

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	73.9	67.9
1	richtig	26.1	23.9
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.24 t1s_12b

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1s_12b
 Label: t1 SET Satzbildung Item 12 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1s_12b	280	0.18	0.38

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	82.1	75.4
1	richtig	17.9	16.4
-999	missing	–	8.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 280$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.25 t1SETb01

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SETb01

Label: t1 SET Bildergeschichte Bewertung Artikel 0-2 Kodierung

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft*; 1 = *Kategorie auf Nachfrage richtig*; 2 = *Kategorie spontan richtig*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1SETb01	283	1.76	0.64

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft	11.7	10.8
1	Kategorie auf Nachfrage richtig	0.4	0.3
2	Kategorie spontan richtig	88.0	81.6
-999	missing	–	7.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 283$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.26 t1SETb02

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SETb02

Label: t1 SET Bildergeschichte Bewertung Wortbeugung 0-2 Kodierung

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft*; 1 = *Kategorie auf Nachfrage richtig*; 2 = *Kategorie spontan richtig*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1SETb02	247	1.23	0.80

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft	22.7	18.4
1	Kategorie auf Nachfrage richtig	31.2	25.2
2	Kategorie spontan richtig	46.2	37.4
-999	missing	–	19.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 247$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.27 t1SETb03

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SETb03

Label: t1 SET Bildergeschichte Bewertung Verben 0-2 Kodierung

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft*; 1 = *Kategorie auf Nachfrage richtig*; 2 = *Kategorie spontan richtig*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1SETb03	284	1.93	0.36

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft	3.2	3.0
1	Kategorie auf Nachfrage richtig	0.7	0.7
2	Kategorie spontan richtig	96.1	89.5
-999	missing	–	6.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 284$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.28 t1SETb04

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SETb04

Label: t1 SET Bildergeschichte Bewertung Pronomina 0-2 Kodierung

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft*; 1 = *Kategorie auf Nachfrage richtig*; 2 = *Kategorie spontan richtig*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1SETb04	253	0.79	0.88

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft	51.4	42.6
1	Kategorie auf Nachfrage richtig	17.8	14.8
2	Kategorie spontan richtig	30.8	25.6
-999	missing	–	17.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 253$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.29 t1SETb05

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SETb05

Label: t1 SET Bildergeschichte Bewertung Bezeichnungen 0-2 Kodierung

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft*; 1 = *Kategorie auf Nachfrage richtig*; 2 = *Kategorie spontan richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1SETb05	281	1.73	0.61

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft	8.5	7.9
1	Kategorie auf Nachfrage richtig	10.0	9.2
2	Kategorie spontan richtig	81.5	75.1
-999	missing	–	7.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 281$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.30 t1SETb06

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SETb06

Label: t1 SET Bildergeschichte Bewertung Sinn der Geschichte

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft*; 1 = *Kategorie auf Nachfrage richtig*; 2 = *Kategorie spontan richtig*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1SETb06	282	0.57	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft	42.6	39.3
1	Kategorie auf Nachfrage richtig	57.4	53.1
2	Kategorie spontan richtig	0.0	0.0
-999	missing	–	7.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 282$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.31 t1SETb07

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SETb07

Label: t1 SET Bildergeschichte Bewertung fluessiger Erzählfluss

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft*; 1 = *Kategorie auf Nachfrage richtig*; 2 = *Kategorie spontan richtig*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1SETb07	284	0.79	0.41

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft	21.5	20.0
1	Kategorie auf Nachfrage richtig	78.5	73.1
2	Kategorie spontan richtig	0.0	0.0
-999	missing	–	6.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 284$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.32 t1SETb08

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SETb08

Label: t1 SET Bildergeschichte Bewertung ganze Sätze

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft*; 1 = *Kategorie auf Nachfrage richtig*; 2 = *Kategorie spontan richtig*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1SETb08	284	0.95	0.21

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft	4.6	4.3
1	Kategorie auf Nachfrage richtig	95.4	88.9
2	Kategorie spontan richtig	0.0	0.0
-999	missing	–	6.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 284$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.33 t1seth01

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1seth01

Label: t1 SET Handlungssequenzen Item 1 Bewertung

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1seth01	289	0.85	0.36

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	14.9	14.1
1	richtig	85.1	80.7
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.34 t1seth02

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1seth02
 Label: t1 SET Handlungssequenzen Item 2 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1seth02	289	0.88	0.33

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	12.1	11.5
1	richtig	87.9	83.3
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.35 t1seth03

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1seth03
 Label: t1 SET Handlungssequenzen Item 3 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1seth03	289	0.55	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	45.0	42.6
1	richtig	55.0	52.1
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.36 t1seth04

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1seth04
 Label: t1 SET Handlungssequenzen Item 4 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1seth04	289	0.62	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	37.7	35.7
1	richtig	62.3	59.0
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.37 t1seth05

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1seth05
Label: t1 SET Handlungssequenzen Item 5 Bewertung
Quelle: Petermann, 2016
Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1seth05	289	0.52	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	47.8	45.2
1	richtig	52.2	49.5
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.38 t1seth06

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1seth06
Label: t1 SET Handlungssequenzen Item 6 Bewertung
Quelle: Petermann, 2016
Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1seth06	289	0.48	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	52.2	49.5
1	richtig	47.8	45.2
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.39 t1seth07

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1seth07
 Label: t1 SET Handlungssequenzen Item 7 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1seth07	289	0.50	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	50.2	47.5
1	richtig	49.8	47.2
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.40 t1seth08

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1seth08
Label: t1 SET Handlungssequenzen Item 8 Bewertung
Quelle: Petermann, 2016
Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1seth08	289	0.33	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	67.5	63.9
1	richtig	32.5	30.8
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.41 t1seth09

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1seth09
Label: t1 SET Handlungssequenzen Item 9 Bewertung
Quelle: Petermann, 2016
Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1seth09	289	0.40	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	59.9	56.7
1	richtig	40.1	38.0
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.42 t1seth10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1seth10
Label: t1 SET Handlungssequenzen Item 10 Bewertung
Quelle: Petermann, 2016
Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1seth10	289	0.47	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	53.3	50.5
1	richtig	46.7	44.3
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.43 t1seth11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1seth11
 Label: t1 SET Handlungssequenzen Item 11 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1seth11	289	0.42	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	58.1	55.1
1	richtig	41.9	39.7
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.44 t1seth12

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1seth12
 Label: t1 SET Handlungssequenzen Item 12 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1seth12	289	0.36	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	64.4	61.0
1	richtig	35.6	33.8
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.45 t1sethu1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sethu1
Label: t1 SET Handlungssequenzen Uebungsitem 1 Bewertung
Quelle: Petermann, 2016
Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1sethu1	289	0.78	0.42

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	22.1	21.0
1	richtig	77.9	73.8
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.46 t1sethu2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sethu2
 Label: t1 SET Handlungssequenzen Uebungsitem 2 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1sethu2	289	0.83	0.38

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	17.3	16.4
1	richtig	82.7	78.4
-999	missing	–	5.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 289$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.47 t1setpr1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1setpr1

Label: t1 SET Singular-Plural Reale Woerter Item 1 Bewertung

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1setpr1	288	0.77	0.42

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	22.6	21.3
1	richtig	77.4	73.1
-999	missing	–	5.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 288$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.48 t1setpr2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1setpr2

Label: t1 SET Singular-Plural Reale Woerter Item 2 Bewertung

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1setpr2	288	0.62	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	38.2	36.1
1	richtig	61.8	58.4
-999	missing	–	5.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 288$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.49 t1setpr3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1setpr3
 Label: t1 SET Singular-Plural Reale Woerter Item 3 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1setpr3	288	0.75	0.43

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	25.0	23.6
1	richtig	75.0	70.8
-999	missing	–	5.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 288$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.50 t1setpr4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1setpr4

Label: t1 SET Singular-Plural Reale Woerter Item 4 Bewertung

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1setpr4	288	0.61	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	38.9	36.7
1	richtig	61.1	57.7
-999	missing	–	5.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 288$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.51 t1setpr5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1setpr5
 Label: t1 SET Singular-Plural Reale Woerter Item 5 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1setpr5	288	0.61	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	38.5	36.4
1	richtig	61.5	58.0
-999	missing	–	5.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 288$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.52 t1setpr6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1setpr6
 Label: t1 SET Singular-Plural Reale Woerter Item 6 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1setpr6	288	0.58	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	42.4	40.0
1	richtig	57.6	54.4
-999	missing	–	5.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 288$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.53 t1setpr7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1setpr7

Label: t1 SET Singular-Plural Reale Woerter Item 7 Bewertung

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1setpr7	288	0.68	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	31.9	30.2
1	richtig	68.1	64.3
-999	missing	–	5.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 288$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.54 t1setpr8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1setpr8
 Label: t1 SET Singular-Plural Reale Woerter Item 8 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1setpr8	288	0.59	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	41.0	38.7
1	richtig	59.0	55.7
-999	missing	–	5.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 288$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.55 t1setpr9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1setpr9

Label: t1 SET Singular-Plural Reale Woerter Item 9 Bewertung

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1setpr9	288	0.63	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	36.8	34.8
1	richtig	63.2	59.7
-999	missing	–	5.6

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 288$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.56 t1setpp1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1setpp1
 Label: t1 SET Singular-Plural Pseudo-Woerter Item 1 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1setpp1	278	0.37	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	63.3	57.7
1	richtig	36.7	33.4
-999	missing	–	8.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 278$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.57 t1setpp2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1setpp2
 Label: t1 SET Singular-Plural Pseudo-Woerter Item 2 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1setpp2	278	0.48	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	51.8	47.2
1	richtig	48.2	43.9
-999	missing	–	8.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 278$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.58 t1setpp3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1setpp3
 Label: t1 SET Singular-Plural Pseudo-Woerter Item 3 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1setpp3	278	0.23	0.42

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	77.3	70.5
1	richtig	22.7	20.7
-999	missing	–	8.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 278$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.59 t1setpp4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1setpp4
 Label: t1 SET Singular-Plural Pseudo-Woerter Item 4 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1setpp4	278	0.37	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	62.9	57.4
1	richtig	37.1	33.8
-999	missing	–	8.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 278$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.60 t1setpp5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1setpp5
 Label: t1 SET Singular-Plural Pseudo-Woerter Item 5 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1setpp5	278	0.50	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	49.6	45.2
1	richtig	50.4	45.9
-999	missing	–	8.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 278$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.61 t1setpp6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1setpp6
 Label: t1 SET Singular-Plural Pseudo-Woerter Item 6 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1setpp6	278	0.14	0.34

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	86.3	78.7
1	richtig	13.7	12.5
-999	missing	–	8.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 278$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.62 t1setpp7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1setpp7
 Label: t1 SET Singular-Plural Pseudo-Woerter Item 7 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1setpp7	278	0.22	0.42

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	77.7	70.8
1	richtig	22.3	20.3
-999	missing	–	8.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 278$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.63 t1setpp8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1setpp8
 Label: t1 SET Singular-Plural Pseudo-Woerter Item 8 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1setpp8	278	0.21	0.40

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	79.5	72.5
1	richtig	20.5	18.7
-999	missing	–	8.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 278$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.64 t1setpp9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1setpp9
 Label: t1 SET Singular-Plural Pseudo-Woerter Item 9 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1setpp9	278	0.51	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	48.9	44.6
1	richtig	51.1	46.6
-999	missing	–	8.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 278$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.65 t1h_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1h_RW
Label: t1 SET Handlungssequenzen Rohwert
Quelle: Petermann, 2016
Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1h_RW	289	6.37	3.12	0.0	12.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.66 t1s_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1s_RW

Label: t1 SET Satzbildung Rohwert

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1s_RW	280	3.63	3.33	0.0	11.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.67 t1pr_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1pr_RW

Label: t1 SET Singular-Plural Reale Woerter Rohwert

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1pr_RW	288	5.85	3.12	0.0	9.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.68 t1pp_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1pp_RW

Label: t1 SET Singular-Plural Pseudo-Woerter Rohwert

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1pp_RW	278	3.03	2.48	0.0	9.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.69 bg_01

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: bg_01

Label: t1 SET Bildergeschichte Bewertung Artikel 0/1 kodiert wie im Manual

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
bg_01	283	0.88	0.32	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.70 bg_02

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: bg_02

Label: t1 SET Bildergeschichte Bewertung Wortbeugung 0-1 kodiert wie im Manual

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
bg_02	247	0.77	0.42	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.71 bg_03

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: bg_03

Label: t1 SET Bildergeschichte Bewertung Verben 0-1 kodiert wie im Manual

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
bg_03	284	0.97	0.18	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.72 bg_04

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: bg_04

Label: t1 SET Bildergeschichte Bewertung Pronomina 0-1 kodiert wie im Manual

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
bg_04	253	0.49	0.50	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.73 bg_05

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: bg_05

Label: t1 SET Bildergeschichte Bewertung Bezeichnungen 0-1 kodiert wie im Manual

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
bg_05	281	0.91	0.28	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.74 t1bg_RWm

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1bg_RWm

Label: t1 SET Rohwert laut Manual auf Basis von 0-1 Kodierung

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1bg_RWm	221	6.37	1.57	1.0	8.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.75 t1bg_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1bg_RW

Label: t1 SET Rohwert auf Basis von 0-2 Kodierung

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1bg_RW	221	9.73	2.51	2.0	13.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.76 t1SETagem

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SETagem

Label: t1 SET Alter bei Testung

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1SETagem	292	68.21	3.74	59.0	80.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.77 t1SETNagem

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SETNagem

Label: t1 SET Alter bei Nachtestung

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1SETNagem	7	71.29	3.99	65.0	76.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.78 t1SET_Ngr

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SET_Ngr

Label: t1 SET Normgruppen

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 1 = 5;0-5;5 Jahre; 2 = 5;6-5;11 Jahre; 3 = 6;0-6;11 Jahre; 4 = 7;0-7;11 Jahre;
5 = 8;0-8;11 Jahre

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1SET_Ngr	292	1.94	0.66

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	5;0-5;5 Jahre	25.0	23.9
2	5;6-5;11 Jahre	55.8	53.4
3	6;0-6;11 Jahre	19.2	18.4
4	7;0-7;11 Jahre	0.0	0.0
5	8;0-8;11 Jahre	0.0	0.0
-999	missing	–	4.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 292$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.79 t1SET_NNgr

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1SET_NNgr

Label: t1 SET Normgruppen Nachtestung

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 1 = 5;0-5;5 Jahre; 2 = 5;6-5;11 Jahre; 3 = 6;0-6;11 Jahre; 4 = 7;0-7;11 Jahre;
5 = 8;0-8;11 Jahre

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t1SET_NNgr	7	2.57	0.79

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	5;0-5;5 Jahre	14.3	0.3
2	5;6-5;11 Jahre	14.3	0.3
3	6;0-6;11 Jahre	71.4	1.6
4	7;0-7;11 Jahre	0.0	0.0
5	8;0-8;11 Jahre	0.0	0.0
-999	missing	–	97.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 7$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.80 t1sp_sum

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sp_sum

Label: t1 SET Singular-Plural Gesamtrohwert

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sp_sum	278	9.08	4.86	0.0	18.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.81 t1h_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1h_T

Label: t1 SET Handlungssequenzen Normwert

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1h_T	289	50.32	11.96	26.0	80.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.82 t1s_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1s_T

Label: t1 SET Satzbildung Normwert

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1s_T	280	49.41	7.21	33.0	67.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.83 t1sp_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1sp_T

Label: t1 SET Singular-Plural Normwert

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1sp_T	278	49.79	13.16	24.0	80.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

1 SET TESTZEITPUNKT 1

1.84 t1bg_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t1bg_T

Label: t1 SET Bildergeschichte Normwert

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t1bg_T	221	54.52	16.77	30.0	80.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

2 SET TESTZEITPUNKT 2

2 SET Testzeitpunkt 2

2.1 t2SETD

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SETD

Label: t2 SET Testdatum

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Petermann, 2016

V SET

2 SET TESTZEITPUNKT 2

2.2 t2SETND

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SETND

Label: t2 SET Testdatum Nachtestung

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Petermann, 2016

V SET

2 SET TESTZEITPUNKT 2

2.3 t2SET_Bemerk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SET_Bemerk

Label: t2 SET Bemerkung

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Petermann, 2016

2.4 t2SETh_vorh

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SETh_vorh

Label: t2 SET Handlungssequenzen vorhanden?

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *nicht durchgefuehrt*; 1 = *Abbruch*; 2 = *vollstaendig vorhanden*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2SETh_vorh	305	1.72	0.70

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	nicht durchgefuehrt	14.1	14.1
1	Abbruch	0.0	0.0
2	vollstaendig vorhanden	85.9	85.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

2 SET TESTZEITPUNKT 2

2.5 t2SETh_Bemerk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SETh_Bemerk

Label: t2 SET Handlungssequenzen Bemerkung

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Petermann, 2016

V SET

2 SET TESTZEITPUNKT 2

2.6 t2SETb_vorh

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SETb_vorh

Label: t2 SET Bildergeschichte vorhanden?

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *nicht durchgefuehrt*; 1 = *Abbruch/aufgrund TL-Fehler nicht auswertbar*;
2 = *vollstaendig vorhanden*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2SETb_vorh	305	1.58	0.73

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	nicht durchgefuehrt	14.4	14.4
1	Abbruch/aufgrund TL-Fehler nicht auswertbar	13.1	13.1
2	vollstaendig vorhanden	72.5	72.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

2 SET TESTZEITPUNKT 2

2.7 t2SETb_Bemerk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SETb_Bemerk

Label: t2 SET Bildergeschichte Bemerkung

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Petermann, 2016

2.8 t2SETs_vorh

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SETs_vorh

Label: t2 SET Satzbildung vorhanden?

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *nicht durchgefuehrt*; 1 = *Abbruch*; 2 = *vollstaendig vorhanden*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2SETs_vorh	305	1.70	0.71

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	nicht durchgefuehrt	14.8	14.8
1	Abbruch	0.0	0.0
2	vollstaendig vorhanden	85.2	85.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

2 SET TESTZEITPUNKT 2

2.9 t2SETs_Bemerk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SETs_Bemerk

Label: t2 SET Satzbildung Bemerkung

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Petermann, 2016

2.10 t2SETp_vorh

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SETp_vorh

Label: t2 SET Singular-Plural-Bildung vorhanden?

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *nicht durchgefuehrt*; 1 = *nur echte Woerter vorhanden*; 2 = *nur Pseudowoerter vorhanden*; 3 = *Echte und Pseudowoerter vorhanden*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2SETp_vorh	305	2.58	1.05

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	nicht durchgefuehrt	14.1	14.1
1	nur echte Woerter vorhanden	0.0	0.0
2	nur Pseudowoerter vorhanden	0.0	0.0
3	Echte und Pseudowoerter vorhanden	85.9	85.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

2 SET TESTZEITPUNKT 2

2.11 t2SETp_Bemerk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SETp_Bemerk

Label: t2 SET Singular-Plural Bemerkung

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Petermann, 2016

2.12 t2SETs_Abbruch

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SETs_Abbruch
 Label: t2 SET Satzbildung Abbruch?
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *kein Abbruch*; 1 = *Abbruch*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2SETs_Abbruch	261	0.06	0.24

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Abbruch	93.9	80.3
1	Abbruch	6.1	5.2
-999	missing	–	14.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 261$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.13 t2sets01

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sets01
 Label: t2 SET Satzbildung Item 1 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2sets01	261	0.53	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	47.1	40.3
1	richtig	52.9	45.2
-999	missing	–	14.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 261$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.14 t2sets02

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sets02
 Label: t2 SET Satzbildung Item 2 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2sets02	261	0.54	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	46.0	39.3
1	richtig	54.0	46.2
-999	missing	–	14.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 261$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.15 t2sets03

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sets03
 Label: t2 SET Satzbildung Item 3 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2sets03	261	0.59	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	41.0	35.1
1	richtig	59.0	50.5
-999	missing	–	14.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 261$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.16 t2sets04

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sets04
 Label: t2 SET Satzbildung Item 4 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2sets04	261	0.50	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	49.8	42.6
1	richtig	50.2	43.0
-999	missing	–	14.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 261$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.17 t2sets05

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sets05
 Label: t2 SET Satzbildung Item 5 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2sets05	261	0.38	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	62.1	53.1
1	richtig	37.9	32.5
-999	missing	–	14.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 261$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.18 t2sets06

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sets06
 Label: t2 SET Satzbildung Item 6 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2sets06	261	0.30	0.46

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	70.1	60.0
1	richtig	29.9	25.6
-999	missing	–	14.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 261$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.19 t2sets07

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sets07
 Label: t2 SET Satzbildung Item 7 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2sets07	261	0.51	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	48.7	41.6
1	richtig	51.3	43.9
-999	missing	–	14.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 261$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.20 t2sets08

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sets08
 Label: t2 SET Satzbildung Item 8 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2sets08	261	0.38	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	62.1	53.1
1	richtig	37.9	32.5
-999	missing	–	14.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 261$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.21 t2sets09

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sets09
 Label: t2 SET Satzbildung Item 9 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2sets09	261	0.32	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	67.8	58.0
1	richtig	32.2	27.5
-999	missing	–	14.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 261$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.22 t2sets10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sets10
 Label: t2 SET Satzbildung Item 10 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2sets10	261	0.28	0.45

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	72.0	61.6
1	richtig	28.0	23.9
-999	missing	–	14.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 261$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.23 t2sets11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sets11
 Label: t2 SET Satzbildung Item 11 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2sets11	261	0.40	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	59.8	51.1
1	richtig	40.2	34.4
-999	missing	–	14.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 261$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.24 t2sets12

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sets12
 Label: t2 SET Satzbildung Item 12 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2sets12	261	0.27	0.44

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	73.2	62.6
1	richtig	26.8	23.0
-999	missing	–	14.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 261$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

2 SET TESTZEITPUNKT 2

2.25 t2SETb_BemerkA

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SETb_BemerkA

Label: t2 SET Bildergeschichte Bemerkungen Auswertung

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Petermann, 2016

2.26 t2SETb01

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SETb01

Label: t2 SET Bildergeschichte Bewertung Artikel 0-2 Kodierung

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft*; 1 = *Kategorie auf Nachfrage richtig*; 2 = *Kategorie spontan richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2SETb01	254	1.78	0.62

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft	10.6	8.9
1	Kategorie auf Nachfrage richtig	0.4	0.3
2	Kategorie spontan richtig	89.0	74.1
-999	missing	–	16.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 254$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

2 SET TESTZEITPUNKT 2

2.27 t2SETb02

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SETb02

Label: t2 SET Bildergeschichte Bewertung Wortbeugung 0-2 Kodierung

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft*; 1 = *Kategorie auf Nachfrage richtig*; 2 = *Kategorie spontan richtig*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2SETb02	234	1.24	0.78

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft	20.9	16.1
1	Kategorie auf Nachfrage richtig	33.8	25.9
2	Kategorie spontan richtig	45.3	34.8
-999	missing	–	23.3

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 234$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.28 t2SETb03

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SETb03
 Label: t2 SET Bildergeschichte Bewertung Verben 0-2 Kodierung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft*; 1 = *Kategorie auf Nachfrage richtig*; 2 = *Kategorie spontan richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2SETb03	254	1.97	0.25

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft	1.6	1.3
1	Kategorie auf Nachfrage richtig	0.0	0.0
2	Kategorie spontan richtig	98.4	82.0
-999	missing	–	16.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 254$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.29 t2SETb04

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SETb04

Label: t2 SET Bildergeschichte Bewertung Pronomina 0-2 Kodierung

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft*; 1 = *Kategorie auf Nachfrage richtig*; 2 = *Kategorie spontan richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2SETb04	242	0.94	0.90

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft	43.0	34.1
1	Kategorie auf Nachfrage richtig	19.8	15.7
2	Kategorie spontan richtig	37.2	29.5
-999	missing	–	20.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 242$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.30 t2SETb05

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SETb05
 Label: t2 SET Bildergeschichte Bewertung Bezeichnungen 0-2 Kodierung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft*; 1 = *Kategorie auf Nachfrage richtig*; 2 = *Kategorie spontan richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2SETb05	250	1.90	0.31

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft	0.4	0.3
1	Kategorie auf Nachfrage richtig	8.8	7.2
2	Kategorie spontan richtig	90.8	74.4
-999	missing	–	18.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 250$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.31 t2SETb06

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SETb06

Label: t2 SET Bildergeschichte Bewertung Sinn der Geschichte

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft*; 1 = *Kategorie auf Nachfrage richtig*; 2 = *Kategorie spontan richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2SETb06	253	0.74	0.44

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft	26.5	22.0
1	Kategorie auf Nachfrage richtig	73.5	61.0
2	Kategorie spontan richtig	0.0	0.0
-999	missing	–	17.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 253$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

2 SET TESTZEITPUNKT 2

2.32 t2SETb07

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SETb07

Label: t2 SET Bildergeschichte Bewertung fluessiger Erzählfluss

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft*; 1 = *Kategorie auf Nachfrage richtig*; 2 = *Kategorie spontan richtig*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2SETb07	253	0.89	0.31

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft	10.7	8.9
1	Kategorie auf Nachfrage richtig	89.3	74.1
2	Kategorie spontan richtig	0.0	0.0
-999	missing	–	17.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 253$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.33 t2SETb08

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SETb08

Label: t2 SET Bildergeschichte Bewertung ganze Sätze

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft*; 1 = *Kategorie auf Nachfrage richtig*; 2 = *Kategorie spontan richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2SETb08	253	0.99	0.09

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft	0.8	0.7
1	Kategorie auf Nachfrage richtig	99.2	82.3
2	Kategorie spontan richtig	0.0	0.0
-999	missing	–	17.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 253$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.34 t2seth01

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2seth01
 Label: t2 SET Handlungssequenzen Item 1 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2seth01	262	0.91	0.28

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	8.8	7.5
1	richtig	91.2	78.4
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.35 t2seth02

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2seth02
 Label: t2 SET Handlungssequenzen Item 2 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2seth02	262	0.93	0.25

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	6.9	5.9
1	richtig	93.1	80.0
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.36 t2seth03

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2seth03
 Label: t2 SET Handlungssequenzen Item 3 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2seth03	262	0.71	0.46

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	29.4	25.2
1	richtig	70.6	60.7
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.37 t2seth04

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2seth04
 Label: t2 SET Handlungssequenzen Item 4 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2seth04	262	0.72	0.45

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	27.9	23.9
1	richtig	72.1	62.0
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.38 t2seth05

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2seth05
 Label: t2 SET Handlungssequenzen Item 5 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2seth05	262	0.61	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	38.9	33.4
1	richtig	61.1	52.5
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.39 t2seth06

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2seth06
 Label: t2 SET Handlungssequenzen Item 6 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2seth06	262	0.55	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	44.7	38.4
1	richtig	55.3	47.5
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.40 t2seth07

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2seth07
 Label: t2 SET Handlungssequenzen Item 7 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2seth07	262	0.49	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	50.8	43.6
1	richtig	49.2	42.3
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.41 t2seth08

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2seth08
 Label: t2 SET Handlungssequenzen Item 8 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2seth08	262	0.45	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	55.3	47.5
1	richtig	44.7	38.4
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.42 t2seth09

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2seth09
 Label: t2 SET Handlungssequenzen Item 9 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2seth09	262	0.52	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	48.5	41.6
1	richtig	51.5	44.3
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.43 t2seth10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2seth10
 Label: t2 SET Handlungssequenzen Item 10 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2seth10	262	0.58	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	42.0	36.1
1	richtig	58.0	49.8
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.44 t2seth11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2seth11
 Label: t2 SET Handlungssequenzen Item 11 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2seth11	262	0.44	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	56.1	48.2
1	richtig	43.9	37.7
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.45 t2seth12

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2seth12
 Label: t2 SET Handlungssequenzen Item 12 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2seth12	262	0.36	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	64.1	55.1
1	richtig	35.9	30.8
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.46 t2sethu1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sethu1

Label: t2 SET Handlungssequenzen Uebungsitem 1 Bewertung

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2sethu1	262	0.87	0.34

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	13.4	11.5
1	richtig	86.6	74.4
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.47 t2sethu2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sethu2
 Label: t2 SET Handlungssequenzen Uebungsitem 2 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2sethu2	262	0.90	0.29

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	9.5	8.2
1	richtig	90.5	77.7
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.48 t2setpr1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2setpr1
 Label: t2 SET Singular-Plural Reale Woerter Item 1 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2setpr1	262	0.84	0.37

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	16.4	14.1
1	richtig	83.6	71.8
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.49 t2setpr2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2setpr2
 Label: t2 SET Singular-Plural Reale Woerter Item 2 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2setpr2	262	0.70	0.46

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	30.2	25.9
1	richtig	69.8	60.0
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.50 t2setpr3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2setpr3
 Label: t2 SET Singular-Plural Reale Woerter Item 3 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2setpr3	262	0.79	0.41

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	20.6	17.7
1	richtig	79.4	68.2
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.51 t2setpr4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2setpr4

Label: t2 SET Singular-Plural Reale Woerter Item 4 Bewertung

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2setpr4	262	0.70	0.46

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	30.2	25.9
1	richtig	69.8	60.0
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.52 t2setpr5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2setpr5
 Label: t2 SET Singular-Plural Reale Woerter Item 5 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2setpr5	262	0.74	0.44

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	26.0	22.3
1	richtig	74.0	63.6
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.53 t2setpr6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2setpr6

Label: t2 SET Singular-Plural Reale Woerter Item 6 Bewertung

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2setpr6	262	0.72	0.45

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	28.2	24.3
1	richtig	71.8	61.6
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.54 t2setpr7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2setpr7
 Label: t2 SET Singular-Plural Reale Woerter Item 7 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2setpr7	262	0.73	0.44

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	26.7	23.0
1	richtig	73.3	63.0
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.55 t2setpr8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2setpr8
 Label: t2 SET Singular-Plural Reale Woerter Item 8 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2setpr8	262	0.69	0.46

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	31.3	26.9
1	richtig	68.7	59.0
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.56 t2setpr9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2setpr9
 Label: t2 SET Singular-Plural Reale Woerter Item 9 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2setpr9	262	0.71	0.45

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	28.6	24.6
1	richtig	71.4	61.3
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.57 t2setpp1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2setpp1
 Label: t2 SET Singular-Plural Pseudo-Woerter Item 1 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2setpp1	262	0.36	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	64.1	55.1
1	richtig	35.9	30.8
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.58 t2setpp2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2setpp2
 Label: t2 SET Singular-Plural Pseudo-Woerter Item 2 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2setpp2	262	0.53	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	47.3	40.7
1	richtig	52.7	45.2
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.59 t2setpp3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2setpp3
 Label: t2 SET Singular-Plural Pseudo-Woerter Item 3 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2setpp3	262	0.26	0.44

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	74.4	63.9
1	richtig	25.6	22.0
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.60 t2setpp4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2setpp4
 Label: t2 SET Singular-Plural Pseudo-Woerter Item 4 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2setpp4	262	0.45	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	55.3	47.5
1	richtig	44.7	38.4
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.61 t2setpp5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2setpp5
 Label: t2 SET Singular-Plural Pseudo-Woerter Item 5 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2setpp5	262	0.57	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	43.1	37.0
1	richtig	56.9	48.9
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.62 t2setpp6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2setpp6
 Label: t2 SET Singular-Plural Pseudo-Woerter Item 6 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2setpp6	262	0.11	0.32

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	88.5	76.1
1	richtig	11.5	9.8
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.63 t2setpp7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2setpp7
 Label: t2 SET Singular-Plural Pseudo-Woerter Item 7 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2setpp7	262	0.19	0.39

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	81.3	69.8
1	richtig	18.7	16.1
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.64 t2setpp8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2setpp8
 Label: t2 SET Singular-Plural Pseudo-Woerter Item 8 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2setpp8	262	0.26	0.44

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	74.0	63.6
1	richtig	26.0	22.3
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.65 t2setpp9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2setpp9
 Label: t2 SET Singular-Plural Pseudo-Woerter Item 9 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2setpp9	262	0.54	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	46.2	39.7
1	richtig	53.8	46.2
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

2 SET TESTZEITPUNKT 2

2.66 t2h_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2h_RW

Label: t2 SET Handlungssequenzen Rohwert

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2h_RW	262	7.27	3.21	0.0	12.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

2 SET TESTZEITPUNKT 2

2.67 t2s_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2s_RW

Label: t2 SET Satzbildung Rohwert

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2s_RW	261	5.00	3.62	0.0	12.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

2 SET TESTZEITPUNKT 2

2.68 t2pr_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2pr_RW

Label: t2 SET Singular-Plural Reale Woerter Rohwert

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2pr_RW	262	6.62	2.99	0.0	9.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

2 SET TESTZEITPUNKT 2

2.69 t2pp_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2pp_RW

Label: t2 SET Singular-Plural Pseudo-Woerter Rohwert

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2pp_RW	262	3.26	2.39	0.0	9.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

2 SET TESTZEITPUNKT 2

2.70 t2bg_01

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2bg_01

Label: t2 SET Bildergeschichte Bewertung Artikel 0/1 kodiert wie im Manual

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2bg_01	254	0.89	0.31	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

2 SET TESTZEITPUNKT 2

2.71 t2bg_02

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2bg_02

Label: t2 SET Bildergeschichte Bewertung Wortbeugung 0-1 kodiert wie im Manual

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2bg_02	234	0.79	0.41	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

2 SET TESTZEITPUNKT 2

2.72 t2bg_03

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2bg_03

Label: t2 SET Bildergeschichte Bewertung Verben 0-1 kodiert wie im Manual

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2bg_03	254	0.98	0.12	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

2 SET TESTZEITPUNKT 2

2.73 t2bg_04

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2bg_04

Label: t2 SET Bildergeschichte Bewertung Pronomina 0-1 kodiert wie im Manual

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2bg_04	242	0.57	0.50	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

2 SET TESTZEITPUNKT 2

2.74 t2bg_05

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2bg_05

Label: t2 SET Bildergeschichte Bewertung Bezeichnungen 0-1 kodiert wie im Manual

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2bg_05	250	1.00	0.06	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

2 SET TESTZEITPUNKT 2

2.75 t2bg_RWm

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2bg_RWm

Label: t2 SET Rohwert laut Manual auf Basis von 0-1 Kodierung

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2bg_RWm	221	6.88	1.18	2.0	8.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

2 SET TESTZEITPUNKT 2

2.76 t2bg_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2bg_RW

Label: t2 SET Rohwert auf Basis von 0-2 Kodierung

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2bg_RW	221	10.50	1.96	3.0	13.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

2 SET TESTZEITPUNKT 2

2.77 t2SETagem

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SETagem

Label: t2 SET Alter bei Testung

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2SETagem	262	76.68	3.78	69.0	89.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

2 SET TESTZEITPUNKT 2

2.78 t2SETNagem

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SETNagem

Label: t2 SET Alter bei Nachtestung

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2SETNagem	3	78.33	4.04	74.0	82.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

2 SET TESTZEITPUNKT 2

2.79 t2SET_Ngr

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SET_Ngr

Label: t2 SET Normgruppen

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 1 = 5;0-5;5 Jahre; 2 = 5;6-5;11 Jahre; 3 = 6;0-6;11 Jahre; 4 = 7;0-7;11 Jahre;
5 = 8;0-8;11 Jahre

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2SET_Ngr	262	2.95	0.31

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	5;0-5;5 Jahre	0.0	0.0
2	5;6-5;11 Jahre	7.3	6.2
3	6;0-6;11 Jahre	90.1	77.4
4	7;0-7;11 Jahre	2.7	2.3
5	8;0-8;11 Jahre	0.0	0.0
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

2 SET TESTZEITPUNKT 2

2.80 t2SET_NNgr

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2SET_NNgr

Label: t2 SET Normgruppen Nachtestung

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 1 = 5;0-5;5 Jahre; 2 = 5;6-5;11 Jahre; 3 = 6;0-6;11 Jahre; 4 = 7;0-7;11 Jahre;
5 = 8;0-8;11 Jahre

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t2SET_NNgr	3	3.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	5;0-5;5 Jahre	0.0	0.0
2	5;6-5;11 Jahre	0.0	0.0
3	6;0-6;11 Jahre	100.0	1.0
4	7;0-7;11 Jahre	0.0	0.0
5	8;0-8;11 Jahre	0.0	0.0
-999	missing	–	99.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 3$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

2 SET TESTZEITPUNKT 2

2.81 t2sp_sum

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sp_sum

Label: t2 SET Singular-Plural Gesamtrohwert

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sp_sum	262	9.87	4.80	0.0	18.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

2 SET TESTZEITPUNKT 2

2.82 t2h_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2h_T

Label: t2 SET Handlungssequenzen Normwert

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2h_T	262	47.90	13.63	25.0	80.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

2 SET TESTZEITPUNKT 2

2.83 t2s_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2s_T

Label: t2 SET Satzbildung Normwert

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2s_T	261	43.32	9.15	28.0	80.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

2 SET TESTZEITPUNKT 2

2.84 t2sp_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2sp_T

Label: t2 SET Singular-Plural Normwert

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2sp_T	262	45.95	12.09	24.0	80.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

2 SET TESTZEITPUNKT 2

2.85 t2bg_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t2bg_T

Label: t2 SET Bildergeschichte Normwert

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t2bg_T	221	55.86	18.80	31.0	80.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

3 SET TESTZEITPUNKT 3

3 SET Testzeitpunkt 3

3.1 t3SETD

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SETD

Label: t3 SET Testdatum

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Petermann, 2016

V SET

3 SET TESTZEITPUNKT 3

3.2 t3SETND

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SETND

Label: t3 SET Testdatum Nachtestung

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Petermann, 2016

V SET

3 SET TESTZEITPUNKT 3

3.3 t3SETND2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SETND2

Label: t3 SET Testdatum Nachtestung 2

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Petermann, 2016

3.4 t3SETh_vorh

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SETh_vorh

Label: t3 SET Handlungssequenzen vorhanden?

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *nicht durchgefuehrt*; 1 = *Abbruch*; 2 = *vollstaendig vorhanden*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3SETh_vorh	305	1.76	0.65

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	nicht durchgefuehrt	11.8	11.8
1	Abbruch	0.0	0.0
2	vollstaendig vorhanden	88.2	88.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

3 SET TESTZEITPUNKT 3

3.5 t3SETh_Bemerk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SETh_Bemerk

Label: t3 SET Handlungssequenzen Bemerkung

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Petermann, 2016

V SET

3 SET TESTZEITPUNKT 3

3.6 t3SETb_vorh

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SETb_vorh

Label: t3 SET Bildergeschichte vorhanden?

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *nicht durchgefuehrt*; 1 = *Abbruch/aufgrund TL-Fehler nicht auswertbar*;
2 = *vollstaendig vorhanden*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3SETb_vorh	305	1.67	0.68

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	nicht durchgefuehrt	11.8	11.8
1	Abbruch/aufgrund TL-Fehler nicht auswertbar	9.5	9.5
2	vollstaendig vorhanden	78.7	78.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

3 SET TESTZEITPUNKT 3

3.7 t3SETb_Bemerk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SETb_Bemerk

Label: t3 SET Bildergeschichte Bemerkung

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Petermann, 2016

3.8 t3SETs_vorh

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SETs_vorh

Label: t3 SET Satzbildung vorhanden?

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *nicht durchgefuehrt*; 1 = *Abbruch*; 2 = *vollstaendig vorhanden*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3SETs_vorh	305	1.73	0.67

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	nicht durchgefuehrt	12.5	12.5
1	Abbruch	1.6	1.6
2	vollstaendig vorhanden	85.9	85.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

3 SET TESTZEITPUNKT 3

3.9 t3SETs_Bemerk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SETs_Bemerk

Label: t3 SET Satzbildung Bemerkung

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Petermann, 2016

3.10 t3SETp_vorh

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SETp_vorh

Label: t3 SET Singular-Plural-Bildung vorhanden?

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *nicht durchgefuehrt*; 1 = *nur echte Woerter vorhanden*; 2 = *nur Pseudowoerter vorhanden*; 3 = *Echte und Pseudowoerter vorhanden*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3SETp_vorh	305	2.63	0.98

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	nicht durchgefuehrt	11.8	11.8
1	nur echte Woerter vorhanden	1.0	1.0
2	nur Pseudowoerter vorhanden	0.0	0.0
3	Echte und Pseudowoerter vorhanden	87.2	87.2

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

3 SET TESTZEITPUNKT 3

3.11 t3SETp_Bemerk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SETp_Bemerk

Label: t3 SET Singular-Plural Bemerkung

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Petermann, 2016

3.12 t3SETs_Abbruch

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SETs_Abbruch
 Label: t3 SET Satzbildung Abbruch?
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *kein Abbruch*; 1 = *Abbruch*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3SETs_Abbruch	267	0.02	0.14

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Abbruch	98.1	85.9
1	Abbruch	1.9	1.6
-999	missing	–	12.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 267$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.13 t3sets01

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sets01
 Label: t3 SET Satzbildung Item 1 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3sets01	267	0.67	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	33.0	28.9
1	richtig	67.0	58.7
-999	missing	–	12.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 267$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.14 t3sets02

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sets02
 Label: t3 SET Satzbildung Item 2 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3sets02	267	0.64	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	35.6	31.1
1	richtig	64.4	56.4
-999	missing	–	12.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 267$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.15 t3sets03

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sets03
 Label: t3 SET Satzbildung Item 3 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3sets03	267	0.74	0.44

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	25.8	22.6
1	richtig	74.2	64.9
-999	missing	–	12.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 267$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.16 t3sets04

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sets04
 Label: t3 SET Satzbildung Item 4 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3sets04	267	0.67	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	32.6	28.5
1	richtig	67.4	59.0
-999	missing	–	12.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 267$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.17 t3sets05

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sets05
 Label: t3 SET Satzbildung Item 5 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3sets05	267	0.52	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	48.3	42.3
1	richtig	51.7	45.2
-999	missing	–	12.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 267$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.18 t3sets06

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sets06
 Label: t3 SET Satzbildung Item 6 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3sets06	267	0.50	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	50.2	43.9
1	richtig	49.8	43.6
-999	missing	–	12.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 267$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.19 t3sets07

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sets07
 Label: t3 SET Satzbildung Item 7 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3sets07	267	0.57	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	43.1	37.7
1	richtig	56.9	49.8
-999	missing	–	12.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 267$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.20 t3sets08

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sets08
 Label: t3 SET Satzbildung Item 8 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3sets08	267	0.51	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	49.4	43.3
1	richtig	50.6	44.3
-999	missing	–	12.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 267$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.21 t3sets09

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sets09
 Label: t3 SET Satzbildung Item 9 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3sets09	267	0.46	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	54.3	47.5
1	richtig	45.7	40.0
-999	missing	–	12.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 267$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.22 t3sets10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sets10
 Label: t3 SET Satzbildung Item 10 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3sets10	267	0.48	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	51.7	45.2
1	richtig	48.3	42.3
-999	missing	–	12.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 267$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.23 t3sets11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sets11
 Label: t3 SET Satzbildung Item 11 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3sets11	267	0.47	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	53.2	46.6
1	richtig	46.8	41.0
-999	missing	–	12.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 267$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.24 t3sets12

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sets12
 Label: t3 SET Satzbildung Item 12 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3sets12	267	0.37	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	63.3	55.4
1	richtig	36.7	32.1
-999	missing	–	12.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 267$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

3 SET TESTZEITPUNKT 3

3.25 t3SETb_BemerkA

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SETb_BemerkA

Label: t3 SET Bildergeschichte Bemerkungen Auswertung

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Petermann, 2016

3.26 t3SETb01

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SETb01

Label: t3 SET Bildergeschichte Bewertung Artikel 0-2 Kodierung

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft*; 1 = *Kategorie auf Nachfrage richtig*; 2 = *Kategorie spontan richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3SETb01	268	1.88	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft	6.0	5.2
1	Kategorie auf Nachfrage richtig	0.0	0.0
2	Kategorie spontan richtig	94.0	82.6
-999	missing	–	12.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 268$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.27 t3SETb02

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SETb02

Label: t3 SET Bildergeschichte Bewertung Wortbeugung 0-2 Kodierung

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft*; 1 = *Kategorie auf Nachfrage richtig*; 2 = *Kategorie spontan richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3SETb02	258	1.22	0.76

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft	20.5	17.4
1	Kategorie auf Nachfrage richtig	37.2	31.5
2	Kategorie spontan richtig	42.2	35.7
-999	missing	–	15.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 258$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.28 t3SETb03

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SETb03

Label: t3 SET Bildergeschichte Bewertung Verben 0-2 Kodierung

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft*; 1 = *Kategorie auf Nachfrage richtig*; 2 = *Kategorie spontan richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3SETb03	268	1.96	0.30

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft	2.2	2.0
1	Kategorie auf Nachfrage richtig	0.0	0.0
2	Kategorie spontan richtig	97.8	85.9
-999	missing	–	12.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 268$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.29 t3SETb04

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SETb04

Label: t3 SET Bildergeschichte Bewertung Pronomina 0-2 Kodierung

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft*; 1 = *Kategorie auf Nachfrage richtig*; 2 = *Kategorie spontan richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3SETb04	247	1.21	0.89

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft	31.2	25.2
1	Kategorie auf Nachfrage richtig	16.6	13.4
2	Kategorie spontan richtig	52.2	42.3
-999	missing	–	19.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 247$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.30 t3SETb05

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SETb05

Label: t3 SET Bildergeschichte Bewertung Bezeichnungen 0-2 Kodierung

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft*; 1 = *Kategorie auf Nachfrage richtig*; 2 = *Kategorie spontan richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3SETb05	267	1.95	0.22

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft	0.0	0.0
1	Kategorie auf Nachfrage richtig	4.9	4.3
2	Kategorie spontan richtig	95.1	83.3
-999	missing	–	12.5

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 267$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.31 t3SETb06

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SETb06

Label: t3 SET Bildergeschichte Bewertung Sinn der Geschichte

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft*; 1 = *Kategorie auf Nachfrage richtig*; 2 = *Kategorie spontan richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3SETb06	268	0.81	0.39

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft	18.7	16.4
1	Kategorie auf Nachfrage richtig	81.3	71.5
2	Kategorie spontan richtig	0.0	0.0
-999	missing	–	12.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 268$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.32 t3SETb07

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SETb07

Label: t3 SET Bildergeschichte Bewertung fluessiger Erzählfluss

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft*; 1 = *Kategorie auf Nachfrage richtig*; 2 = *Kategorie spontan richtig*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3SETb07	268	0.95	0.22

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft	5.2	4.6
1	Kategorie auf Nachfrage richtig	94.8	83.3
2	Kategorie spontan richtig	0.0	0.0
-999	missing	–	12.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 268$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

3 SET TESTZEITPUNKT 3

3.33 t3SETb08

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SETb08

Label: t3 SET Bildergeschichte Bewertung ganze Sätze

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 0 = *Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft*; 1 = *Kategorie auf Nachfrage richtig*; 2 = *Kategorie spontan richtig*

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3SETb08	268	1.00	0.06

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	Kategorie nicht vorhanden bzw. fehlerhaft	0.4	0.3
1	Kategorie auf Nachfrage richtig	99.6	87.5
2	Kategorie spontan richtig	0.0	0.0
-999	missing	–	12.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 268$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.34 t3seth01

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3seth01
 Label: t3 SET Handlungssequenzen Item 1 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3seth01	269	0.96	0.19

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	3.7	3.3
1	richtig	96.3	84.9
-999	missing	–	11.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 269$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.35 t3seth02

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3seth02
 Label: t3 SET Handlungssequenzen Item 2 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3seth02	269	0.92	0.27

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	8.2	7.2
1	richtig	91.8	81.0
-999	missing	–	11.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 269$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.36 t3seth03

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3seth03
 Label: t3 SET Handlungssequenzen Item 3 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3seth03	269	0.80	0.40

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	20.1	17.7
1	richtig	79.9	70.5
-999	missing	–	11.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 269$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.37 t3seth04

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3seth04
 Label: t3 SET Handlungssequenzen Item 4 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3seth04	269	0.75	0.43

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	24.5	21.6
1	richtig	75.5	66.6
-999	missing	–	11.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 269$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.38 t3seth05

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3seth05
 Label: t3 SET Handlungssequenzen Item 5 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3seth05	269	0.68	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	31.6	27.9
1	richtig	68.4	60.3
-999	missing	–	11.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 269$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.39 t3seth06

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3seth06
 Label: t3 SET Handlungssequenzen Item 6 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3seth06	269	0.63	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	37.2	32.8
1	richtig	62.8	55.4
-999	missing	–	11.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 269$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.40 t3seth07

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3seth07
 Label: t3 SET Handlungssequenzen Item 7 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3seth07	269	0.61	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	39.4	34.8
1	richtig	60.6	53.4
-999	missing	–	11.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 269$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.41 t3seth08

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3seth08
 Label: t3 SET Handlungssequenzen Item 8 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3seth08	269	0.45	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	55.0	48.5
1	richtig	45.0	39.7
-999	missing	–	11.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 269$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.42 t3seth09

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3seth09
 Label: t3 SET Handlungssequenzen Item 9 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3seth09	269	0.54	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	46.1	40.7
1	richtig	53.9	47.5
-999	missing	–	11.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 269$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.43 t3seth10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3seth10
 Label: t3 SET Handlungssequenzen Item 10 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3seth10	269	0.63	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	37.2	32.8
1	richtig	62.8	55.4
-999	missing	–	11.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 269$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.44 t3seth11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3seth11
 Label: t3 SET Handlungssequenzen Item 11 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3seth11	269	0.45	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	55.4	48.9
1	richtig	44.6	39.3
-999	missing	–	11.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 269$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.45 t3seth12

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3seth12
 Label: t3 SET Handlungssequenzen Item 12 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3seth12	269	0.43	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	57.2	50.5
1	richtig	42.8	37.7
-999	missing	–	11.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 269$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.46 t3sethu1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sethu1
 Label: t3 SET Handlungssequenzen Uebungsitem 1 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3sethu1	269	0.96	0.19

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	3.7	3.3
1	richtig	96.3	84.9
-999	missing	–	11.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 269$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.47 t3sethu2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sethu2
 Label: t3 SET Handlungssequenzen Uebungsitem 2 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3sethu2	269	0.93	0.25

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	6.7	5.9
1	richtig	93.3	82.3
-999	missing	–	11.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 269$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.48 t3setpr1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3setpr1
 Label: t3 SET Singular-Plural Reale Woerter Item 1 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3setpr1	269	0.94	0.24

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	6.3	5.6
1	richtig	93.7	82.6
-999	missing	–	11.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 269$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.49 t3setpr2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3setpr2
 Label: t3 SET Singular-Plural Reale Woerter Item 2 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3setpr2	269	0.84	0.36

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	15.6	13.8
1	richtig	84.4	74.4
-999	missing	–	11.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 269$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.50 t3setpr3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3setpr3
 Label: t3 SET Singular-Plural Reale Woerter Item 3 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3setpr3	269	0.87	0.34

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	13.0	11.5
1	richtig	87.0	76.7
-999	missing	–	11.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 269$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.51 t3setpr4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3setpr4
 Label: t3 SET Singular-Plural Reale Woerter Item 4 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3setpr4	269	0.79	0.41

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	21.2	18.7
1	richtig	78.8	69.5
-999	missing	–	11.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 269$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.52 t3setpr5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3setpr5
 Label: t3 SET Singular-Plural Reale Woerter Item 5 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3setpr5	269	0.84	0.36

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	15.6	13.8
1	richtig	84.4	74.4
-999	missing	–	11.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 269$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.53 t3setpr6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3setpr6
 Label: t3 SET Singular-Plural Reale Woerter Item 6 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3setpr6	269	0.82	0.39

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	18.2	16.1
1	richtig	81.8	72.1
-999	missing	–	11.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 269$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.54 t3setpr7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3setpr7
 Label: t3 SET Singular-Plural Reale Woerter Item 7 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3setpr7	269	0.86	0.35

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	14.5	12.8
1	richtig	85.5	75.4
-999	missing	–	11.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 269$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.55 t3setpr8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3setpr8
 Label: t3 SET Singular-Plural Reale Woerter Item 8 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3setpr8	269	0.78	0.41

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	21.9	19.3
1	richtig	78.1	68.9
-999	missing	–	11.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 269$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.56 t3setpr9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3setpr9
 Label: t3 SET Singular-Plural Reale Woerter Item 9 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3setpr9	269	0.77	0.42

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	22.7	20.0
1	richtig	77.3	68.2
-999	missing	–	11.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 269$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.57 t3setpp1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3setpp1
 Label: t3 SET Singular-Plural Pseudo-Woerter Item 1 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3setpp1	268	0.52	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	48.1	42.3
1	richtig	51.9	45.6
-999	missing	–	12.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 268$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.58 t3setpp2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3setpp2
 Label: t3 SET Singular-Plural Pseudo-Woerter Item 2 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3setpp2	268	0.67	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	32.8	28.9
1	richtig	67.2	59.0
-999	missing	–	12.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 268$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.59 t3setpp3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3setpp3
 Label: t3 SET Singular-Plural Pseudo-Woerter Item 3 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3setpp3	268	0.27	0.45

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	72.8	63.9
1	richtig	27.2	23.9
-999	missing	–	12.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 268$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.60 t3setpp4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3setpp4
 Label: t3 SET Singular-Plural Pseudo-Woerter Item 4 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3setpp4	268	0.56	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	44.4	39.0
1	richtig	55.6	48.9
-999	missing	–	12.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 268$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.61 t3setpp5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3setpp5
 Label: t3 SET Singular-Plural Pseudo-Woerter Item 5 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3setpp5	268	0.69	0.46

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	30.6	26.9
1	richtig	69.4	61.0
-999	missing	–	12.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 268$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.62 t3setpp6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3setpp6
 Label: t3 SET Singular-Plural Pseudo-Woerter Item 6 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3setpp6	268	0.18	0.39

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	81.7	71.8
1	richtig	18.3	16.1
-999	missing	–	12.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 268$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.63 t3setpp7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3setpp7
 Label: t3 SET Singular-Plural Pseudo-Woerter Item 7 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3setpp7	268	0.27	0.44

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	73.1	64.3
1	richtig	26.9	23.6
-999	missing	–	12.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 268$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.64 t3setpp8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3setpp8
 Label: t3 SET Singular-Plural Pseudo-Woerter Item 8 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3setpp8	268	0.33	0.47

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	67.2	59.0
1	richtig	32.8	28.9
-999	missing	–	12.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 268$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.65 t3setpp9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3setpp9
 Label: t3 SET Singular-Plural Pseudo-Woerter Item 9 Bewertung
 Quelle: Petermann, 2016
 Kategorien: 0 = *falsch*; 1 = *richtig*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3setpp9	268	0.71	0.46

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	falsch	29.5	25.9
1	richtig	70.5	62.0
-999	missing	–	12.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 268$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

3 SET TESTZEITPUNKT 3

3.66 t3h_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3h_RW

Label: t3 SET Handlungssequenzen Rohwert

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3h_RW	269	7.84	2.83	1.0	12.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

3 SET TESTZEITPUNKT 3

3.67 t3s_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3s_RW

Label: t3 SET Satzbildung Rohwert

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3s_RW	267	6.60	3.47	0.0	12.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

3 SET TESTZEITPUNKT 3

3.68 t3pr_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3pr_RW

Label: t3 SET Singular-Plural Reale Woerter Rohwert

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3pr_RW	269	7.51	2.19	0.0	9.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

3 SET TESTZEITPUNKT 3

3.69 t3pp_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3pp_RW

Label: t3 SET Singular-Plural Pseudo-Woerter Rohwert

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3pp_RW	268	4.20	2.37	0.0	9.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

3 SET TESTZEITPUNKT 3

3.70 t3bg_01

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3bg_01

Label: t3 SET Bildergeschichte Bewertung Artikel 0/1 kodiert wie im Manual

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3bg_01	268	0.94	0.24	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

3 SET TESTZEITPUNKT 3

3.71 t3bg_02

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3bg_02

Label: t3 SET Bildergeschichte Bewertung Wortbeugung 0-1 kodiert wie im Manual

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3bg_02	258	0.79	0.40	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

3 SET TESTZEITPUNKT 3

3.72 t3bg_03

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3bg_03

Label: t3 SET Bildergeschichte Bewertung Verben 0-1 kodiert wie im Manual

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3bg_03	268	0.98	0.15	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

3 SET TESTZEITPUNKT 3

3.73 t3bg_04

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3bg_04

Label: t3 SET Bildergeschichte Bewertung Pronomina 0-1 kodiert wie im Manual

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3bg_04	247	0.69	0.46	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

3 SET TESTZEITPUNKT 3

3.74 t3bg_05

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3bg_05

Label: t3 SET Bildergeschichte Bewertung Bezeichnungen 0-1 kodiert wie im Manual

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3bg_05	267	1.00	0.00	1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

3 SET TESTZEITPUNKT 3

3.75 t3bg_RWm

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3bg_RWm

Label: t3 SET Rohwert laut Manual auf Basis von 0-1 Kodierung

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3bg_RWm	240	7.17	1.08	3.0	8.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

3 SET TESTZEITPUNKT 3

3.76 t3bg_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3bg_RW

Label: t3 SET Rohwert auf Basis von 0-2 Kodierung

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3bg_RW	240	10.99	1.79	4.0	13.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

3 SET TESTZEITPUNKT 3

3.77 t3SETagem

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SETagem

Label: t3 SET Alter bei Testung

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3SETagem	269	83.36	3.85	75.0	94.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

3 SET TESTZEITPUNKT 3

3.78 t3SETNagem

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SETNagem

Label: t3 SET Alter bei Nachtestung

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3SETNagem	7	84.29	5.28	79.0	94.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

3 SET TESTZEITPUNKT 3

3.79 t3SET_Ngr

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SET_Ngr

Label: t3 SET Normgruppen

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 1 = 5;0-5;5 Jahre; 2 = 5;6-5;11 Jahre; 3 = 6;0-6;11 Jahre; 4 = 7;0-7;11 Jahre;
5 = 8;0-8;11 Jahre

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3SET_Ngr	269	3.48	0.50

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	5;0-5;5 Jahre	0.0	0.0
2	5;6-5;11 Jahre	0.0	0.0
3	6;0-6;11 Jahre	51.7	45.6
4	7;0-7;11 Jahre	48.3	42.6
5	8;0-8;11 Jahre	0.0	0.0
-999	missing	–	11.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 269$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

3 SET TESTZEITPUNKT 3

3.80 t3SET_NNgr

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3SET_NNgr

Label: t3 SET Normgruppen Nachtestung

Quelle: Petermann, 2016

Kategorien: 1 = 5;0-5;5 Jahre; 2 = 5;6-5;11 Jahre; 3 = 6;0-6;11 Jahre; 4 = 7;0-7;11 Jahre;
5 = 8;0-8;11 Jahre

Fehlende Werte: -999 = missing

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t3SET_NNgr	7	3.43	0.53

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	5;0-5;5 Jahre	0.0	0.0
2	5;6-5;11 Jahre	0.0	0.0
3	6;0-6;11 Jahre	57.1	1.3
4	7;0-7;11 Jahre	42.9	1.0
5	8;0-8;11 Jahre	0.0	0.0
-999	missing	–	97.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 7$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

V SET

3 SET TESTZEITPUNKT 3

3.81 t3sp_sum

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sp_sum

Label: t3 SET Singular-Plural Gesamtrohwert

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sp_sum	268	11.74	3.91	0.0	18.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

3 SET TESTZEITPUNKT 3

3.82 t3h_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3h_T

Label: t3 SET Handlungssequenzen Normwert

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3h_T	269	47.92	13.75	26.0	80.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

3 SET TESTZEITPUNKT 3

3.83 t3s_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3s_T

Label: t3 SET Satzbildung Normwert

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3s_T	267	45.26	10.74	28.0	80.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

3 SET TESTZEITPUNKT 3

3.84 t3sp_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3sp_T

Label: t3 SET Singular-Plural Normwert

Quelle: Petermann, 2016

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t3sp_T	268	50.19	11.62	24.0	80.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

V SET

3 SET TESTZEITPUNKT 3

3.85 t3bg_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t3bg_T

Label: t3 SET Bildergeschichte Normwert

Quelle: Petermann, 2016

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t3bg_T	305	-164.74	435.21	-999.0	80.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

VI Testdatensatz

1 T4 ELFE

1.1 Code

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: Code

Label: Versuchspersonennummer

VI TESTDATENSATZ

1 T4 ELFE

1.2 t4elf_dat

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elf_dat

Label: t4 ELFE Testdatum

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

1.3 t4_Schulbeginn

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4_Schulbeginn

Label: t4 Datum der Einschulung

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
	(kein Label vergeben)	14.4	14.4
2017-08-12	(kein Label vergeben)	70.2	70.2
2018-08-07	(kein Label vergeben)	15.4	15.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.4 t4elfe2_Bemerk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_Bemerk

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis:Bemerkungen

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

1.5 t4elfe3_Bemerk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe3_Bemerk

Label: t4 ELFE Textverstaendnis:Bemerkungen

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

1.6 t4elfe2_vorhanden

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_vorhanden

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis vorhanden?

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4elfe2_vorhanden	261	0.96	0.19	0.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 305$.

1.7 t4elfe3_vorhanden

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe3_vorhanden

Label: t4 ELFE Textverstaendnis vorhanden?

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4elfe3_vorhanden	260	0.96	0.20	0.0	1.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

VI TESTDATENSATZ

1 T4 ELFE

1.8 t4elfe2_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_1

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 1

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_1	247	0.87	0.33	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

VI TESTDATENSATZ

1 T4 ELFE

1.9 t4elfe2_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_2

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 2

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_2	238	0.86	0.35	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.10 t4elfe2_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_3

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 3

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_3	217	0.83	0.38	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.11 t4elfe2_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_4

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 4

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_4	203	0.75	0.43	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.12 t4elfe2_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_5

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 5

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_5	168	0.79	0.41	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.13 t4elfe2_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_6

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 6

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_6	150	0.73	0.44	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.14 t4elfe2_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_7

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 7

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_7	130	0.87	0.34	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.15 t4elfe2_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_8

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 8

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_8	118	0.70	0.46	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.16 t4elfe2_9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_9

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 9

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_9	95	0.81	0.39	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.17 t4elfe2_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_10

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 10

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_10	69	0.57	0.50	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.18 t4elfe2_11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_11

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 11

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_11	56	0.75	0.44	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.19 t4elfe2_12

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_12

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 12

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_12	47	0.68	0.47	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.20 t4elfe2_13

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_13

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 13

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_13	35	0.74	0.44	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.21 t4elfe2_14

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_14

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 14

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_14	28	0.71	0.46	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.22 t4elfe2_15

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_15

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 15

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_15	23	0.70	0.47	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.23 t4elfe2_16

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_16

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 16

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_16	18	0.44	0.51	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.24 t4elfe2_17

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_17

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 17

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_17	15	0.53	0.52	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.25 t4elfe2_18

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_18

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 18

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_18	12	0.42	0.51	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.26 t4elfe2_19

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_19

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 19

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_19	10	0.30	0.48	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.27 t4elfe2_20

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_20

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 20

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_20	7	0.00	0.00	0.0	0.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.28 t4elfe2_21

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_21

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 21

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_21	6	0.00	0.00	0.0	0.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.29 t4elfe2_22

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_22

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 22

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_22	5	0.20	0.45	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.30 t4elfe2_23

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_23

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 23

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_23	5	0.20	0.45	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.31 t4elfe2_24

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_24

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 24

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_24	5	0.00	0.00	0.0	0.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.32 t4elfe2_25

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_25

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 25

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_25	4	0.25	0.50	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.33 t4elfe2_26

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_26

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 26

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_26	3	0.00	0.00	0.0	0.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.34 t4elfe2_27

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_27

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 27

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_27	3	0.00	0.00	0.0	0.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.35 t4elfe2_28

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_28

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 28

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_28	3	0.00	0.00	0.0	0.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.36 t4elfe2_29

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_29

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 29

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_29	3	0.67	0.58	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.37 t4elfe2_30

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_30

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 30

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_30	2	0.00	0.00	0.0	0.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.38 t4elfe2_31

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_31

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 31

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_31	3	0.00	0.00	0.0	0.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.39 t4elfe2_32

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_32

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 32

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_32	3	0.00	0.00	0.0	0.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.40 t4elfe2_33

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_33

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 33

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_33	1	0.00	NA	0.0	0.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.41 t4elfe2_34

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_34

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 34

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_34	1	0.00	NA	0.0	0.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.42 t4elfe2_35

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_35

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 35

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_35	2	0.00	0.00	0.0	0.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.43 t4elfe2_36

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe2_36

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Item 36

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe2_36	2	0.50	0.71	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.44 t4elfe3_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe3_1

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Item 1

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe3_1	244	0.74	0.44	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.45 t4elfe3_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe3_2

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Item 2

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe3_2	230	0.52	0.50	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.46 t4elfe3_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe3_3

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Item 3

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe3_3	194	0.54	0.50	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.47 t4elfe3_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe3_4

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Item 4

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe3_4	160	0.47	0.50	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.48 t4elfe3_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe3_5

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Item 5

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe3_5	136	0.49	0.50	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.49 t4elfe3_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe3_6

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Item 6

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe3_6	109	0.50	0.50	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.50 t4elfe3_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe3_7

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Item 7

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe3_7	103	0.58	0.50	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.51 t4elfe3_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe3_8

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Item 8

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe3_8	70	0.53	0.50	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.52 t4elfe3_9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe3_9

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Item 9

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe3_9	52	0.46	0.50	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.53 t4elfe3_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe3_10

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Item 10

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe3_10	51	0.49	0.50	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.54 t4elfe3_11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe3_11

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Item 11

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe3_11	43	0.47	0.50	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.55 t4elfe3_12

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe3_12

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Item 12

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe3_12	38	0.34	0.48	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.56 t4elfe3_13

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe3_13

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Item 13

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe3_13	24	0.46	0.51	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.57 t4elfe3_14

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe3_14

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Item 14

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe3_14	20	0.35	0.49	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.58 t4elfe3_15

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe3_15

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Item 15

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe3_15	22	0.36	0.49	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.59 t4elfe3_16

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe3_16

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Item 16

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe3_16	16	0.31	0.48	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.60 t4elfe3_17

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe3_17

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Item 17

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe3_17	15	0.27	0.46	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.61 t4elfe3_18

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe3_18

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Item 18

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe3_18	15	0.07	0.26	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.62 t4elfe3_19

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe3_19

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Item 19

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe3_19	16	0.19	0.40	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.63 t4elfe3_20

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe3_20

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Item 20

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe3_20	14	0.07	0.27	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.64 t4elfe3_21

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe3_21

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Item 21

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe3_21	14	0.14	0.36	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.65 t4elfe3_22

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe3_22

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Item 22

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe3_22	14	0.21	0.43	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.66 t4elfe3_23

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe3_23

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Item 23

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe3_23	11	0.18	0.40	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.67 t4elfe3_24

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe3_24

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Item 24

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe3_24	11	0.18	0.40	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.68 t4elfe3_25

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe3_25

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Item 25

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe3_25	11	0.18	0.40	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.69 t4elfe3_26

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfe3_26

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Item 26

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfe3_26	10	0.10	0.32	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.70 t4elf2rw_pc

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elf2rw_pc

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Rohwert

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elf2rw_pc	261	5.65	4.11	0.0	19.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.71 t4elf3rw_pc

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elf3rw_pc

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Rohwert

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elf3rw_pc	260	3.21	3.04	0.0	13.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.72 t4elfM

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfM

Label: t4 ELFE Anzahl Schulmonate bis Testung

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4elfM	261	9.35	0.71	9.0	12.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

1.73 t4elfNgr_Rueck

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfNgr_Rueck

Label: t4 ELFE Normgruppe (bestimmt anhand der Schulmonate; 13er Kinder erhalten 10er Schulmonat)

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfNgr_Rueck	214	1.00	0.00	1.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.74 t4elfNgr

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elfNgr

Label: t4 ELFE Normgruppe

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elfNgr	261	1.05	0.21	1.0	2.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.75 t4elf2rt

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elf2rt

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis T-Wert richtig bearbeitete Items

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elf2rt	261	47.04	10.06	29.0	73.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.76 t4elf3rt

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elf3rt

Label: t4 ELFE Textverstaendnis T-Wert richtig bearbeitete Items

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elf3rt	260	45.57	11.31	25.0	72.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

VI TESTDATENSATZ

1 T4 ELFE

1.77 t4elf2bt

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elf2bt
 Label: t4 ELFE Satzverstaendnis T-Wert bearbeitete Items
 Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4elf2bt	261	48.03	11.30	25.0	76.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

1.78 t4elf3bt

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elf3bt

Label: t4 ELFE Textverstaendnis T-Wert bearbeitete Items

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4elf3bt	261	48.19	9.34	25.0	74.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

1.79 t4elf2miss

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elf2miss

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Anzahl nicht bearbeiteter Items

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elf2miss	305	29.65	5.65	1.0	36.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.80 t4elf3miss

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elf3miss

Label: t4 ELFE Textverstaenndis Anzahl nicht bearbeiteter Items

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elf3miss	305	20.61	5.46	0.0	26.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.81 t4elf2bi

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elf2bi
 Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Anzahl bearbeiteter Items
 Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4elf2bi	261	7.42	5.42	0.0	35.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 305$.

1.82 t4elf3bi

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elf3bi
 Label: t4 ELFE Textverstaendnis Anzahl bearbeitete Items
 Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4elf3bi	261	6.30	5.39	0.0	26.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 305$.

1.83 t4elf2RWsK

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elf2RWsK

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Individueller Cut-Off Ratewahrscheinlichkeit

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4elf2RWsK	261	1.48	1.08	0.0	7.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 305$.

1.84 t4elf3RWsK

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elf3RWsK

Label: t4 ELFE Textverstaenndis Individueller Cut-Off Ratewahrscheinlichkeit

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4elf3RWsK	261	1.57	1.35	0.0	6.5

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 $N_{total} = 305$.

1.85 t4elf2RWs

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elf2RWs

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Auffaelligkeit in Ratewahrscheinlichkeit

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elf2RWs	261	0.02	0.14	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.86 t4elf3RWs

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elf3RWs

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Auffaelligkeit in Ratewahrscheinlichkeit

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elf3RWs	260	0.04	0.20	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.87 t4elf2rp

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elf2rp

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Prozentrang richtig bearbeitete Items

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elf2rp	261	41.18	29.12	1.8	98.9

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.88 t4elf3rp

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elf3rp

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Prozentrang richtig bearbeitete Items

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elf3rp	260	38.40	30.52	0.6	97.7

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.89 t4elf2bp

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elf2bp

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Prozentrang bearbeitete Items

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elf2bp	261	44.26	31.06	0.6	99.5

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.90 t4elf3bp

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4elf3bp

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Prozentrang bearbeitete Items

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4elf3bp	261	43.79	25.07	0.6	99.2

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.91 t4Diff23

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4Diff23

Label: t4 ELFE T-Wert-Differenz Diskrepanzvergleich Satz - Text

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4Diff23	260	1.50	8.21	-23.0	28.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.92 t4Diff23Vz

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4Diff23Vz

Label: t4 ELFE T-Wert-Differenz Diskrepanzvergleich Satz - Text nur Betrag (nur positive Vorzeichen)

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4Diff23Vz	260	6.23	5.54	0.0	28.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

1.93 t4Dis10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4Dis10

Label: t4 ELFE Diskrepanzvergleich Satz - Text Signifikanz auf .10-Niveau

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Kategorien: 0 = *ns. auf .10-Niveau*; 1 = *signifikant auf .10-Niveau*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t4Dis10	260	0.28	0.45

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	ns. auf .10-Niveau	71.5	61.0
1	signifikant auf .10-Niveau	28.5	24.3
-999	missing	–	14.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 260$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.94 t4Dis05

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4Dis05
 Label: t4 ELFE Diskrepanzvergleich Satz - Text Signifikanz auf .05-Niveau
 Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018
 Kategorien: 0 = *ns. auf .05-Niveau*; 1 = *signifikant auf .05-Niveau*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t4Dis05	260	0.16	0.37

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	ns. auf .05-Niveau	83.8	71.5
1	signifikant auf .05-Niveau	16.2	13.8
-999	missing	–	14.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 260$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.95 t4DisGR

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4DisGR
 Label: t4 ELFE Diskrepanzvergleich Satz - Text Vergleich mit Grundrate
 Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018
 Kategorien: 0 = *unauffaellig*; 1 = *Satz < Text Grundrate 5-10%*; 2 = *Satz > Text Grundrate 5-10%*; 3 = *Satz < Text Grundrate < 5%*; 4 = *Satz > Text Grundrate < 5%*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t4DisGR	260	0.49	1.20

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unauffaellig	83.8	71.5
1	Satz < Text Grundrate 5-10%	1.5	1.3
2	Satz > Text Grundrate 5-10%	4.6	3.9
3	Satz < Text Grundrate < 5%	1.9	1.6
4	Satz > Text Grundrate < 5%	8.1	6.9
-999	missing	–	14.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 260$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.96 t4Diff2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4Diff2

Label: t4 ELFE T-Wert-Differenz Satzverstaendnis Bearbeitet - Richtig

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4Diff2	261	0.99	6.64	-5.0	32.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

1.97 t4Diff3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4Diff3

Label: t4 ELFE T-Wert-Differenz Textverstaendnis Bearbeitet - Richtig

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4Diff3	260	2.71	10.16	-12.0	45.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

1.98 t4AS2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4AS2
 Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Arbeitsstil Vergleich mit Grundrate
 Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018
 Kategorien: 0 = *unauffaellig*; 1 = *Satz Arbeitsstil „genau“ Bearbeitet < Richtig Grundrate 5-10%*; 2 = *Satz Arbeitsstil „ungenau“ Bearbeitet > Richtig Grundrate 5-10%*; 3 = *Satz Arbeitsstil „genau“ Bearbeitet < Richtig Grundrate < 5%*; 4 = *Satz Arbeitsstil „ungenau“ Bearbeitet > Richtig Grundrate < 5%*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t4AS2	261	0.97	1.35

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unauffaellig	55.2	47.2
1	Satz Arbeitsstil „genau“ Bearbeitet < Richtig Grundrate 5-10%	21.1	18.0
2	Satz Arbeitsstil „ungenau“ Bearbeitet > Richtig Grundrate 5-10%	4.6	3.9
3	Satz Arbeitsstil „genau“ Bearbeitet < Richtig Grundrate < 5%	10.3	8.9
4	Satz Arbeitsstil „ungenau“ Bearbeitet > Richtig Grundrate < 5%	8.8	7.5
-999	missing	–	14.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 261$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.99 t4AS3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4AS3
 Label: t4 ELFE Textverstaendnis Arbeitsstil Vergleich mit Grundrate
 Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018
 Kategorien: 0 = *unauffaellig*; 1 = *Text Arbeitsstil „genau“Bearbeitet < Richtig Grundrate 5-10%*; 2 = *Text Arbeitsstil „ungenau“Bearbeitet > Richtig Grundrate 5-10%*; 3 = *Text Arbeitsstil „genau“Bearbeitet < Richtig Grundrate < 5%*; 4 = *Text Arbeitsstil „ungenau“Bearbeitet > Richtig Grundrate < 5%*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t4AS3	260	0.68	1.34

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung]Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unauffaellig	76.2	64.9
1	Text Arbeitsstil „genau“Bearbeitet < Richtig Grundrate 5-10%	3.8	3.3
2	Text Arbeitsstil „ungenau“Bearbeitet > Richtig Grundrate 5-10%	6.5	5.6
3	Text Arbeitsstil „genau“Bearbeitet < Richtig Grundrate < 5%	3.1	2.6
4	Text Arbeitsstil „ungenau“Bearbeitet > Richtig Grundrate < 5%	10.4	8.9
-999	missing	–	14.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 260$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.100 t4AS2d10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4AS2d10

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Arbeitsstil Dummy mit Grundrate 0-10%

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Kategorien: 0 = *unauffaellig*; 1 = *Satz Arbeitsstil „genau“*; 2 = *Satz Arbeitsstil „ungenau“*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t4AS2d10	261	0.58	0.72

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unauffaellig	55.2	47.2
1	Satz Arbeitsstil „genau“	31.4	26.9
2	Satz Arbeitsstil „ungenau“	13.4	11.5
-999	missing	–	14.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 261$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.101 t4AS3d10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4AS3d10

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Arbeitsstil Dummy mit Grundrate 0-10%

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Kategorien: 0 = *unauffaellig*; 1 = *Text Arbeitsstil „genau“*; 2 = *Text Arbeitsstil „ungenau“*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t4AS3d10	260	0.41	0.76

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unauffaellig	76.2	64.9
1	Text Arbeitsstil „genau“	6.9	5.9
2	Text Arbeitsstil „ungenau“	16.9	14.4
-999	missing	–	14.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 260$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.102 t4AS2d05

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4AS2d05

Label: t4 ELFE Satzverstaendnis Arbeitsstil Dummy mit Grundrate <5%

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Kategorien: 0 = *unauffaellig*; 1 = *Satz Arbeitsstil „genau“*; 2 = *Satz Arbeitsstil „ungenau“*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t4AS2d05	261	0.28	0.62

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unauffaellig	80.8	69.2
1	Satz Arbeitsstil „genau“	10.3	8.9
2	Satz Arbeitsstil „ungenau“	8.8	7.5
-999	missing	–	14.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 261$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

1.103 t4AS3d05

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4AS3d05

Label: t4 ELFE Textverstaendnis Arbeitsstil Dummy mit Grundrate <5%

Quelle: Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W., 2018

Kategorien: 0 = *unauffaellig*; 1 = *Text Arbeitsstil „genau“*; 2 = *Text Arbeitsstil „ungenau“*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t4AS3d05	260	0.24	0.63

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	unauffaellig	86.5	73.8
1	Text Arbeitsstil „genau“	3.1	2.6
2	Text Arbeitsstil „ungenau“	10.4	8.9
-999	missing	–	14.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 260$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2 T4 WURT

2.1 t4wurt_dat

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt_dat

Label: t4 WURT Datum

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

2.2 t4wurt_Bemerk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt_Bemerk
Label: t4 WURT 1-2 Bemerkungen
Variablentyp: Zeichenfolge
Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

2.3 t4wurt_vorhanden

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt_vorhanden
 Label: t4 WURT vorhanden
 Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014
 Kategorien: 1 = *vorhanden*;
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	vorhanden	100.0	83.0
-999	missing	–	17.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 253$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.4 t4wurt1_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt1_1

Label: t4 WURT Diktat 1 „Auf der Wiese“ Item 1 „Bach“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt1_1	253	0.67	0.47	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.5 t4wurt1_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt1_2

Label: t4 WURT Diktat 1 „Auf der Wiese“ Item 2 „spielen“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt1_2	253	0.30	0.46	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.6 t4wurt1_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt1_3

Label: t4 WURT Diktat 1 „Auf der Wiese“ Item 3 „bunte“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt1_3	253	0.66	0.47	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.7 t4wurt1_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt1_4

Label: t4 WURT Diktat 1 „Auf der Wiese“ Item 4 „Biene“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt1_4	253	0.28	0.45	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.8 t4wurt1_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt1_5

Label: t4 WURT Diktat 1 „Auf der Wiese“ Item 5 „Ohren“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt1_5	253	0.12	0.32	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 305.

2.9 t4wurt1_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt1_6

Label: t4 WURT Diktat 1 „Auf der Wiese“ Item 6 „kleine“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt1_6	253	0.69	0.46	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.10 t4wurt1_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt1_7

Label: t4 WURT Diktat 1 „Auf der Wiese“ Item 7 „Heute“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt1_7	253	0.62	0.49	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.11 t4wurt1_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt1_8

Label: t4 WURT Diktat 1 „Auf der Wiese“ Item 8 „bleiben“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt1_8	253	0.72	0.45	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.12 t4wurt1_9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt1_9

Label: t4 WURT Diktat 1 „Auf der Wiese“ Item 9 „gute“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt1_9	253	0.80	0.40	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.13 t4wurt1_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt1_RW

Label: t4 WURT Diktat 1 „Auf der Wiese“ Summe richtig geschriebener Woerter

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt1_RW	253	4.85	2.39	0.0	9.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.14 t4wurt2_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt2_1

Label: t4 WURT Diktat 2 „Im Krankenhaus“ Item 1 „Jahre“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt2_1	253	0.09	0.29	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.15 t4wurt2_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt2_2

Label: t4 WURT Diktat 2 „Im Krankenhaus“ Item 2 „seinen“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt2_2	253	0.69	0.46	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.16 t4wurt2_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt2_3

Label: t4 WURT Diktat 2 „Im Krankenhaus“ Item 3 „Vater“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt2_3	253	0.11	0.32	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 305.

2.17 t4wurt2_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt2_4

Label: t4 WURT Diktat 2 „Im Krankenhaus“ Item 4 „Ruecken“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt2_4	253	0.02	0.15	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.18 t4wurt2_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt2_5

Label: t4 WURT Diktat 2 „Im Krankenhaus“ Item 5 „Junge“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt2_5	253	0.47	0.50	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.19 t4wurt2_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt2_6

Label: t4 WURT Diktat 2 „Im Krankenhaus“ Item 6 „Fuss“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt2_6	253	0.28	0.45	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.20 t4wurt2_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt2_7

Label: t4 WURT Diktat 2 „Im Krankenhaus“ Item 7 „weint“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt2_7	253	0.61	0.49	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.21 t4wurt2_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt2_8

Label: t4 WURT Diktat 2 „Im Krankenhaus“ Item 8 „bewegen“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt2_8	253	0.61	0.49	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.22 t4wurt2_9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt2_9

Label: t4 WURT Diktat 2 „Im Krankenhaus“ Item 9 „hilft“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt2_9	253	0.53	0.50	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 305.

2.23 t4wurt2_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt2_10

Label: t4 WURT Diktat 2 „Im Krankenhaus“ Item 10 „alle“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt2_10	253	0.36	0.48	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 305.

2.24 t4wurt2_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt2_RW

Label: t4 WURT Diktat 2 „Im Krankenhaus“ Summe richtig geschriebener Woerter

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt2_RW	253	3.80	2.24	0.0	9.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.25 t4wurt3_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt3_1

Label: t4 WURT Diktat 3 „Im Park“ Item 1 „sehen“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt3_1	253	0.47	0.50	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.26 t4wurt3_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt3_2

Label: t4 WURT Diktat 3 „Im Park“ Item 2 „hoert“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt3_2	253	0.54	0.50	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.27 t4wurt3_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt3_3

Label: t4 WURT Diktat 3 „Im Park“ Item 3 „fragt“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt3_3	253	0.28	0.45	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.28 t4wurt3_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt3_4

Label: t4 WURT Diktat 3 „Im Park“ Item 4 „antwortet“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt3_4	253	0.38	0.49	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.29 t4wurt3_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt3_5

Label: t4 WURT Diktat 3 „Im Park“ Item 5 „drei“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt3_5	253	0.57	0.50	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.30 t4wurt3_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt3_6

Label: t4 WURT Diktat 3 „Im Park“ Item 6 „zwoelf“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt3_6	253	0.50	0.50	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.31 t4wurt3_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt3_7

Label: t4 WURT Diktat 3 „Im Park“ Item 7 „schlaeft“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt3_7	253	0.21	0.41	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 305.

2.32 t4wurt3_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt3_8

Label: t4 WURT Diktat 3 „Im Park“ Item 8 „wuenscht“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt3_8	253	0.24	0.43	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.33 t4wurt3_9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt3_9

Label: t4 WURT Diktat 3 „Im Park“ Item 9 „pfelgen“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt3_9	253	0.21	0.40	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.34 t4wurt3_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt3_RW

Label: t4 WURT Diktat 3 „Im Park“ Summe richtig geschriebener Woerter

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt3_RW	253	3.40	2.33	0.0	9.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.35 t4wurt4_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt4_1

Label: t4 WURT Diktat 4 „Im Freien“ Item 1 „arbeitet“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt4_1	253	0.13	0.34	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.36 t4wurt4_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt4_2

Label: t4 WURT Diktat 4 „Im Freien“ Item 2 „frischen“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt4_2	253	0.26	0.44	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.37 t4wurt4_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt4_3

Label: t4 WURT Diktat 4 „Im Freien“ Item 3 „gesund“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt4_3	253	0.23	0.42	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.38 t4wurt4_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt4_4

Label: t4 WURT Diktat 4 „Im Freien“ Item 4 „Garten“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt4_4	253	0.33	0.47	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.39 t4wurt4_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt4_5

Label: t4 WURT Diktat 4 „Im Freien“ Item 5 „pflanzte“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt4_5	253	0.10	0.30	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.40 t4wurt4_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt4_6

Label: t4 WURT Diktat 4 „Im Freien“ Item 6 „bluehen“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt4_6	253	0.20	0.40	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.41 t4wurt4_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt4_7

Label: t4 WURT Diktat 4 „Im Freien“ Item 7 „braunen“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt4_7	253	0.61	0.49	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.42 t4wurt4_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt4_8

Label: t4 WURT Diktat 4 „Im Freien“ Item 8 „Gemuese“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt4_8	253	0.60	0.49	0.0	1.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.43 t4wurt4_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt4_RW

Label: t4 WURT Diktat 4 „Im Freien“ Summe richtig geschriebener Woerter

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt4_RW	253	2.46	1.79	0.0	7.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.

N_{total} = 305.

2.44 t4wurt_ZrW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt_ZrW

Label: t4 WURT Rohwert aller richtig geschrieben Woerter

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt_ZrW	253	14.51	7.63	0.0	32.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.45 t4wurt_ZrW_PR

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt_ZrW_PR
 Label: t4 WURT Prozentrang aller richtig geschrieben Woerter
 Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt_ZrW_PR	253	33.39	24.07	1.0	96.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.46 t4wurt_ZrW_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt_ZrW_T

Label: t4 WURT T-Wert aller richtig geschrieben Woerter

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt_ZrW_T	253	44.28	8.59	25.0	67.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.47 t4wurt_A

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt_A

Label: t4 WURT Anzahl „Auslassung eines Lautes“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt_A	253	8.66	6.92	0.0	47.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.48 t4wurt_H

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt_H

Label: t4 WURT Anzahl „Hinzufuegung eines Lautes“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt_H	253	1.22	1.53	0.0	13.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.49 t4wurt_LV

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt_LV
 Label: t4 WURT Anzahl „Lautverwechslung“
 Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt_LV	253	6.55	4.85	0.0	27.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.50 t4wurt_U

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt_U
 Label: t4 WURT Anzahl „Umstellung“
 Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt_U	253	0.76	1.27	0.0	9.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.51 t4wurt_SW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt_SW

Label: t4 WURT Anzahl „Starke Wortbildveraenderung“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt_SW	253	0.72	2.60	0.0	20.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.52 t4wurt_GK

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt_GK

Label: t4 WURT Anzahl „Verstoesse gegen Gross- und Kleinschreibung“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt_GK	251	18.44	6.47	1.0	35.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.53 t4wurt_LF

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt_LF

Label: t4 WURT Anzahl „Lautgetreu aber falsch“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt_LF	253	11.82	4.44	2.0	26.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.54 t4wurt_AW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt_AW

Label: t4 WURT Anzahl „Auslassung eines ganzen Wortes“

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt_AW	253	0.64	1.94	0.0	16.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.55 t4wurt_R

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt_R
 Label: t4 WURT Anzahl „Restfehler“
 Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt_R	253	0.02	0.15	0.0	2.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.56 t4wurt_AFoer

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt_AFoer

Label: t4 WURT Foerderbedarf „Auslassung eines Lautes“ (Cut-off = 9)

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t4wurt_AFoer	253	0.35	0.48

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	65.2	54.1
1	Foerderbedarf	34.8	28.9
-999	missing	–	17.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 253$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.57 t4wurt_HFoer

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt_HFoer

Label: t4 WURT Foerderbedarf „Hinzufuegung eines Lautes“ (Cut-off = 3)

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t4wurt_HFoer	253	0.13	0.34

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	87.0	72.1
1	Foerderbedarf	13.0	10.8
-999	missing	–	17.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 253$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.58 t4wurt_LVFoer

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt_LVFoer
 Label: t4 WURT Foerderbedarf „Lautverwechslung“ (Cut-off = 10)
 Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014
 Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t4wurt_LVFoer	253	0.25	0.43

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	75.1	62.3
1	Foerderbedarf	24.9	20.7
-999	missing	–	17.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 253$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.59 t4wurt_UFoer

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt_UFoer
 Label: t4 WURT Foerderbedarf „Umstellung“ (Cut-off = 3)
 Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014
 Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t4wurt_UFoer	253	0.08	0.26

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	92.5	76.7
1	Foerderbedarf	7.5	6.2
-999	missing	–	17.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 253$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.60 t4wurt_LfFoer

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt_LfFoer

Label: t4 WURT Foerderbedarf „Lautgetreu aber falsch“ (Cut-off = 11)

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t4wurt_LfFoer	253	0.62	0.49

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	37.9	31.5
1	Foerderbedarf	62.1	51.5
-999	missing	–	17.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 253$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.61 t4wurt_group

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt_group

Label: t4 WURT Gruppe Foerderbedarf (T-Wert und Fehler-Foerderbedarfe min. 3 von 5

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Kategorien: 0 = *kein Foerderbedarf*; 1 = *Foerderbedarf*Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t4wurt_group	253	0.15	0.36

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	kein Foerderbedarf	84.6	70.2
1	Foerderbedarf	15.4	12.8
-999	missing	–	17.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 253$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

2.62 t4wurtMi

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurtMi

Label: t4 WURT Anzahl richtig geschriebener Mitsprechwoerter

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4wurtMi	253	6.27	3.27	0.0	13.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

2.63 t4wurtMe

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurtMe

Label: t4 WURT Anzahl richtig geschriebener Merkwoerter

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4wurtMe	253	2.96	2.59	0.0	12.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

2.64 t4wurtNa

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurtNa

Label: t4 WURT Anzahl richtig geschriebener Nachdenkwoerter

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4wurtNa	253	5.28	2.79	0.0	10.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

2.65 t4wurt_ZrW_TB

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt_ZrW_TB

Label: t4 WURT T-Wert-Band aller richtig geschrieben Woerter

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt_ZrW_TB	305	NA	NA	-999,00	62 - 72

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.66 t4wurt1_ABI

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt1_ABI

Label: t4 WURT Diktat 1 Anzahl bearbeiteter Items (max. 9)

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt1_ABI	253	9.00	0.00	9.0	9.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.67 t4wurt2_ABI

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt2_ABI

Label: t4 WURT Diktat 2 Anzahl bearbeiteter Items (max.10)

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt2_ABI	253	10.00	0.00	10.0	10.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.68 t4wurt3_ABI

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt3_ABI

Label: t4 WURT Diktat 3 Anzahl bearbeiteter Items (max. 8)

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt3_ABI	253	9.00	0.00	9.0	9.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.69 t4wurt4_ABI

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt4_ABI

Label: t4 WURT Diktat 4 Anzahl bearbeiteter Items (max. 9)

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt4_ABI	253	8.00	0.00	8.0	8.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.70 t4wurt_ABI

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt_ABI

Label: t4 WURT Gesamt Anzahl bearbeiteter Items (max. 36)

Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt_ABI	253	36.00	0.00	36.0	36.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.71 t4wurt1_miss

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt1_miss
 Label: t4 WURT Diktat 1 Anzahl Missings
 Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt1_miss	305	1.53	3.39	0.0	9.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.72 t4wurt2_miss

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt2_miss
 Label: t4 WURT Diktat 2 Anzahl Missings
 Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt2_miss	305	1.70	3.77	0.0	10.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.73 t4wurt3_miss

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt3_miss
 Label: t4 WURT Diktat 3 Anzahl Missings
 Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt3_miss	305	1.53	3.39	0.0	9.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.74 t4wurt4_miss

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt4_miss
 Label: t4 WURT Diktat 4 Anzahl Missings
 Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt4_miss	305	1.36	3.01	0.0	8.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

2.75 t4wurt_miss

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4wurt_miss
 Label: t4 WURT Gesamt Anzahl Missings
 Quelle: Trolldenier, H.-P. 2014
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4wurt_miss	305	6.14	13.56	0.0	36.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3 T4 NFC

3.1 t4nfc_testdat

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4nfc_testdat

Label: t4 NFC Testdatum

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Preckel & Strobel, 2017

3.2 t4nfc_Bemerk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4nfc_Bemerk
Label: t4 Need for Cognition (NFC) Bemerkung
Variablentyp: Zeichenfolge
Quelle: Preckel & Strobel, 2017

3.3 t4nfc_1

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4nfc_1
 Label: t4 NFC Variable 1: Loesungen fuer Probleme
 Quelle: Preckel & Strobel, 2017
 Kategorien: 1 = *trauriger Smiley*; 2 = *neutraler Smiley*; 3 = *lachender Smiley*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t4nfc_1	262	2.27	0.77

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	trauriger Smiley	19.8	17.0
2	neutraler Smiley	33.6	28.9
3	lachender Smiley	46.6	40.0
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.4 t4nfc_2

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4nfc_2
 Label: t4 NFC Variable 2: nachdenken macht Spass
 Quelle: Preckel & Strobel, 2017
 Kategorien: 1 = *trauriger Smiley*; 2 = *neutraler Smiley*; 3 = *lachender Smiley*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t4nfc_2	261	1.93	0.82

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	trauriger Smiley	37.2	31.8
2	neutraler Smiley	32.6	27.9
3	lachender Smiley	30.3	25.9
-999	missing	–	14.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 261$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.5 t4nfc_3

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4nfc_3
 Label: t4 NFC Variable 3: denken bis verstanden
 Quelle: Preckel & Strobel, 2017
 Kategorien: 1 = *trauriger Smiley*; 2 = *neutraler Smiley*; 3 = *lachender Smiley*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t4nfc_3	262	2.08	0.86

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	trauriger Smiley	32.8	28.2
2	neutraler Smiley	26.3	22.6
3	lachender Smiley	40.8	35.1
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.6 t4nfc_4

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4nfc_4
 Label: t4 NFC Variable 4: loesen kniffliger Aufgaben
 Quelle: Preckel & Strobel, 2017
 Kategorien: 1 = *trauriger Smiley*; 2 = *neutraler Smiley*; 3 = *lachender Smiley*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t4nfc_4	262	2.26	0.83

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	trauriger Smiley	24.4	21.0
2	neutraler Smiley	24.8	21.3
3	lachender Smiley	50.8	43.6
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.7 t4nfc_5

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4nfc_5
 Label: t4 NFC Variable 5: Schule genau verstehen
 Quelle: Preckel & Strobel, 2017
 Kategorien: 1 = *trauriger Smiley*; 2 = *neutraler Smiley*; 3 = *lachender Smiley*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t4nfc_5	261	2.75	0.58

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	trauriger Smiley	7.3	6.2
2	neutraler Smiley	10.3	8.9
3	lachender Smiley	82.4	70.5
-999	missing	–	14.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 261$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.8 t4nfc_6

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4nfc_6
 Label: t4 NFC Variable 6: Kopf anstrengen Hausaufgaben
 Quelle: Preckel & Strobel, 2017
 Kategorien: 1 = *trauriger Smiley*; 2 = *neutraler Smiley*; 3 = *lachender Smiley*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t4nfc_6	262	1.92	0.87

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	trauriger Smiley	41.6	35.7
2	neutraler Smiley	24.4	21.0
3	lachender Smiley	34.0	29.2
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.9 t4nfc_7

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4nfc_7
 Label: t4 NFC Variable 7: Raetsel loesen
 Quelle: Preckel & Strobel, 2017
 Kategorien: 1 = *trauriger Smiley*; 2 = *neutraler Smiley*; 3 = *lachender Smiley*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t4nfc_7	265	2.52	0.73

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	trauriger Smiley	14.3	12.5
2	neutraler Smiley	19.2	16.7
3	lachender Smiley	66.4	57.7
-999	missing	–	13.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 265$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.10 t4nfc_8

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4nfc_8
 Label: t4 NFC Variable 8: alles genau wissen
 Quelle: Preckel & Strobel, 2017
 Kategorien: 1 = *trauriger Smiley*; 2 = *neutraler Smiley*; 3 = *lachender Smiley*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t4nfc_8	265	2.54	0.68

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	trauriger Smiley	10.6	9.2
2	neutraler Smiley	25.3	22.0
3	lachender Smiley	64.2	55.7
-999	missing	–	13.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 265$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.11 t4nfc_9

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4nfc_9
 Label: t4 NFC Variable 9: nachdenken bei Aufgaben
 Quelle: Preckel & Strobel, 2017
 Kategorien: 1 = *trauriger Smiley*; 2 = *neutraler Smiley*; 3 = *lachender Smiley*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t4nfc_9	265	1.92	0.81

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	trauriger Smiley	37.0	32.1
2	neutraler Smiley	33.6	29.2
3	lachender Smiley	29.4	25.6
-999	missing	–	13.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 265$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.12 t4nfc_10

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4nfc_10
 Label: t4 NFC Variable 10: lerne gerne Neues
 Quelle: Preckel & Strobel, 2017
 Kategorien: 1 = *trauriger Smiley*; 2 = *neutraler Smiley*; 3 = *lachender Smiley*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t4nfc_10	264	2.71	0.60

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	trauriger Smiley	8.0	6.9
2	neutraler Smiley	12.9	11.1
3	lachender Smiley	79.2	68.5
-999	missing	–	13.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 264$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.13 t4nfc_11

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4nfc_11
 Label: t4 NFC Variable 11: Situationen richtig nachdenken
 Quelle: Preckel & Strobel, 2017
 Kategorien: 1 = *trauriger Smiley*; 2 = *neutraler Smiley*; 3 = *lachender Smiley*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t4nfc_11	264	1.84	0.82

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	trauriger Smiley	42.4	36.7
2	neutraler Smiley	31.1	26.9
3	lachender Smiley	26.5	23.0
-999	missing	–	13.4

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 264$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.14 t4nfc_12

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4nfc_12
 Label: t4 NFC Variable 12: Knobelaufgaben in Schule
 Quelle: Preckel & Strobel, 2017
 Kategorien: 1 = *trauriger Smiley*; 2 = *neutraler Smiley*; 3 = *lachender Smiley*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t4nfc_12	266	2.04	0.85

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	trauriger Smiley	34.2	29.8
2	neutraler Smiley	27.8	24.3
3	lachender Smiley	38.0	33.1
-999	missing	–	12.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 266$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.15 t4nfc_13

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4nfc_13
 Label: t4 NFC Variable 13: Situationen viel nachdenken
 Quelle: Preckel & Strobel, 2017
 Kategorien: 1 = *trauriger Smiley*; 2 = *neutraler Smiley*; 3 = *lachender Smiley*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t4nfc_13	262	2.38	0.78

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	trauriger Smiley	18.7	16.1
2	neutraler Smiley	24.8	21.3
3	lachender Smiley	56.5	48.5
-999	missing	–	14.1

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 262$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.16 t4nfc_14

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4nfc_14
 Label: t4 NFC Variable 14: gerne nachdenken
 Quelle: Preckel & Strobel, 2017
 Kategorien: 1 = *trauriger Smiley*; 2 = *neutraler Smiley*; 3 = *lachender Smiley*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t4nfc_14	263	2.16	0.83

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	trauriger Smiley	27.8	23.9
2	neutraler Smiley	28.1	24.3
3	lachender Smiley	44.1	38.0
-999	missing	–	13.8

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 263$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.17 t4nfc_miss

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4nfc_miss

Label: t4 Need for Cognition Anzahl nicht bearbeiteter Items

Quelle: Preckel & Strobel, 2017

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4nfc_miss	305	1.92	4.66	0.0	14.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.18 NFC_auswertung

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: NFC_auswertung
 Label: t4 Need for Cognition Auswertung moeglich (bei weniger als 5 fehlenden Items)
 Quelle: Preckel & Strobel, 2017
 Kategorien: 0 = *keine weitere Auswertung moeglich*; 1 = *Auswertung moeglich*
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
NFC_auswertung	305	0.87	0.34

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
0	keine weitere Auswertung moeglich	13.1	13.1
1	Auswertung moeglich	86.9	86.9

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 305$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

3.19 NFC_rw

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: NFC_rw
 Label: t4 Need for Cognition Rohwert inklusive ersetzter Werte
 Quelle: Preckel & Strobel, 2017
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
NFC_rw	265	31.35	5.78	14.0	42.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.20 NFC_PR

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: NFC_PR
 Label: t4 Need for Cognition Prozentrang
 Quelle: Preckel & Strobel, 2017
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
NFC_PR	265	32.98	28.16	1.0	98.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

3.21 NFC_T

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: NFC_T
 Label: t4 Need for Cognition T-Wert
 Quelle: Preckel & Strobel, 2017
 Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
NFC_T	265	44.06	10.42	21.0	71.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4 T4 DILE-D

4.1 t4dileDat

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dileDat

Label: t4 DILE-D Testdatum

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B., 2017

4.2 t4dile_Bemerk

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dile_Bemerk

Label: t4 DILE-D Bemerkung

Variablentyp: Zeichenfolge

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B., 2017

4.3 t4dile1_vorhanden

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dile1_vorhanden

Label: t4 DILE-D Subtest Woerter vorhanden

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B.,
2017Kategorien: 1 = *vorhanden*;Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t4dile1_vorhanden	248	1.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	vorhanden	100.0	81.3
-999	missing	–	18.7

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 248$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.4 t4dile2_vorhanden

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dile2_vorhanden

Label: t4 DILE-D Subtest Pseudowoerter vorhanden

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B.,
2017Kategorien: 1 = *vorhanden*;Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD
t4dile2_vorhanden	247	1.00	0.00

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

[

Häufigkeitsverteilung] Häufigkeitsverteilung

Kategorie	Label	Relative Häufigkeiten	
		Gültige Werte	Alle Werte
1	vorhanden	100.0	81.0
-999	missing	–	19.0

Anmerkungen. Es werden gerundete relative Häufigkeiten in Prozent in Bezug auf die Fallzahl der gültigen Werte ($N_{valid} = 247$) und in Bezug auf die Fallzahl aller Werte ($N_{total} = 305$) berichtet. Dadurch kann die Summe der Prozente minimal von 100 abweichen. Kategorien fehlender Werte werden berichtet, wenn bei diesen mindestens eine Angabe vorliegt.

4.5 t4dile1_W

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dile1_W

Label: t4 DILE-D Subtest Woerter Anzahl Woerter gesamt

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B.,
2017Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4dile1_W	248	26.67	14.29	4.0	89.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.6 t4dile1_F

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dile1_F

Label: t4 DILE-D Subtest Woerter Anzahl Fehler

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B.,
2017Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4dile1_F	248	4.19	3.05	0.0	21.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.7 t4dile1_A

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dile1_A

Label: t4 DILE-D Subtest Woerter Anzahl Auslassungen

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B.,
2017Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4dile1_A	248	0.23	1.36	0.0	10.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.8 t4dile1_K

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dile1_K

Label: t4 DILE-D Subtest Woerter Anzahl Selbstkorrekturen

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B.,
2017Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4dile1_K	248	0.87	1.12	0.0	5.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.9 t4dile1_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dile1_RW

Label: t4 DILE-D Subtest Woerter Rohwert

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B.,
2017Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4dile1_RW	248	22.26	13.77	0.0	81.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.10 t4dile2_W

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dile2_W

Label: t4 DILE-D Subtest Pseudowoerter Anzahl Woerter gesamt

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B.,
2017Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4dile2_W	247	20.94	9.32	3.0	52.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.11 t4dile2_F

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dile2_F

Label: t4 DILE-D Subtest Pseudowörter Anzahl Fehler

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B.,
2017Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4dile2_F	247	4.50	3.73	0.0	26.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.12 t4dile2_A

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dile2_A

Label: t4 DILE-D Subtest Pseudowörter Anzahl Auslassungen

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B.,
2017Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4dile2_A	247	0.25	1.90	0.0	25.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.13 t4dile2_K

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dile2_K

Label: t4 DILE-D Subtest Pseudowörter Anzahl Selbstkorrekturen

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B.,
2017Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4dile2_K	247	0.79	0.97	0.0	4.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.14 t4dile2_RW

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dile2_RW

Label: t4 DILE-D Subtest Pseudowörter Anzahl Rohwert

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B.,
2017Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4dile2_RW	247	16.19	8.22	1.0	39.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.15 t4dil1zG

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dil1zG

Label: t4 DILE-D Subtest Woerter z-Wert Gesamtnorm

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B.,
2017Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4dil1zG	248	-0.35	1.06	-1.7	1.7

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.16 t4dil1z

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dil1z

Label: t4 DILE-D Subtest Woerter z-Wert Getrennte Norm (Bilingual als Gesamtnorm)

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B.,
2017Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4dil1z	248	-0.32	1.06	-1.7	1.7

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.17 t4dil1zb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dil1zb

Label: t4 DILE-D Subtest Woerter z-Wert Getrennte Norm (Bilingual als DaZ)

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B.,
2017Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4dil1zb	248	-0.30	1.06	-1.7	1.7

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.18 t4dil2zG

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dil2zG

Label: t4 DILE-D Subtest Pseudowörter z-Wert Gesamtnorm

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B.,
2017Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4dil2zG	247	-0.29	1.03	-1.7	1.7

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.19 t4dil2z

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dil2z

Label: t4 DILE-D Subtest Pseudowörter z-Wert Getrennte Norm (Bilingual als Gesamtnorm)

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B., 2017

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4dil2z	247	-0.27	1.02	-1.7	1.7

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.20 t4dil2zb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dil2zb

Label: t4 DILE-D Subtest Pseudowörter z-Wert Getrennte Norm (Bilingual als DaZ)

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B.,
2017Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4dil2zb	247	-0.25	1.02	-1.7	1.7

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.21 t4dil1PG

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dil1PG

Label: t4 DILE-D Subtest Woerter Prozentrang Gesamtnorm

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B.,
2017Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4dil1PG	248	41.15	30.59	0.0	100.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.22 t4dil1P

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dil1P

Label: t4 DILE-D Subtest Woerter Prozentrang Getrennte Norm (Bilingual als Gesamtnorm)

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B., 2017

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4dil1P	248	41.65	30.47	0.0	100.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.23 t4dil1Pb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dil1Pb

Label: t4 DILE-D Subtest Woerter Prozentrang Getrennte Norm (Bilingual als DaZ)

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B.,
2017Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4dil1Pb	248	42.12	30.43	0.0	100.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.24 t4dil2PG

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dil2PG

Label: t4 DILE-D Subtest Pseudowörter Prozentrang Gesamtnorm

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B.,
2017Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4dil2PG	247	43.33	29.89	1.0	99.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.25 t4dil2P

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dil2P

Label: t4 DILE-D Subtest Pseudowörter Prozentrang Getrennte Norm (Bilingual als Gesamtnorm)

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B., 2017

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4dil2P	247	43.67	29.62	1.0	99.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.26 t4dil2Pb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dil2Pb

Label: t4 DILE-D Subtest Pseudowörter Prozentrang Getrennte Norm (Bilingual als DaZ)

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B., 2017

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4dil2Pb	247	43.88	29.48	1.0	99.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.27 t4dil1_TnG

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dil1_TnG

Label: t4 DILE-D Subtest Woerter T-Wert Gesamtnorm

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B.,
2017Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4dil1_TnG	248	46.55	10.61	33.0	67.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.28 t4dil2_TnG

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dil2_TnG

Label: t4 DILE-D Subtest Pseudowörter T-Wert Gesamtnorm

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B.,
2017Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4dil2_TnG	247	47.20	10.31	33.0	67.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.29 t4dil1_Tn

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dil1_Tn

Label: t4 DILE-D Subtest Woerter T-Wert Getrennte Norm (Bilingual als Gesamtnorm)

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B.,
2017Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4dil1_Tn	248	46.76	10.55	33.0	67.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.30 t4dil2_Tn

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dil2_Tn

Label: t4 DILE-D Subtest Pseudowörter T-Wert Getrennte Norm (Bilingual als Gesamtnorm)

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B., 2017

Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	N_{valid}	M	SD	$Min.$	$Max.$
t4dil2_Tn	247	47.41	10.21	33.0	67.0

Anmerkungen. N = Fallzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; $Min.$ = Minimum; $Max.$ = Maximum.
 N_{total} = 305.

4.31 t4dil1_Tnb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dil1_Tnb

Label: t4 DILE-D Subtest Woerter T-Wert Getrennte Norm (Bilingual als DaZ)

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B.,
2017Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4dil1_Tnb	248	47.00	10.50	33.0	67.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

4.32 t4dil2_Tnb

[

Beschreibung der Variable] Beschreibung der Variable

Variablenname: t4dil2_Tnb

Label: t4 DILE-D Subtest Pseudowörter T-Wert Getrennte Norm (Bilingual als DaZ)

Quelle: Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B.,
2017Fehlende Werte: -999 = *missing*

Variablenname	<i>N_{valid}</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
t4dil2_Tnb	247	47.56	10.15	33.0	67.0

Anmerkungen. *N* = Fallzahl; *M* = Mittelwert; *SD* = Standardabweichung; *Min.* = Minimum; *Max.* = Maximum.
N_{total} = 305.

VII Anhang

Literaturverzeichnis

- Hasselhorn, M., Schumann-Hengsteler, R., Grube, D., König, J., Mähler, C., Schmid, I., Zoelch, C. (2012). Arbeitsgedächtnistestbatterie für Kinder von 5 bis 12 Jahren (AGTB5–12). Göttingen: Hogrefe.
- Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W. (2017). Ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler – Version II (ELFE II). Göttingen: Hogrefe.
- Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B. (2017). Differenzierter Lesetest – Dekodieren (DiLe-D). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F. (2016). Sprachentwicklungstest für Kinder im Alter zwischen 5 und 10 Jahren (SET 5–10). Göttingen: Hogrefe.
- Ponitz, C. C., McClelland, M. M., Matthews, J. S. & Morrison, F. J. (2009). A structured observation of behavioral regulation and its contributions to kindergarten outcomes. *Developmental Psychology*, 45, 605–619.
- Preckel, F. & Strobel, A. (2017). Need for Cognition – Kinderskala (NFC-Kids). Göttingen: Hogrefe.
- Schulz, P. & Tracy, R. (2011). Linguistische Sprachstandserhebung. Deutsch als Zweitsprache (LiSe-DaZ). Göttingen: Hogrefe.
- Thoma, D. & Tracy, R. (2015). Manual zu SprachKoPFv07.2. Instrument zur standardisierten Erhebung der Sprachförderkompetenz pädagogischer Fachkräfte. Mannheim: Universität Mannheim.
- Trolldenier, H.-P. (2014). Würzburger Rechtschreibtest für 1. und 2. Klassen (WÜRT 1-2). Göttingen: Hogrefe.

Abkürzungsverzeichnis

[
Abkürzungen]Abkürzungen

Abkuerzung	Bedeutung
AGTB 5–12	Arbeitsgedächtnistestbatterie für Kinder von 5 bis 12 Jahren
DCCS	Dimensional Change Card Sort
DiLe-D	Differenzierter Lesetest – Dekodieren
ELFE-II	Ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler Version II
IDS-2	Intelligence and Development Scales – 2
LiSe-DaZ	Linguistische Sprachstandserhebung – Deutsch als Zweitsprache
NFC	Need for Cognition – Kinderskala
PAL	Paar-Assoziations-Lernen
RAN	Rapid Automatized Namin
RAS	Rapid Alternating Stimulus
SET 5–10	Sprachentwicklungstest für Kinder im Alter zwischen 5 und 10 Jahren
WÜRT 1-2	Würzburger Rechtschreibtest für 1. und 2. Klassen